

regunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor de mal pronóstico en los pacientes quemados?

Seleccione una:

- a. Edad
- b. Inhalación de humo
- c. Localización de las quemaduras en las manos ✓
- d. Cardiopatía

Tabla de factores de gravedad de las quemaduras

La respuesta correcta es: Localización de las quemaduras en las manos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Qué tipo de agente causal requiere la irrigación continua con agua para detener el daño cutáneo generado?

Seleccione una:

- a. Quemaduras eléctricas
- b. Quemaduras por escaldadura
- c. Quemaduras por ácido fluorhídrico ✓
- d. Quemad por llama

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Cuidados específicos"). Pese a que alguna de las sustancias químicas tengan antídoto propio, el tratamiento inicial genérico de toda quemadura química consiste en la eliminación del agente causal mediante "ducha por arrastre" con abundante agua, tratamiento que no debe retrasarse por buscar el antídoto específico.

La respuesta correcta es: Quemaduras por ácido fluorhídrico

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Para la valoración de la superficie corporal quemada en un paciente adulto se emplean

Seleccione una:

- a. La regla de los "9" o Regla de Wallae
- b. La regla de Lund-Browder
- c. La equivalencia de la palma de la mano un 1%
- d. Todas son correctas ✓

Pese a que las regla más conocidas para la valoración de STQ en el adulto con la equivalencia de la mano a un 1% en caso de quemaduras de pequeña extensión, y la regla de Wallaces; La regla de Lund-Browder es la más empleada en las Unidades de Granes Quemados por ser más precisa y adaptar sus porcentajes de afectación según la edad del paciente

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

El tratamiento de las quemaduras circulares se centra en

Seleccione una:

- a. Valoración de la posible aparición de síndrome compartimental
- b. Vigilar la aparición de alteraciones respiratorias en circulares de cuello
- c. Valorar aumento de presione y disminuciones de volúmenes en lesione de tórax y VM
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico)

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 5

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Atendiendo a la regla de Wallaces, si estamos ante un paciente con los miembros superiores por su parte anterior, el miembro inferior derecho por la parte anterior y el tórax quemados ¿qué STQ tendrá el paciente?

Seleccione una:

- a. 27% 
- b. 36%
- c. 45%
- d. 63%

(Bloque paciente adulto crítico. RC paciente quemado crítico. Anexo 11)

La respuesta correcta es: 36%

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes características son propias de las lesiones por quemaduras epidérmicas?

Seleccione una:

- a. Flictena
- b. Secas 
- c. Se extra fácilmente el folículo piloso
- d. Coloración blanco nacarado de la zona afectada

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Valoración")

La respuesta correcta es: Secas

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

¿Cuál de las siguientes quemaduras derivaría a una Unidad de Grandes Quemados?

Seleccione una:

- a. Dérmicas superficiales del 10-15%
- b. Epidérmicas del 9,5%
- c. Dérmica profundas del 10%
- d. 0% pero con sospecha de inhalación de humo 

Criterios de traslado a Unidades de Grandes Quemados de la ABA (American Burn Association)

La respuesta correcta es: 0% pero con sospecha de inhalación de humo

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Una de las normas fundamentales para el traslado de un gran quemado. Señala la repuesta incorrecta

Seleccione una:

- a. Se deben elevar las extremidades quemadas
- b. Cubrir al paciente con mantas
- c. Trasladar al paciente siempre en decúbito supino a 0° para evitar pliegues cutáneos 
- d. Canalizar un acceso vascular periférico de grueso calibre preferiblemente dos

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico)

La respuesta correcta es: Trasladar al paciente siempre en decúbito supino a 0° para evitar pliegues cutáneos

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a los criterios de gravedad de las quemaduras se establece según la ABA (American Burn Association)

Seleccione una:

▼ Marcar pregunta

- a. Todas las quemaduras epidérmicas independientemente de su extensión son consideradas quemaduras leves
- b. La afectación de "áreas específicas" y la etiología química implican alta gravedad
- c. Las quemaduras eléctricas se consideran moderadas siempre que identifiquemos punto de entrada y de salida de la energía
- d. a y b son correctas ✓

(Bloque de urgencias. MC Quemaduras y escaldaduras. Apartado "Valoración/entrevista")
La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

En el control de un paciente con quemaduras de etiología eléctrica se debe vigilar

Seleccione una:

- a. La aparición de fenómenos arrítmicos tipo FV o muerte súbitas
- b. El mantenimiento de un ritmo diurético igual al de cualquier paciente no quemado
- c. Vigilancia de posibles complicaciones internas asociadas a la trayectoria de energía
- d. La opción b es falsa ✓

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Cuidados específicos")
La respuesta correcta es: La opción b es falsa

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Se encuentra ante un gran quemado de aproximadamente 70 Kg y con una SCQ de un 40%. Inicialmente ¿a qué ritmo infundiría el suero?

Seleccione una:

- a. 700 ml/h ✓
- b. 100ml/h
- c. 500 ml/h
- d. 466 ml/h

(Bloque de urgencias. MC Quemaduras y escaldaduras. Apartado "Cuidados de enfermería"). Según la Regla de Parkland ($4\text{ml} \times \text{Peso en Kg} \times \% \text{SCQ}$) la mitad del volumen total a infundir en 24 horas, debe ser administrado en las primeras 8 horas mientras que la otra mitad se debe administrar en las 16 horas restantes

La respuesta correcta es: 700 ml/h

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

La finalidad del lavado de las quemaduras es:

Seleccione una:

- a. Arrastrar los tejidos vivos y la suciedad
- b. Arrastrar los tejidos desvitalizados
- c. Arrastrar los tejidos desvitalizados y la suciedad
- d. Hacer una adecuada exposición de la zona afecta a fin de realizar una correcta valoración ✓

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico)

La respuesta correcta es: Hacer una adecuada exposición de la zona afecta a fin de realizar una correcta valoración

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

La aparición de flictenas en la zona lesionada es típica de las quemaduras de qué tipo

Seleccione una:

- a. Quemaduras subdérmicas

Marcar pregunta

- b. Epidérmicas y dérmicas superficiales
- c. Dérmicas ✓
- d. Dérmicas y Subdérmicas

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Valoración"). Las flictenas son típicas de las quemaduras dérmicas, tanto superficiales como profundas, diferenciándose ambas por la base de la flictena. En el caso de las quemaduras dérmicas superficiales la base es roja brillante mientras que en el caso de las dérmicas profundas es blanca nacarada

La respuesta correcta es: Dérmicas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un gran quemado existe gran pérdida hídrica, ¿cuál es el mejor parámetro para ver si la reposición de líquidos es correcta?

Seleccione una:

- a. La tensión arterial media
- b. La frecuencia cardiaca
- c. La diuresis horaria ✓
- d. La aparición de edema facial

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Valoración")

La respuesta correcta es: La diuresis horaria

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La reposición hídrica de los pacientes quemados se debe realizar con:

Seleccione una:

- a. Suero salino fisiológico al 09%
- b. Ringer Lactato ✓
- c. Dextrosa 5%
- d. Soluciones coloides

(Bloque de urgencias. MC Quemaduras y escaldaduras. Apartado "Cuidados de enfermería")

La respuesta correcta es: Ringer Lactato

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En el tratamiento cutáneo de los pacientes quemados las flictenas

Seleccione una:

- a. Sólo eliminaremos las flictenas de pequeño tamaño pues son un caldo de cultivo
- b. Deben eliminarse siempre ✓
- c. Eliminaremos las que están rotas y aquellas que impidan la capacidad funcional de la zona
- d. Nunca dejaremos al aire parta alguna de la mano

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico)

La respuesta correcta es: Deben eliminarse siempre

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Sobre el vendaje de las manos es cierto que

Seleccione una:

- a. Los dedos deben ser separados uno a uno y realizar un vendaje con la mano en garra en posición funcional
- b. Los dedos deben ser separados uno a uno y realizar un vendaje compresivo de la mano
- c. Los dedos deben vendar unidos para evitar secuelas y la mano de colocarse en posición de garra

- d. Nunca dejaremos al aire parte alguna de la mano 

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Cuidados generales")
La respuesta correcta es: Los dedos deben ser separados uno a uno y realizar un vendaje con la mano en garra en posición funcional

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuándo en la valoración de un paciente quemado apreciamos voz ronca, pensaremos:

Seleccione una:

- a. El paciente estaba resfriado antes el accidente
- b. El pacientes se encontraba en un lugar cerrado y ha inhalado humo 
- c. Ha gritado en exceso durante el accidente
- d. Tienes los oídos taponados y percibes mal su voz

(Bloque del Paciente adulto crítico. RC Paciente quemado crítico, Tabla síndrome de inhalación)
La respuesta correcta es: El pacientes se encontraba en un lugar cerrado y ha inhalado humo

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

Uno de los cuidados más importantes en una quemadura en cara y cuello es

Seleccione una:

- a. Realizar la cura lo antes posible para evitar infecciones
- b. Mantener la cabecera elevada 45-90º
- c. Mantener la cabeza en posición horizontal
- d. Valorar signos de posible afectación de la vía aérea 

(Bloque del paciente adulto crítico. RC del paciente quemado crítico. Apartado "Valoración")
La respuesta correcta es: Valorar signos de posible afectación de la vía aérea

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar pregunta

El tratamiento del Síndrome de inhalación de humo incluye:

Seleccione una:

- a. Administración de corticoides IV
- b. Oxigenoterapia al 100% 
- c. Oxigenoterapia en gafas nasales a 4 lpm
- d. Ninguna de las anteriores

(Bloque del Paciente adulto crítico. RC Paciente quemado crítico, Tabla síndrome de inhalación)
La respuesta correcta es: Oxigenoterapia al 100%