


### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al dolor en cuidados paliativos pediátricos es cierto que:

Seleccione una:



a. Es uno de los síntomas más frecuentes. ✓



b. Los niños en cuidados paliativos no suelen tener dolor



c. El dolor es un síntoma siempre objetivo



d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

El dolor es uno de los síntomas más frecuentes en cuidados paliativos pediátricos y suele ser debido a muchas y muy diversas causas. Además el dolor es subjetivo y depende de la percepción de cada sujeto.


La respuesta correcta es:

Es uno de los síntomas más frecuentes.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a los sedantes es cierto que:

Seleccione una:



a. No producen analgesia ✓



b. No se pueden asociar a opioides para disminuir la ansiedad



c. Producen efecto analgésico



d. No se deben emplear para disminuir la agitación

Retroalimentación

**Los sedantes no producen analgesia**, pudiendo incluso aumentar la percepción dolorosa. La agitación secundaria a dolor se manejará con analgésicos

La respuesta correcta es:

No producen analgesia

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Es característico del dolor en pediatría:

Seleccione una:

- ☒ a. En muchas ocasiones no es el paciente el que transmite la información relacionada con el dolor. ✓
- ☐ b. Los niños sienten menos dolor que los adultos
- ☐ c. Cuanto mayor es el niño menos tolerancia al dolor tiene
- ☐ d. Si un niño no dice que le duele entonces es que no le duele

#### Retroalimentación

En pediatría el concepto de dolor debe incluir además la posibilidad de que el sujeto de dolor no sea capaz de comunicarse verbalmente, los padres son las personas que mejor conocen a su hijo y por tanto los que mejor pueden transmitir la información relacionada con él.

La respuesta correcta es:

En muchas ocasiones no es el paciente el que transmite la información relacionada con el dolor.

#### Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Con respecto al fenómeno de dependencia

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece por la administración de un sedante u opioide durante horas de tratamiento
- ☐ b. Es la disminución del efecto farmacológico tras semanas de tratamiento.
- ☐ c. Aparece por la administración de un sedante o un opioide durante semanas de tratamiento
- ☒ d. Ninguna es correcta ✗

#### Retroalimentación

Tolerancia: Es la disminución del efecto farmacológico tras la administración prolongada. Suele aparecer entre la 2ª y 3ª semana de tratamiento aunque en el niño se desarrolla tanto más precozmente cuanto menor es la edad.

Dependencia física: Si un sedante o un opioide se administra más de 2-3 semanas y se retira bruscamente aparece el llamado síndrome de abstinencia. Al igual que la tolerancia, la dependencia física aparece en el neonato y lactante con terapias cortas, de muy pocos días.

La respuesta correcta es:

Aparece por la administración de un sedante o un opioide durante semanas de tratamiento

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el opioide de elección en el tratamiento del dolor neuropático?

Seleccione una:

- ☒ a. metadona ✓
- ☐ b. Fentanilo
- ☐ c. Hidromorfona
- ☐ d. Codeína

Retroalimentación

La metadona se considera el opioide de elección en el tratamiento del dolor neuropático que responde mal a opioides

La respuesta correcta es:  
metadona

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a tratamiento no farmacológico del dolor cual es el método preferido para disminuir el dolor de 0-6 meses

Seleccione una:

- ☐ a. Ambiente agradable
- ☐ b. Masaje
- ☐ c. Estimulación cutánea
- ☒ d. Lactancia materna ✓

Retroalimentación

La lactancia materna es el método preferido para disminuir el dolor siendo un método seguro, efectivo, natural y sin ningún costo y proporcionando una oportunidad adicional de promover y apoyar a la lactancia

La respuesta correcta es:  
Lactancia materna

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuántos escalones de la escalera analgésica recomienda la OMS en la infancia?

Seleccione una:

- ☐ a. Uno
- ☒ b. Dos ✓
- ☐ c. Tres
- ☐ d. Cuatro

Retroalimentación

La OMS no recomienda el uso de analgésicos de segundo escalón para el tratamiento del dolor en la infancia debido a la amplia variabilidad de los efectos producidos, recomendando el uso de morfina a dosis bajas en casos de dolor moderado me no se controle con analgesia de primer escalón.

La respuesta correcta es:

Dos

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La estimulación cutánea pertenece al grupo

Seleccione una:

- ☒ a. Intervenciones físicas ✓
- ☐ b. Intervenciones psicológicas
- ☐ c. Estrategias de apoyo
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Dentro de las intervenciones físicas encontramos la estimulación cutánea: Masaje y TENS.

La respuesta correcta es:

Intervenciones físicas

#### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Pertenece al primer escalón de la escalera analgésica:

Seleccione una:

- ☐ a. Codeína
- ☐ b. Tramadol
- ☐ c. Oxicodona
- ☒ d. Metamizol ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Metamizol

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La alodinia se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Respuesta al dolor aumentada frente a un estímulo doloroso
- ☒ b. Sensación de dolor ante un estímulo no doloroso ✓
- ☐ c. Sensación anormal no desagradable descrita como hormigueo
- ☐ d. Aumento de la sensibilidad ante un estímulo táctil

Retroalimentación

Alodinia: Sensación de dolor ante un estímulo no doloroso.

Hiperalgnesia: Respuesta al dolor aumentada ante un estímulo doloroso.

Hiperestesia: aumento de la sensibilidad ante un estímulo táctil o térmico.

Hipoestesia: disminución de la sensibilidad ante un estímulo táctil o térmico.

Parestesia: sensación anormal no desagradable, que puede describirse como hormigueo, hinchazón, agua deslizándose...

Disestesia: sensación anormal desagradable, que puede referirse como hormigueo o escozor

La respuesta correcta es:

Sensación de dolor ante un estímulo no doloroso

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Uno de los objetivos del tratamiento del dolor no farmacológico será.

Seleccione una:

- ☒ a. Maximizar la cooperación del niño ✓
- ☐ b. Reducir la implicación parental en el tratamiento del niño
- ☐ c. Maximizar el dolor
- ☐ d. Maximizar el riesgo del niño ante cualquier procedimiento

Retroalimentación

Los objetivos que deben guiar el manejo del dolor en procedimientos diagnósticos o clínicos son:

--Minimizar el dolor: coordinar los procedimientos dolorosos a realizar.

--Maximizar la cooperación del niño: preparar preventivamente al niño y al cuidador.

--Minimizar el riesgo del niño ante cualquier procedimiento

La respuesta correcta es:

Maximizar la cooperación del niño

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al dolor crónico señale la falsa.

Seleccione una:

- ☒ a. Habitualmente es más sencillo de tratar que el dolor agudo ✓
- ☐ b. Habitualmente es más complejo de tratar que el dolor agudo
- ☐ c. Con frecuencia se precisan varios fármacos para controlarlo
- ☐ d. Puede llegar a limitar la calidad de vida del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitualmente es más sencillo de tratar que el dolor agudo

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

La forma más correcta de intentar controlar un dolor severo mal controlado será mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrando analgesia pautada
- ☐ b. Mediante infusión continua
- ☐ c. Mediante administración intravenosa en bolos
- ☒ d. Mediante bomba de PCA ✓

#### Retroalimentación

La administración de analgesia controlada por el paciente (PCA) permite la infusión continua de un fármaco ofreciendo además la posibilidad de que el paciente se autoadministre bolos de rescate durante los picos de dolor, por lo que se considera la forma más efectiva de control del dolor.

La respuesta correcta es:  
Mediante bomba de PCA

#### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Uno de los siguientes fármacos no pertenece al tercer escalón de la escalera analgésica.

Seleccione una:

- ☒ a. Codeína ✓
- ☐ b. Morfina
- ☐ c. Fentanilo
- ☐ d. Hidromorfona

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Codeína

#### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Es una clave en la comunicación con el niño con dolor.

Seleccione una:

- ☐ a. Crear un entorno dinámico y activo
- ☒ b. Ajustar el lenguaje a la capacidad de comprensión del niño ✓
- ☐ c. Comunicarse con los padres exclusivamente
- ☐ d. Ninguna es correcta

#### Retroalimentación

Como claves en la comunicación con el niño encontramos: Elección de un momento adecuado, tranquilo considerando el estado emocional del paciente. Crear un ambiente de calma y ayuda que facilite la comunicación empática. Escucha activa. Comunicación abierta sobre el proceso. **Ajustar el lenguaje** a la capacidad de comprensión del niño. Facilitar un dialogo en el que el menor se encuentre cómodo y pueda realizar cuantas preguntas desee. Adecuar la cantidad y naturaleza de la información respetando el tiempo de adaptación de cada persona.

La respuesta correcta es:

Ajustar el lenguaje a la capacidad de comprensión del niño

#### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

En qué consiste el abordaje multidisciplinar del dolor.

Seleccione una:

- ☒ a. La actuación sinérgica de todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor. ✓
- ☐ b. Maximizar el impacto que el dolor supone para la salud del paciente
- ☐ c. Limitar la implicación de los padres en el tratamiento del dolor
- ☐ d. Valorar solo la esfera biológica de dolor


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La actuación sinérgica de todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor.

#### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

La escala de dolor validada más adecuada para niños mayores de 4 años



Seleccione una:

- ☐ a. FLACC
- ☐ b. LLANTO
- ☐ c. FACES
- ☒ d. Escala visual analógica ✓

Retroalimentación


La escala que permite evaluar el dolor en niño mayores de 4 años especialmente si no tienen afectación neurológica es la escala EVA.

La respuesta correcta es:  
Escala visual analógica

#### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El EMLA pertenece al grupo de los:

Seleccione una:

- ☒ a. Anestésicos locales ✓
- ☐ b. Anestésicos generales
- ☐ c. Anestésicos inhalados
- ☐ d. Anestésicos subcutáneos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anestésicos locales

#### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es considerada una estrategia de apoyo en el tratamiento no farmacológico del dolor.

Seleccione una:

- ☐ a. Distracción
- ☒ b. Manifestación de inquietudes ✓
- ☐ c. Hipnosis



d. Respiraciones profundas

#### Retroalimentación

Los objetivos que deben guiar el manejo del dolor en procedimientos diagnósticos o clínicos son:

- Minimizar el dolor: coordinar los procedimientos dolorosos a realizar.
- Maximizar la cooperación del niño: preparar preventivamente al niño y al cuidador.
- Minimizar el riesgo del niño ante cualquier procedimiento


La respuesta correcta es:

Manifestación de inquietudes

#### Pregunta 20

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Con respecto a la morfina es cierto que:

Seleccione una:



a. Es el opioide de referencia y elección en el tratamiento del dolor grave en pediatría ✓



b. Es el fármaco indicado para el tratamiento del dolor leve



c. Se desaconseja su uso en la infancia




d. Genera dependencia incluso en tratamientos cortos

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el opioide de referencia y elección en el tratamiento del dolor grave en pediatría

## Información



Marcar pregunta

Texto informativo


### Caso práctico

**Marcos es un niño de 17 años que padece una enfermedad metabólica de depósito que cursa con crisis de espasticidad y distonías. Capacidad cognitiva conservada, no posibilidad de comunicación verbal debido a la espasticidad, pero se comunica mediante parpadeo. Es portador de una bomba de baclofeno intratecal y un estimulador palidal para el control del dolor. Portador de gastrostomía para alimentación desde hace 5 años. Tratamiento habitual por gastrostomía: laxantes, tizanidina, gabapentina, antitérmicos si fiebre. Múltiples deformidades corporales debido a la espasticidad**

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de necesidad de valoración del dolor ¿Qué escala considerarías la más adecuada?

Seleccione una:



a. Escala visual analógica(EVA) ✓



b. LLANTO



c. CRIES



d. Ninguna de las anteriores

#### Retroalimentación

Por la edad del paciente la escala de elección será la escala visual analógica, si bien es cierto que debemos buscar un método que nos permita comunicarnos con el paciente a través del parpadeo que puede ser por ejemplo ir señalando los números para que nos indique el adecuado a su dolor.


La respuesta correcta es:

Escala visual analógica(EVA)

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala una posible causa de dolor en este paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Estreñimiento
- ☐ b. Tono muscular aumentado
- ☐ c. Distonías
- ☒ d. Todas son correctas ✓

#### Retroalimentación


Todas son correctas debido a que por la enfermedad de base del paciente tanto el estreñimiento, como el aumento del tono muscular y las distonias pueden generar dolor.

La respuesta correcta es:  
Todas son correctas

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cuál crees que es la forma más correcta de comunicarse para valorar el dolor con este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Este paciente no puede comunicarse debido a las limitaciones de su enfermedad
- ☒ b. Mediante preguntas sencillas que se puedan contestar a través del parpadeo ✓
- ☐ c. Solo nos comunicaremos con él a través de sus padres
- ☐ d. Todas son correctas

#### Retroalimentación


Que un paciente no pueda comunicarse verbalmente no significa que no pueda comunicarse. El parpadeo y la expresión de éste paciente nos permite generar un contacto que facilite nuestra comunicación.

La respuesta correcta es:  
Mediante preguntas sencillas que se puedan contestar a través del parpadeo

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cómo crees que puede influir la fiebre en este paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Aumentando la percepción de dolor ✓
- ☐ b. Disminuyendo el dolor



c. La fiebre no afecta al grado de dolor percibido



d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de los límites de la normalidad. Éste aumento suele generar malestar lo que aumenta la percepción del dolor y además puede producir otros fenómenos como el aumento de las distonías que puede aumentar la cantidad de sucesos dolorosos que tenga el paciente.


La respuesta correcta es:

Aumentando la percepción de dolor

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

En caso de descompensación ¿Qué grado de dolor crees que puede llegar a alcanzar este niño?

Seleccione una:



a. Leve



b. No sentirá dolor debido a su patología de base



c. Solo sentirá dolor en caso de no recibir su medicación habitual



d. Severo ✓

#### Retroalimentación

Este paciente ya puede tener un grado de dolor elevado por su enfermedad de base, por lo que es esperable que en caso de descompensación el grado de dolor sea severo

La respuesta correcta es:

Severo

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

En caso de descompensación ¿Qué fármaco emplearías para el control del dolor?

Seleccione una:



a. Opioide ✓



b. Corticoides



c. Anestésicos tópicos



d. Neurolépticos

#### Retroalimentación


Los fármacos adecuados para el tratamiento del dolor severo son los opioides. Todos los demás fármacos podrían ser usados como coadyuvantes para tratar o paliar la causa que lo desencadena.

La respuesta correcta es:  
Opioide

#### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cómo crees que puede afectar el dolor a la calidad de vida de este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. El dolor no influye en la calidad de vida de los pacientes
- ☐ b. Mejora su calidad de vida
- ☒ c. Empeora su calidad de vida ✓
- ☐ d. Su calidad de vida dependerá del número de fármacos que esté tomando

#### Retroalimentación


El dolor puede afectar a una o varias esferas de la vida de los pacientes, causando un impacto directo sobre su calidad de vida, empeorándola cuanto más dolor se tiene o más descontrolado está.

La respuesta correcta es:  
Empeora su calidad de vida

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Qué medida consideras más efectiva para el control del dolor?

Seleccione una:

- ☐ a. Medidas farmacológicas
- ☐ b. Medidas no farmacológicas
- ☒ c. Medidas farmacológicas combinadas con las medidas no farmacológicas más adecuadas al paciente ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

#### Retroalimentación

La combinación de medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas ayuda a potenciar el tratamiento y control del dolor.


La respuesta correcta es:

Medidas farmacológicas combinadas con las medidas no farmacológicas más adecuadas al paciente

#### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál crees que es la medida no farmacológica para el control del dolor más adecuada en este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Contacto piel con piel
- ☐ b. Succión mas sacarosa
- ☒ c. Masaje ✓
- ☐ d. Todas las anteriores


Retroalimentación

En este paciente emplearemos el masaje para ayudar a controlar el dolor pues puede ayudar a controlar la tensión muscular. El contacto piel con piel y la succión con sacarosa están indicadas para los lactantes

La respuesta correcta es:

Masaje

#### Información



Marcar pregunta

Texto informativo

**Durante el curso de su enfermedad, la bomba de baclofeno intratecal que porta el paciente deja de funcionar, generando un gran síndrome de abstinencia así como una descompensación extrema de la situación clínica aumentando drásticamente la espasticidad y las distonías del paciente. Para cambiar la bomba es preciso una intervención quirúrgica que se realizará en las próximas 24h**

#### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dada la situación ¿Qué fármacos crees más adecuados para el control de la situación?

Seleccione una:

- ☒ a. Opioides

- ☐ b. Relajantes musculares
- ☒ c. Opioides y relajantes musculares ✓
- ☐ d. Ninguno, la anestesiaría por completo hasta poder realizar la intervención quirúrgica

#### Retroalimentación


En ésta situación el uso de opioides junto con relajantes musculares puede potenciar el efecto analgésicos pues controlaremos el dolor con los opioides a la vez que disminuirémos el aumento del tono muscular con los relajantes musculares tratando así parte de la causa del desencadenante del dolor.

La respuesta correcta es:  
Opioides y relajantes musculares

#### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Cuál crees que es la vía de administración de analgesia más adecuada en esta situación?

Seleccione una:

- ☐ a. Oral
- ☐ b. Enteral por gastrostomía
- ☒ c. Intravenosa ✓
- ☐ d. Todas son correctas

#### Retroalimentación


Aunque la vía de administración de analgesia en la infancia es la vía oral en este caso se trata de una crisis que descompensa al paciente y afecta con severidad su calidad de vida por lo que elegiremos una vía parenteral para controlar el dolor de manera urgente y poder titular la dosis con eficacia.

La respuesta correcta es:  
Intravenosa

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Qué signos crees que pueden indicar la presencia de dolor en este paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de la espasticidad
- ☐ b. Hipertensión





c. Taquicardia y taquipnea



d. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Todas son correctas

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué efecto consideras que tienen los relajantes musculares en este paciente?

Seleccione una:



a. Aumentan el dolor



b. Disminuyen el dolor ✓



c. Ningún efecto, no le sirven de nada




d. Ninguna respuesta es correcta

Retroalimentación

Una de las causas de dolor en este paciente es el aumento del tono muscular, si disminuimos el tono muscular disminuirá la percepción de dolor.

La respuesta correcta es:  
Disminuyen el dolor

### Información



Marcar pregunta


Texto informativo

**Tras resolver la situación anterior el paciente vuelve a su rutina habitual. La bomba de baclofeno intratecal vuelve a estar funcionando, pero necesita ser recargada una vez a la semana, lo que supone un pinchazo al paciente que le genera gran ansiedad.**

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Este paciente es susceptible de padecer dolor:

Seleccione una:

- ☐ a. Crónico
- ☐ b. Agudo
- ☒ c. Ambos ✓
- ☐ d. Ninguno

Retroalimentación

Este paciente es susceptible de padecer dolor crónico pues padece una enfermedad progresiva degenerativa en la que un empeoramiento paulatino es previsible


La respuesta correcta es:

Ambos

#### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué técnicas crees que están indicadas para disminuir el dolor y la ansiedad del paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Anestésicos tópicos
- ☐ b. Distracción
- ☐ c. Presencia de la madre
- ☒ d. Todas son correctas ✓


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué fármaco emplearías para disminuir el dolor durante la punción?

Seleccione una:

- ☐ a. Emla
- ☐ b. Cloruro de etilo



c. Lidocaína subcutánea



d. A y B son correctas ✓

#### Retroalimentación


Se indica el uso de emla y cloruro de etilo por ser analgésicos tópicos. En esta situación concreta la lidocaína estaría desaconsejada pues precisa de un pinchazo para poder administrarla.

La respuesta correcta es:  
A y B son correctas

#### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Debido a su enfermedad de base crees que se debe hablar con este paciente y explicarle los procedimientos a los que le vamos a someter

Seleccione una:



a. Si, es conveniente y puede ayudar a disminuir la ansiedad si lo hacemos correctamente. ✓



b. No, debemos explicárselo a los padres exclusivamente



c. Podemos explicárselos pero no va a servir de nada porque es un niño.



d. Ninguna respuesta es correcta

#### Retroalimentación

El paciente tiene la capacidad cognitiva conservada por lo que mantener una comunicación adecuada adaptando el lenguaje y las técnicas de comunicación estaría indicado tanto para disminuir la ansiedad del paciente como para fomentar y mantener una relación de confianza tanto con el niño como con la familia.

La respuesta correcta es:  
Si, es conveniente y puede ayudar a disminuir la ansiedad si lo hacemos correctamente.

#### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Crees que las intervenciones no farmacológicas son útiles en este caso concreto?

Seleccione una:



a. Si, pueden ayudar a controlar la ansiedad ✓



b. No, la capacidad intelectual del paciente es un factor a tener en cuenta al usar las intervenciones no farmacológicas y en este caso no servirían



c. No, las intervenciones no farmacológicas solo pueden ser usadas en lactantes y niños pequeños



d. Ninguna es correcta


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, pueden ayudar a controlar la ansiedad

#### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Señala cuál de los elementos que se exponen a continuación puede empeorar la percepción de dolor del paciente:

Seleccione una:



a. Ansiedad



b. Percepción de nerviosismo de la persona que va a realizar la punción



c. Ambiente ruidoso y descontrolado



d. Todas son correctas ✓


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

¿Qué tipo de dolor puede padecer este paciente?

Seleccione una:



a. Neuropático



b. Somático



c. Ambos ✓



d. Ninguno

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambos

