

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

En el control hemodinámico del paciente trasplantado pulmonar, ¿qué parámetro no entraría dentro de la normalidad?:

Seleccione una:


- ☐ a. Presión de enclavamiento= 8 mmHg.
- ☒ b. PAP diastólica=20 mmHg ✓
- ☐ c. PVC = 11 mmHg
- ☐ d. Todas estarían dentro de la normalidad

(Bloque III/RC adulto crítico/trasplante pulmonar/cuidados generales).Respuesta válida: B. La respuesta B es falsa (PAP... se considera adecuada una presión diastólica de aproximadamente 10 mmHg).

La respuesta correcta es: PAP diastólica=20 mmHg

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Cual no será un objetivo de nuestros cuidados al paciente con insuficiencia respiratoria aguda en Unidad de Críticos:

Seleccione una:

- ☐ a. Corregir la hipoxemia con control de la hipercapnia y la acidosis respiratoria
- ☒ b. Mantener un bajo nivel de consciencia para control de la ansiedad. ✓
- ☐ c. Conseguir un adecuado patrón respiratorio
- ☐ d. Facilitar la movilización y eliminación de secreciones

(Bloque III/RC adulto crítico/RC Insuficiencia respiratoria aguda/cuidados generales). Respuesta válida: B: La respuesta B es falsa(...los objetivos de la atención en la UCC serán: ....Recuperar el nivel de consciencia de referencia).

La respuesta correcta es: Mantener un bajo nivel de consciencia para control de la ansiedad.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en la valoración del dolor del paciente sometido a cirugía de tórax?:

Seleccione una:

- ☒ a. Un mal control puede originar la aparición de atelectasias ✓
- ☐ b. La analgesia epidural será de elección por no suponer un riesgo de complicaciones
- ☐ c. No está indicada la adición de AINEs y analgesia paravertebral
- ☐ d. Todas con correctas

(Bloque III/RC adulto crítico/RC Cirugía torácica/valoración/valoración del dolor). Respuesta válida: A. La respuesta B es falsa: (La epidural es analgesia de elección por localizar la analgesia en el hemitórax intervenido, no por no tener complicaciones).La respuesta C es falsa: Ambas (analgesia paravertebral y bloqueos regionales) deben asociarse con AINEs.

La respuesta correcta es: Un mal control puede originar la aparición de atelectasias

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Dentro del tratamiento que el médico puede prescribir para el paciente con crisis asmática, señale lo falso

Seleccione una:

- ☒ a. Esta indicado el uso de beta2 agonistas de corta y larga duración ✓
- ☐ b. Está indicado el uso de corticoides inhalados y sistémicos
- ☐ c. La teofilina de forma aislada y a dosis bajas puede potenciar el efecto antiinflamatorio de los corticoides
- ☐ d. Todas son ciertas

(Bloque II/RC Hospitalización médica/ cuidados específicos/asma/tratamiento farmacológico). Respuesta válida: A. Es falsa (Los beta 2 de larga duración están indicados en el tratamiento en

fase estable).

La respuesta correcta es: Esta indicado el uso de beta2 agonistas de corta y larga duración

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

¿En qué modalidad de VMI el objetivo es el reclutamiento alveolar pero puede provocar aumento de la presión intratorácica y vaciado pulmonar incompleto con atrapamiento aéreo por acortamiento del tiempo espiratorio?

Seleccione una:

- ☒ a. Ventilación con relación I/E invertida (IRV) ✓
- ☐ b. Ventilación controlada por presión (PCV)
- ☐ c. No existe esa modalidad ventilatoria
- ☐ d. Ninguna es cierta

(Bloque IV/RC paciente con VM/RC paciente VMI/modalidades VM). Respuesta válida A. La IRV responde a esas características.

La respuesta correcta es:  
Ventilación con relación I/E invertida (IRV)

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

¿Cómo se definirían los sistemas de oxigenoterapia de alto flujo?

Seleccione una:

- ☐ a. Aquellos que permiten una FiO2 mayor de 50%
- ☐ b. Los que permiten flujos superiores a 6 litros minuto
- ☒ c. Aquellos que suministran una concentración constante de oxígeno sea cual sea la mecánica respiratoria del paciente ✓
- ☐ d. Todas son correctas

(Bloque II/RC Hospitalización médica/ insuficiencia respiratoria/oxigenoterapia/sistemas de administración). Respuesta válida: C. (Sistemas de alto flujo: Aportan una concentración constante de oxígeno independientemente del patrón ventilatorio del paciente)

La respuesta correcta es:  
Aquellos que suministran una concentración constante de oxígeno sea cual sea la mecánica respiratoria del paciente

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

¿Qué tipo de exacerbaciones asmáticas tienen mayor gravedad inicial?

Seleccione una:

- ☐ a. Las ocasionadas por infecciones respiratorias altas
- ☐ b. Las que son originadas por un mal control por parte del paciente
- ☒ c. Las causadas por ingestión de antiinflamatorios no esteroideos o inhalación de alérgenos y las secundarias a la ingesta de determinados alimentos como leche y huevo ✓
- ☐ d. Las respuestas a y b son correctas

(Bloque I/RC en Urgencias/motivo de consulta asma/valoración). Respuesta válida: C. Las respuestas A y B son falsas (...las (crisis) de instauración rápida se deben a alérgenos inhalados, ingestión de AINES... Estas últimas, a pesar de ser más graves tienen una respuesta al tratamiento mejor y más rápida...

La respuesta correcta es: Las causadas por ingestión de antiinflamatorios no esteroideos o inhalación de alérgenos y las secundarias a la ingesta de determinados alimentos como leche y huevo

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Son indicadores de riesgo de la hemoptisis amenazante o de riesgo vital:

Seleccione una:

- ☐ a. Obstrucción de la vía aérea.

Marcar pregunta

- ☐ b. Inestabilidad hemodinámica.
- ☐ c. Volumen superior a 50ml
- ☒ d. Las repuestas a y b con correctas ✓

(Bloque II/RC Hospitalización médica/ cuidados específicos/hemoptisis). Respuesta válida: D. La repuesta C es falsa (volumen superior a 100 ml)

La respuesta correcta es: Las repuestas a y b con correctas

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dentro de los cuidados a pacientes con oxigenoterapia, tendremos en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Titularemos la oxigenoterapia según objetivos a la concentración más baja posible sólo en pacientes hipercápnicos.
- ☒ b. Si precisa, usaremos, cremas de base hidrosoluble para hidratar la mucosa nasal ✓
- ☐ c. La aparición de úlceras por presión es muy rara en pacientes con sistemas de oxigenoterapia, no así en aquellos sometidos a VMNI donde hay que extremar las precauciones.
- ☐ d. Todas son ciertas

Bloque II/RC Hospitalización médica/ insuficiencia respiratoria/oxigenoterapia/consideraciones). Respuesta válida: B. La respuesta A es falsa (siempre titularemos a la concentración más baja posible, no sólo en hipercápnicos). La respuesta C es falsa (debemos realizar cuidados de piel y prevención de UPPs causadas por puntos de presión de los sistemas de O2...)

La respuesta correcta es: Si precisa, usaremos, cremas de base hidrosoluble para hidratar la mucosa nasal

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál no supone una de las principales complicaciones del trasplante de pulmón?

Seleccione una:

- ☐ a. Rechazo agudo
- ☐ b. Dehiscencia de sutura bronquial
- ☒ c. Hipovolemia postoperatoria ✓
- ☐ d. Todas son ciertas

(Bloque III/RC adulto crítico/trasplante pulmonar/cuidados específicos/principales compliaciones). Respuesta válida C. Es falsa (es hipervolemia postoperatoria-ver tabla-)

La respuesta correcta es: Hipovolemia postoperatoria

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿En cuál de estos casos estaría indicada la VMNI?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipercapnia tendente a la acidosis respiratoria
- ☐ b. Insuficiencia respiratoria con mala respuesta al tratamiento
- ☐ c. Disnea de mínimos esfuerzos con frecuencia respiratoria: 20
- ☒ d. Las repuestas A y B son correctas ✓

(Bloque IV/RC paciente con VM/RC paciente VMNI/Indicaciones VMNI). Respuesta válida D. La respuesta C es falsa (Indicaciones: Disnea no controlada en reposo y FR>30).

La respuesta correcta es: Las repuestas A y B son correctas

### Pregunta 12

Correcta

Sobre la BiPAP en la VMNI

Seleccione una:

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta


- ☐ a. La EPAP permite el reclutamiento alveolar y mejora la oxigenación
- ☐ b. Le IPAP permite el descanso muscular
- ☐ c. La diferencia entre IPAP y EPAP supone la presión de soporte ventilatorio
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

(Bloque IV/RC paciente con VM/RC paciente VMNI/modalidades VMNI). Respuesta válida D. Todas las respuestas son ciertas

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

¿Qué tipo de exacerbaciones asmáticas suele responder más favorablemente al tratamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Las ocasionadas por infecciones respiratorias altas
- ☐ b. Las que son originadas por un mal control por parte del paciente.
- ☒ c. Las causadas por ingestión de antiinflamatorios no esteroideos o inhalación de alérgenos y las secundarias a la ingesta de determinados alimentos como leche y huevo ✓
- ☐ d. Las respuestas A y B son correctas

(Bloque I/RC en Urgencias/motivo de consulta asma/valoración). Respuesta válida: C. Las respuestas A y B son falsas (...las (crisis) de instauración rápida se deben a alérgenos inhalados, ingestión de AINEs...tienen una respuesta al tratamiento mejor y más rápida...

La respuesta correcta es: Las causadas por ingestión de antiinflamatorios no esteroideos o inhalación de alérgenos y las secundarias a la ingesta de determinados alimentos como leche y huevo

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

¿Qué cuidados realizaremos a un paciente con VMNI?

Seleccione una:

- ☒ a. Colocar en posición de fowler para favorecer la ventilación y evitar la broncoaspiración ✓
- ☐ b. Al paciente consciente, retirar la dentadura postiza (si tuviera) para evitar que la trague accidentalmente
- ☐ c. Aconsejaremos que coma ligeramente antes de ponerse la VMNI para evitar la distensión abdominal por gases.
- ☐ d. Todas son ciertas

(Bloque IV/RC paciente con VM/RC paciente VMNI/modalidades VMNI). Respuesta válida A. La respuesta B es falsa ( Mantener dentadura postiza para evitar fugas). La respuesta C es falsa ( Prevención de la broncoaspiración...iniciar la ventilación unos o dos horas tras la ingesta...)

La respuesta correcta es: Colocar en posición de fowler para favorecer la ventilación y evitar la broncoaspiración

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

¿En qué modalidad ventilatoria de soporte parcial o asistido el volumen minuto es variable, se alternan ciclos mandatorios con respiraciones espontáneas del paciente por medio de un trigger si éste detecta su esfuerzo inspiratorio y se usa para la desconexión progresiva de la VM?

Seleccione una:

- ☐ a. Ventilación con volumen mandatorio minuto (MMV)
- ☒ b. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) ✓
- ☐ c. Ventilación con dos niveles de presión (BiPAP)
- ☐ d. Todas son ciertas

(Bloque IV/RC paciente con VM/RC paciente VMI/modalidades VM). Respuesta válida B. La SIMV responde a esas características.

La respuesta correcta es: Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

¿Existe indicación de oxigenoterapia en pacientes sin insuficiencia respiratoria?

Seleccione una:


- ☐ a. No puesto que el objetivo de la oxigenoterapia es corregir la hipoxemia.
- ☐ b. Si, puede estar indicada en pacientes con anemia grave
- ☐ c. Si, puede estar indicada en pacientes con fracaso circulatorio
- ☒ d. Las respuestas b y c son correctas ✓

(Bloque II/RC Hospitalización médica/ insuficiencia respiratoria/oxigenoterapia). Respuesta válida: D. (La anemia grave o el fracaso respiratorio aun sin insuficiencia respiratoria son indicaciones para la oxigenoterapia).

La respuesta correcta es: Las respuestas b y c son correctas

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Sobre los cuidados a un paciente en UCI con derrame pleural no es cierto:

Seleccione una:

- ☒ a. Será necesaria la colocación de drenajes torácicos para evacuar el exceso de líquido pleural ✓
- ☐ b. Vigilaremos de forma horaria el aspecto y cantidad del débito del drenaje torácico
- ☐ c. Controlaremos la permeabilidad y presencia de fuga aérea a través del tubo
- ☐ d. Todas son correctas

(Bloque III/RC adulto crítico/RC Insuficiencia respiratoria aguda/cuidados específicos/derrame pleural). Respuesta válida: A. La respuesta A es falsa (-Drenaje del exceso de líquido pleural mediante toracocentesis o colocación de tubos torácicos)...No "necesariamente" hay que colocar drenaje torácico.

La respuesta correcta es: Será necesaria la colocación de drenajes torácicos para evacuar el exceso de líquido pleural

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Ante un paciente con SDRA en Unidad de Críticos:

Seleccione una:


- ☒ a. Será de elección la monitorización hemodinámica invasiva (Swan-Ganz, catéter PICCO,etc) ✓
- ☐ b. Si precisa VMI nos adaptaremos a los siguientes parámetros: FiO2 para PaO2 =55-80 mmHg, presión inspiratoria máxima igual o superior a 30 cm de H2O, Vt=6 ml/Kg.
- ☐ c. La ventilación en prono está contraindicada en estos pacientes
- ☐ d. Las respuestas a y b son correctas

(Bloque III/RC adulto crítico/RC Insuficiencia respiratoria aguda/cuidados específicos/SDRA). Respuesta válida: A. Respuesta B es incorrecta (siguientes parámetros:....presión inspiratoria máxima menor o igual (no superior) a 30 cm H2O.Respuesta C es incorrecta (...pueden precisarse maniobras de reclutamiento alveolar...incluso ventilación en prono).

La respuesta correcta es: Será de elección la monitorización hemodinámica invasiva (Swan-Ganz, catéter PICCO,etc)

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Dentro del tratamiento en la exacerbación asmática no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Glucocorticoides nebulizados
- ☐ b. Sulfato de magnesio
- ☒ c. Agonistas B1-adrenérgicos ✓
- ☐ d. Anticolinérgicos


(Bloque I/RC en Urgencias/motivo de consulta asma/cuidados de enfermería). Respuesta válida: C (El tratamiento farmacológico consistirá en :.....agonistas b2-adrenergicos....(no b1-adrenérgicos)....)

La respuesta correcta es: Agonistas B1-adrenérgicos

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Marcar  
pregunta

¿Qué cuidados realizaremos al paciente con insuficiencia respiratoria aguda en una Unidad de Cuidados Críticos?:

Seleccione una:

- ☐ a. Control de la cantidad y aspecto de las secreciones y la capacidad para expulsarlas
- ☐ b. Vigilar tendencia a la somnolencia y presencia de agitación psicomotriz
- ☐ c. Colocar al paciente por defecto en decúbito lateral para facilitar el drenado de secreciones
- ☒ d. Las respuestas a y b son correctas ✓

(Bloque III/RC adulto crítico/RC Insuficiencia respiratoria aguda/cuidados generales). Respuesta válida: D. La respuesta C es falsa: (Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se plantean los siguientes cuidados:.-Colocar al paciente con el cabecero elevado 30 -45% (posición de semi-fowler o fowler alta) para así favorecer la expansión torácica máxima).

La respuesta correcta es:

Las respuestas a y b son correctas

[Finalizar revisión](#)