

¿Qué procedimiento se desaconseja para la estimación de la posición de la punta del catéter debido a su inexactitud y efectos adversos?

Seleccione una:

a.  
Evaluación ecográfica

b.  
Radiografías post-procedimiento

c.  
Prueba de burbujas

d.  
Sistema de electrocardiograma intracavitario (IC-ECG)

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Qué características definen a los catéteres periféricos cortos?

Seleccione una:

a.  
Longitud mayor a 7 centímetros.

b.  
Diseño compacto y fácil inserción.

c.  
Uso exclusivo para pacientes pediátricos.

d.  
Inserción profunda en la vena cava.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

Cuáles de estas no es una contraindicación para la implantación de un catéter PICC en pediatría

Seleccione una:

a.  
Riesgo de sangrado con bajo recuento plaquetario

b.  
Ausencia de venas con calibre adecuado en el brazo

- 
- c. Anomalías patológicas en el brazo como fracturas, anquilosis, trombosis venosa
- 
- d. Presencia de insuficiencia renal crónica de grado 3b-4-5

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la recomendación principal para la selección del catéter venoso en relación con su contexto de uso?

Seleccione una:

- 
- a. Seleccionar el catéter más económico.
- 
- b. Evaluar la duración del tratamiento y las características del paciente.
- 
- c. Elegir el catéter de mayor longitud disponible.
- 
- d. Preferir catéteres de calibre más grande.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

En los apósitos de protección de los diferentes DAV pediátricos el término "MVTR" hace referencia a:

Seleccione una:

- 
- a. El grado de adherencia del apósito
- 
- b. El grado de permeabilidad del apósito
- 
- c. El tamaño del apósito
- 
- d. La presencia de gel antiséptico del apósito

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la función principal del adhesivo tisular en la implantación de CVPL?

Seleccione una:

a.  
Aumentar el riesgo de sangrado.

b.  
Incrementar la contaminación bacteriana.

c.  
Detener el sangrado, disminuir la contaminación bacteriana y mejorar la estabilización del dispositivo.

d.  
Mejorar la movilidad del catéter.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el método recomendado para la fijación del catéter y la protección del sitio de inserción en pacientes pediátricos?

Seleccione una:

a.  
Suturas directas

b.  
Uso de apósitos temporales

c.  
Aplicación de pegamento de cianoacrilato o dispositivos de fijación sin sutura

d.  
Cambio diario de apósitos definitivos

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son algunas de las limitaciones del catéter CEC en comparación con los PICC?

Seleccione una:

- a.  
Menor capacidad para la obtención de muestras de sangre.
- b.  
Menor velocidad de infusión que los PICC.
- c.  
Limitaciones en la monitorización hemodinámica.
- d.  
Todas las anteriores.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿cuál es la longitud generalmente asociada a la vena umbilical por donde se introduce el CVU?

Seleccione una:

- 
- a.  
4-6 cm.
- b.  
2-4 mm.
- c.  
1-3 cm.
- d.  
5-8 cm.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué protocolo propone una evaluación sistemática de las venas superficiales en neonatos?

Seleccione una:

- 
- a.  
Protocolo de Evaluación Rápida de Venas (RaPeVa)
- b.  
Protocolo de Evaluación de Acceso Vascular (EVA)
- c.  
Protocolo de Evaluación Rápida de Venas Superficiales (RaSuVA)
- d.

## Protocolo de Evaluación de Catéteres Venosos (ECAVE)

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Qué complicación puede surgir si un CVU está colocado fuera de su ubicación habitual en el conducto venoso de Arancio?

Seleccione una:

- a. Infección local.
- b. Trombosis venosa.
- c. Riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante (NEC).
- d. Obstrucción del catéter.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es un riesgo asociado con el bajo volumen de sangre circulante en los recién nacidos?

Seleccione una:

- a. Sobrecarga de líquidos
- b. Aumento de la presión arterial
- c. Hipertensión pulmonar
- d. Anemia iatrogénica

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

### Enunciado de la pregunta

El posicionamiento de la punta de un DAV tipo Midline será:

Seleccione una:

- 
- a.  
Dentro de la región torácica de la vena axilar, incluso en la vena subclavia
- 
- b.  
En el tercio inferior de la Vena Cava Superior (VCS)
- 
- c.  
Dentro de una vena del brazo
- 
- d.  
Dentro de una vena del antebrazo debido a la dificultad de implantación del paciente pediátrico

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de antisepsia cutánea se recomienda antes de la inserción del CEC?

Seleccione una:

- 
- a.  
Yodo al 2% en base alcohólica.
- 
- b.  
Agua y jabón.
- 
- c.  
Cloruro de sodio al 0.9%.
- 
- d.  
Clorhexida al 2% en base alcohólica

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué recomendación se hace en la técnica de punción ecoguiada durante la implantación de CVPL?

Seleccione una:

- 
- a.  
Realizarla solo en pacientes con venas superficiales.
- 
- b.  
Evitar su uso en pacientes DIVA.
-

c.  
Realizarla mediante seguimiento dinámico de la punta.

d.  
Utilizarla solo en la técnica Seldinger acelerada.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

En el ámbito de la atención pediátrica, los dispositivos de acceso venoso de localización periférica son:

Seleccione una:

a.  
Cualquier DAV cuya punta esté alojada de la vena cava superior (VCS), la aurícula derecha (AD) o vena vaca inferior (VCI)

b.  
Cualquier DAV cuya punta no esté alojada de la vena cava superior (VCS), la aurícula derecha (AD) o vena vaca inferior (VCI)

c.  
Únicamente los dispositivos venosos periféricos cortos

d.  
Únicamente los dispositivos venosos periféricos cortos y largos

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

#### Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones se recomienda el uso del CVU según las directrices de Shahid et al.?

Seleccione una:

a.  
En todos los neonatos sin excepción.

b.  
En bebés prematuros = 28 semanas y recién nacidos =29 semanas con condiciones específicas.

c.  
Solo cuando no se puede establecer acceso intravenoso periférico.

d.  
En casos de acceso vascular no urgente.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Qué implica la técnica de tunelización en la inserción de un PICC en pacientes pediátricos?

Seleccione una:

- 
- a.  
Elección del punto de punción en la zona verde
- 
- b.  
Elección del punto de punción del vaso en la zona amarilla y sitio de salida del DAV en la zona verde
- 
- c.  
Utilización exclusiva de la técnica de ultrasonido
- 
- d.  
Uso de un sistema de electrocardiograma intracavitario

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones la ecografía es de gran ayuda para implantar el catéter de manera rápida y precisa?

Seleccione una:

- 
- a.  
En todas las situaciones.
- 
- b.  
Solo en pacientes adultos.
- 
- c.  
Cuando se use la extremidad superior.
- 
- d.  
Cuando las condiciones de asepsia se han cumplido adecuadamente.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

El catéter PICC en determinadas circunstancias se debe dar preferencias frente a los catéteres de posicionamiento central insertados centralmente (CICC) o los de posicionamiento central insertados femoralmente (FICC).

Seleccione una:

- 
- a.  
Tendrán preferencia los catéteres CICC o FICC por presentar menos efectos adversos
- 
- b.  
Queda a decisión del operador que implante el dispositivo
- 
- c.  
En casos de bajo recuento de plaquetas o alto riesgo de sangrado
- 
- d.  
En caso de emergencia vital