

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes tratamientos NO es necesario indicar de entrada en un paciente con colitis grave?

Seleccione una:

- a. Heparina de bajo peso molecular
- b. Antibióticos de amplio espectro (cobertura de gérmenes gram negativos y anaerobios)

Los antibióticos no han demostrado tener efectividad en la enfermedad excepto en situaciones especiales, por lo que su uso ante un brote grave se limita ante la sospecha de cuadro infeccioso sobreañadido.

- c. Esteroides intravenosos a dosis plenas (1 mg/Kg/día de prednisona o equivalente)
- d. Nutrición adecuada (oral o enteral si el paciente la tolera)

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El punto clave para el tratamiento de la CU, se obtiene con la definición exacta de:

Seleccione una:

- ☐ a. Diagnóstico (excluyendo enfermedades infecciosas)
- ☐ b. Gravedad de la enfermedad
- ☐ c. Extensión de la enfermedad
- ☒ d. Todas son correctas ✓ Podremos manejar una CU de forma correcta si tenemos claro cuál es el diagnóstico exacto, la gravedad de la misma y su extensión.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Mujer de 37 años fumadora diagnosticada de enfermedad de Crohn ileocólica (con afectación de 30 cms de íleon y colon derecho), de 7 años de evolución sin tratamiento de mantenimiento. Consulta por un brote de actividad moderada y se inicia tratamiento con budesonida. ¿Cuáles de las siguientes respuestas NO es cierta?

Seleccione una:

- ☒ a. No es necesario recomendar calcio y vitamina D de forma concomitante a la budesonida porque este corticoide no produce alteraciones de la densidad mineral ósea a diferencia de los corticoides clásicos ✓ Es aconsejable el uso del calcio y la vitamina D durante la administración de la budesonida, dado el efecto de los esteroides sobre el metabolismo óseo
- ☐ b. La paciente debe dejar de fumar para conseguir mayor eficacia del tratamiento médico
- ☐ c. La budesonida es un corticoide sistémico de acción tópica que puede estar indicado en esta situación
- ☐ d. La dosis inicial que se recomienda es la de 9 mg/día durante al menos 2 meses

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación para comenzar un tratamiento con terapias biológicas?

Seleccione una:

- ☐ a. Infección por VHC
- ☒ b. Enfermedad desmielinizante ✗ La enfermedad desmielinizante es otra de las contraindicaciones para iniciar un tratamiento con anti-TNF alfa, ya que como en el caso de la IC se agudizan sus efectos, produciendo empeoramiento a nivel neurológico del paciente.
- ☐ c. Tuberculosis activa
- ☐ d. Insuficiencia cardíaca congestiva

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los siguientes cuadros de toxicidad asociada a azatioprina contraindica el tratamiento con mercaptopurina

Seleccione una:

- ☐ a. Oligospermia
- ☐ b. Náuseas y vómitos
- ☒ c. Pancreatitis aguda ✓ Entre los efectos secundarios descritos, que provocan toxicidad, uno de los más graves es la pancreatitis aguda.
- ☐ d. Fiebre y síndrome pseudogripal

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo extrahospitalario del paciente con EC se deben de tener por objetivos: (señale la FALSA)

Seleccione una:

- ☐ a. Detección precoz de la displasia colica en pacientes con afectación del colon
- ☒ b. No es necesaria la monitorización en la adherencia al tratamiento ✓ A través de las consultas de enfermería de EII, se realiza la monitorización de los pacientes con tratamientos ambulatorios.
- ☐ c. Mantener un vínculo de unión para facilitar las consultas médicas al paciente
- ☐ d. Control de aparición de efectos adversos asociados a tratamientos de mantenimiento

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Debido a las peculiaridades de la EC deben de tenerse en cuenta una serie de consideraciones generales a la hora de realizar una cirugía: (señale la FALSA)

Seleccione una:

- ☐ a. Deben de tratarse exclusivamente las lesiones sintomáticas
- ☒ b. Hay que realizar resecciones intestinales mínimas, y recurrir a estricturoplastias siempre que sea posible ✓ En el caso de realizarse una resección intestinal siempre será lo más extensa y se deberá de recurrir a estricturoplastias siempre que sea posible
- ☐ c. Deben extremarse los cuidados perioperatorios para reducir la morbilidad
- ☐ d. Se debe de evitar el retraso innecesario de la intervención quirúrgica si ésta está indicada

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetivos que se persiguen en el tratamiento médico tanto en la EC como en la CU se definen en los siguientes puntos.

Seleccione una:

- ☐ a. Inducción a la remisión
- ☐ b. Prevención de la recidiva
- ☐ c. Cicatrización de la mucosa
- ☒ d. Todas son correctas ✓ Por tanto, todas las respuestas anteriores son las que nos van a asegurar un manejo eficaz del paciente con EI.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las medidas generales de la EI podemos encontrar:

Seleccione una:

- ☐ a. Medidas nutricionales
- ☐ b. Anticoagulación profiláctica
- ☐ c. Antibioterapia
- ☒ d. Todas son correctas ✓ Por todo esto dentro de las medidas generales de la EI, podemos encontrar las citadas anteriormente.

Señale la opción INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. En la corticorrefractoriedad debe descartarse siempre la reactivación de infección por CMV
- ☐ b. El 80% de los brotes graves van a ser refractarios al tratamiento con corticoides sistémicos
- ☒ c. En los brotes leves de CU de cualquier extensión la mesalazina oral, tópica o Combinada es la opción de elección ✖ Los fármacos empleados en los brotes leves-moderados está indicada la mesalazina en forma tanto oral, tópica o combinada.
- ☐ d. La vía tópica es esencial en la colitis distal y complementaria en la colitis extensa

◀ Test capítulo 1: Fisiopatología y clínica de la EII

Ir a...



Test capítulo 3: Relevancia y manejo de la anemia / déficit de hierro en los pacientes con EII ►