

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [Cuidados intensivos. COVID-19](#) »  
[Consigue tu Diploma](#) » [Cuestionario de evaluación Cuidados intensivos](#)

---

**Comenzado el** jueves, 14 de mayo de 2020, 20:57

---

**Estado** Finalizado

---

**Finalizado en** jueves, 14 de mayo de 2020, 21:42

---

**Tiempo empleado** 45 minutos 43 segundos

---

**Puntos** 26,25/30,00

---

**Calificación** 8,75 de 10,00 (88%)

---

**Comentario -**

**Enhorabuena! has completado correctamente la evaluación.**

próximamente iniciaremos con los tramites requeridos para la emisión del diploma correspondiente a esta formación.

## Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa -0,25 sobre 1,00

Paciente ingresado en nuestro servicio presenta el siguiente ritmo, no responde a estímulos y no palpa pulso. El paciente está intubado. ¿Qué actuación realizaría?



Seleccione una:

- a. Aplicar una cardioversión a 200J sincronizada. ✘
- b. Aplicar descarga lo antes posible y después volver a comprobar el ritmo.
- c. Administrar dosis de antiarrítmico, como por ejemplo Amiodarona.
- d. Iniciar RCP y desfibrilar lo antes posible.

La respuesta correcta es: Iniciar RCP y desfibrilar lo antes posible.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué lugar se posiciona el electrodo rojo para la monitorización?

Seleccione una:

- a. Debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho. ✔
- b. debajo de la clavícula y cerca del hombro izquierdo.
- c. Parte inferior izquierda del abdomen.
- d. Parte inferior derecha del abdomen.

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La escala de Behavioral Pain Scale, valora:

Seleccione una:

- a. expresión facial.
- b. movilidad y conducta de las extremidades superiores.
- c. lucha contra el ventilador.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tazobactam pertenece al grupo:

Seleccione una:

- a. Aminoglucósidos.
- b. Tetraciclinas.
- c. Beta-lactámicos. ✓
- d. Macrólidos.

La respuesta correcta es: Beta-lactámicos.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se puede administrar el Remifentanilo?

Seleccione una:

- a. Bolo directo.
- b. Inyección directa.
- c. Perfusión. ✓
- d. Inyección lenta.

La respuesta correcta es: Perfusión.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las GNAF no se recomiendan en casos de hipercapnia, inestabilidad hemodinámica o fallo multiorgánico.
- b. Las VMNI no se recomienda por no ser efectivo en los pacientes con COVID-19.
- c. Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva. ✓
- d. Las GNAF y la VMNI se usa en casos muy concretos y seleccionados.

La respuesta correcta es: Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva.

## Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los volúmenes pulmonares estáticos encontramos:

Seleccione una:

- a. Capacidad vital forzada
- b. Volumen espiratorio forzado
- c. Índice VEMS
- d. Volumen corriente ✓

La respuesta correcta es: Volumen corriente

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto al equilibrio ácido base:

Seleccione una:

- a. Los valores normales del pH se encuentran en torno a 7,35-7,45
- b. En la acidosis respiratoria la pCO<sub>2</sub> está elevada
- c. En la alcalosis metabólica el HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> está elevado
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la onda de pulso anácrotó ¿qué le puede estar sucediendo al paciente?

Seleccione una:

- a. Estenosis aórtica pronunciada. ✓
- b. Insuficiencia cardíaca avanzada.
- c. Doble lesión aórtica.
- d. taponamiento cardíaco

La respuesta correcta es: Estenosis aórtica pronunciada.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuál de las siguientes acciones no está indicado el uso de guantes:

Seleccione una:

- a. Siempre que se manipule sangre o fluidos.
- b. Siempre que se transporten o toquen superficies o materiales manchados de sangre.
- c. Siempre que se realice una exploración tocando piel íntegra del paciente sin precauciones de contacto. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Siempre que se realice una exploración tocando piel íntegra del paciente sin precauciones de contacto.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no corresponden a los Criterios de Berlin?

Seleccione una:

- a. Temporalidad
- b. Ecografía ✓
- c. Radiografía
- d. Oxigenación

La respuesta correcta es: Ecografía

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuánto tiempo debemos esperar para iniciar las maniobras de intubación orotraqueal después del BNM?

Seleccione una:

- a. 60 – 90 segundos ✓
- b. El tiempo no es importante. La relajación es automática.
- c. menor que 30 segundos
- d. El tiempo es importante. La relajación es automática.

La respuesta correcta es: 60 – 90 segundos

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta sobre la RCP en el paciente infectado por COVID-19:

Seleccione una:

- a. Se debe priorizar la ventilación y oxigenación del paciente.
- b. Si se dispone de ellos, se deben utilizar filtros HEPA para la ventilación del paciente.
- c. Para minimizar la propagación del virus se recomienda la intubación temprana y conexión a ventilación mecánica.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un punto clave para una reanimación de calidad?

Seleccione una:

- a. Comprimir fuerte y rápido.
- b. Dejar que el tórax se expanda entre cada compresión.
- c. Evitar ventilación excesiva.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cuidados a tener en cuenta en la monitorización hemodinámica incluyen todos los

Seleccione una:

- a. Colocar el transductor en el eje flebostático
- b. Mantener la bolsa de suero de lavado bajo presión continua de 300 mmHg
- c. Poner a cero y calibrar los aparatos al menos una vez por turno
- d. Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado ✓

La respuesta correcta es: Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,25 sobre 1,00

Son medidas de prevención de bacteriemia relacionada con el catéter todas excepto:

Seleccione una:

- a. Higiene de manos adecuada.
- b. Desinfección de la piel con solución hidroalcohólica.
- c. Preferencia de localización subclavia. ✗
- d. Medidas de barrera total durante la inserción.

La respuesta correcta es: Desinfección de la piel con solución hidroalcohólica.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La maniobra de pronó está indicada para:

Seleccione una:

- a. Buscar una redistribución de la ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón ✓
- b. Buscar una redistribución de la ventilación hacia las zonas ventrales del pulmón
- c. Establecer un mejor equilibrio en el índice ventilación/percusión
- d. Conseguir un aumento significativo de la hipercapnia.

La respuesta correcta es: Buscar una redistribución de la ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valora la Escala RASS?

Seleccione una:

- a. Agitación
- b. Sedación
- c. a y b son correctas. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué medicación de las siguientes corresponde a la premedicación en la SIR?

Seleccione una:

- a. Fentanilo
- b. Atropina
- c. Adrenalina
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa -0,25 sobre 1,00

Son acciones prioritarias durante la reanimación del paciente con COVID\_19 todas, EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Oxigenación y ventilación. ✗
- b. Detener las compresiones si es necesario para realizar la intubación endotraqueal.
- c. Conectar al paciente a un ventilador con filtro en cuanto sea posible.
- d. Canalizar vía venosa central en cuanto sea posible.

La respuesta correcta es: Canalizar vía venosa central en cuanto sea posible.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. La higiene de manos es la medida más eficaz para evitar la transmisión de microorganismos.
- b. La finalidad de la higiene de manos es evitar la transmisión de microorganismos de los profesionales al paciente y del paciente a los profesionales.
- c. El lavado de manos protege el medio asistencial del microorganismos patógenos.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La probabilidad de que suceda algún evento adverso durante la asistencia sanitaria y tenga un impacto negativo sobre el paciente se denomina:

Seleccione una:

- a. Daño asociado a la atención sanitaria.
- b. Incidente en seguridad del paciente.
- c. Riesgo asistencial. ✓
- d. Circunstancia notificable.

La respuesta correcta es: Riesgo asistencial.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón (AHA), los principios para la resucitación en pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19 son:

Seleccione una:

- a. Reducir la exposición del proveedor a COVID-19.
- b. Limitar el personal en la habitación o lugar donde se encuentre el paciente a los esenciales para el cuidado del paciente.
- c. Considerar la conveniencia de iniciar la reanimación.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta sobre la higiene bucal en el paciente intubado:

Seleccione una:

- a. La higiene bucal debe realizarse utilizando clorhexidina (0,12%-0,2%)
- b. Se protocoliza cada 8 horas. Higiene bucal por turno.
- c. Previamente debe comprobarse que la presión del neumotaponamiento está por encima de 20 cmH<sub>2</sub>O.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la reanimación cardiopulmonar de un paciente en Asistolia, ¿cuál de las siguientes acciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Realizar desfibrilación a 200J tan pronto como sea posible.
- b. Administrar 1mg de Adrenalina en cuanto se disponga de acceso vascular. ✓
- c. Administrar 300mg de Amiodarona después de la tercera descarga.
- d. Realizar compresiones torácicas a una frecuencia de 100 compresiones por minuto como máximo.

La respuesta correcta es: Administrar 1mg de Adrenalina en cuanto se disponga de acceso vascular.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y otras instituciones nacionales, ¿cuál de los siguientes parámetros se pautan para la VM invasiva?

Seleccione una:

- a.  $V_c = 4 - 6$  ml/kg
- b. Driving pressure menor que 15 cmH<sub>2</sub>O
- c. menor que 30 cmH<sub>2</sub>O
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La aspiración continua de secreciones subglóticas y la descontaminación selectiva del tubo digestivo son:

Seleccione una:

- a. Medidas básicas de obligado cumplimiento para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.
- b. Medidas optativas específicas altamente recomendables para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. ✓
- c. a y b son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Medidas optativas específicas altamente recomendables para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son indicaciones del sondaje vesical, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Monitorización estricta de la diuresis en el paciente crítico.
- b. Bajo nivel de conciencia. Sedación profunda.
- c. Manejo de la retención de orina u obstrucción urinaria.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuánto debe durar el lavado de manos con solución hidroalcohólica?

Seleccione una:

- a. 20-30 segundos. ✓
- b. 40-60 segundos.
- c. 60 segundos.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: 20-30 segundos.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes ítems no se mira en el qSOFA?

Seleccione una:

- a. Frecuencia cardiaca ✓
- b. Frecuencia respiratoria.
- c. Tensión arterial sistólica.
- d. Escala de Glasgow

La respuesta correcta es: Frecuencia cardiaca

Fuden inclusiva es una plataforma de formación en abierto, flexible y para todos. Un espacio donde generar y compartir conocimiento.

## CONTACTO

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <http://www.fuden.es/contacto>

 91 758 95 71

