

Pregunta 1

¿Cómo definiría el papel del VPH en la etiología del cáncer de cuello uterino?

a. El VPH constituye una causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero no suficiente. Correcta

Pregunta 2

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.

b. Aproximadamente el 40% de los cánceres de vulva y el 70% de cánceres de vagina son atribuibles al VPH. Correcta

c. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.

Pregunta 3

¿Qué diferencias existen entre un programa de cribado organizado y el cribado oportunista?

a. El objetivo de los programas organizados es llegar a la máxima cobertura de la población objetivo y seguimiento de las mujeres que acuden y de las que no acuden. Correcta

b. El cribado organizado hace peor uso de los recursos disponibles.

c. El cribado organizado garantiza que el menor número de mujeres se beneficiarán del mismo.

Pregunta 4

¿A qué edad deben vacunarse las mujeres para que la vacuna tenga la máxima eficacia?

a. Prioritariamente entre los 9 y los 14 años, porque a esta edad la mayoría de las niñas no habrán tenido todavía relaciones sexuales. Correcta

b. Cualquier mujer puede ser vacunada, la eficacia es independiente de la edad.

c. Sólo pueden ser vacunadas las niñas y mujeres de 15 años que no están infectadas con el VPH.

Pregunta 5:

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico. ¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

a. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección por otros agentes de transmisión sexual. Correcta

b. Antecedentes familiares y ser fumadora.

c. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.

Pregunta 6

¿Es necesario que una mujer vacunada continúe realizándose citologías rutinarias de cribado?

- a. Sí, porque la vacuna no protege contra todos los tipos del VPH y no se conoce la duración de la protección asociada a la vacuna. Probablemente el cribado deba adaptarse para las cohortes de mujeres vacunadas. Correcta
- b. No, si ya está vacunada, no hay que hacerle citologías de cribado.
- c. Sí, pero sólo durante los 5 años siguientes tras la vacunación.

Pregunta 7

¿Cuáles son los niveles de anticuerpos más altos y duraderos, los debidos a la vacuna o los producidos por una infección adquirida?

- a. Aún no hay estudios que nos demuestren si el nivel de anticuerpos es mayor con la vacuna o con la infección natural por VPH.
- b. Los resultados publicados hasta ahora ponen de manifiesto que los individuos inmunizados con la vacuna han reportado respuestas de anticuerpos anti-L1 de VLPs sustancialmente superiores a las observadas en las infecciones naturales. Correcta
- c. Los resultados publicados hasta ahora, demuestran que el nivel de anticuerpos anti-L1 de VLPs en individuos vacunados no tiene ninguna diferencia significativa con los niveles de anticuerpos producidos por una infección adquirida.

Pregunta 8

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

- a. No se ha demostrado la seguridad y eficacia de la vacuna contra el VPH en niños menores de 9 años de edad. Correcta
- b. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en niños menores de 9 años.
- c. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en todas las edades.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia de piel.
- b. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia cervical.
- c. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente. Correcta

Pregunta 10

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es la correcta?

- a. La papilomatosis respiratoria recurrente es una infección de las vías respiratorias por el VPH, que se producen principalmente en los niños menores de 10 años de edad, y principalmente asociada a la transmisión de madres a recién nacidos a través de la exposición a las verrugas genitales en el canal de parto.
- b. La papilomatosis respiratoria recurrente está causada principalmente por los tipos 6 y 11 del VPH, con una pequeña fracción causada por el HPV 16 u otros tipos.
- c. Ambas respuestas son correctas. Correcta

Pregunta 11

¿Cuál es el estado actual de la vacunación contra el VPH en los países en vías de desarrollo?

- a. Desde el año 2013, la gran mayoría de los países en vías de desarrollo han llevado a cabo proyectos de demostración a un coste de 4,50 US\$ por dosis, con el fin de adquirir la experiencia necesaria para la puesta en marcha de programas nacionales de vacunación contra el VPH.
- b. Debido al alto coste de la vacuna y a la complejidad para vacunar a las niñas de 9 a 13 años, las vacunas contra el VPH están disponibles en programas de vacunación sistemática únicamente en los países de altos ingresos.
- c. Desde que GAVI comenzó a apoyar la vacunación contra el VPH en el año 2013, algunos países han sido aceptados para obtener las vacunas a un coste de 4,50 US\$ por dosis. En la mayoría de los casos se trata de proyectos de demostración con el fin de desarrollar la capacidad e infraestructuras necesarias para establecer un programa de vacunación en todo el país. Correcta

Pregunta 12

¿Cuál es la situación actual de las vacunas contra el VPH en relación a las personas infectadas por el VIH?

- a. Las vacunas contra el VPH no están indicadas en las personas infectadas por el VIH.
- b. Ambas vacunas son seguras e inmunogénicas en las personas infectadas por el VIH.
- c. Actualmente se están evaluando la seguridad y la inmunogenicidad de las dos vacunas contra el VPH en las personas infectados por el VIH, pero parecen ser seguras y bien toleradas. Correcta

Pregunta 13

¿Se puede vacunar contra el VPH a una mujer embarazada?

- a. No se recomienda la administración de la vacuna en mujeres embarazadas.
- b. Los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo. En caso de embarazo, la vacunación debe posponerse.
- c. Ambas respuestas son correctas. Correcta

Pregunta 14

Los estudios realizados en países con programas de cribado ya establecidos se han centrado en identificar: el intervalo óptimo entre visitas para cribado, la edad de inicio y de fin del cribado y la consideración de alternativas que contribuyan a mejorar la citología. ¿Cuáles son las principales conclusiones de estos estudios?

- a. Las mujeres entre 25 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba primaria de cribado para las mujeres mayores de 30 o 35 años y reservar la citología para las mujeres más jóvenes VPH positivas. Correcta
- b. Las mujeres entre 18 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el

intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba primaria de cribado y reservar la citología para las mujeres VPH positivas.

c. Las mujeres entre 18 y 65 años constituyen el grupo de edad diana más apropiado para un programa de cribado. Para las mujeres con resultados previos negativos, el intervalo óptimo entre cribados es de 3 a 5 años. Los países deberían considerar la introducción de la detección del VPH como prueba secundaria de cribado para las mujeres con una citología positiva.

Pregunta 15

¿Cuál de las siguientes estrategias puede reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino a nivel mundial?

- a. El uso del preservativo masculino y de la circuncisión masculina.
- b. La vacunación frente al VPH y el cribado del cáncer de cuello uterino. Correcta
- c. Tratamiento y los cuidados paliativos.

Pregunta 16

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a. La proporción del tipo 16 del VPH es similar en las mujeres con lesiones precancerosas que en las mujeres con cáncer de cuello uterino
- b. A medida que disminuye la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.
- c. A medida que se incrementa la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16. Correcta

Pregunta 17

¿A qué edad es más alta la prevalencia del VPH en una población determinada?

- a. La prevalencia del VPH no depende de la edad.
- b. La prevalencia del VPH es más elevada en los adultos jóvenes. Correcta
- c. La prevalencia del VPH es más elevada en la menopausia.

Pregunta 18

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

- a. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.
- b. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida.
- c. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna.

Correcta

Pregunta 19

¿Cuáles son las oncoproteínas que promueven la proliferación y la supervivencia

de las células infectadas por el VPH?

- a. L1 y L2.
- b. E6 y E7. Correcta
- c. E1, E2, E4 y E6.

Pregunta 20

¿Cuál de estas afirmaciones NO es la correcta?

- a. La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen. Correcta
- b. Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.
- c. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.

Pregunta 21

Un tema clave en la introducción de la vacuna del VPH es si vacunar a ambos sexos aumenta significativamente el impacto comparado con vacunar sólo a mujeres.

¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

- a. Vacunar a un número determinado de mujeres consigue mayor reducción que vacunar el mismo número total de ambos sexos. Correcta
- b. Los beneficios de vacunar solo a niñas son limitados.
- c. Vacunar a un solo sexo equivale a lograr la mitad de la cobertura que se conseguiría si se vacunara a ambos sexos.

Pregunta 22

Aunque los tipos del VPH 16, 18 y 45 son los más frecuentes en los casos de cáncer de cuello uterino, su distribución varía de manera significativa entre el carcinoma de células escamosas (CEC) y el adenocarcinoma (ADC).

- a. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con mayor frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.
- b. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con igual frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.
- c. Los tipos del VPH 18 y 45 se encuentran con mayor frecuencia en los adenocarcinomas que en los carcinomas de células escamosas. Correcta

Pregunta 23

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a. En la actualidad, las pruebas de HC2 y la de PCR con GP5+ /6+ e inmunoensayo enzimático han sido clínicamente validadas como método de cribado. Correcta
- b. No existen técnicas clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- c. En la actualidad, hay varias técnicas de PCR comerciales que han sido clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.

Pregunta 24

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH se recomiendan?

- a. Para ambas vacunas se recomienda actualmente una pauta de vacunación de 3 dosis,

- aunque existen varios estudios en curso analizando pautas alternativas. Correcta
- b. Aunque para ambas vacunas se recomienda una pauta de vacunación de tres dosis, una pauta con 2 dosis confiere suficiente protección.
 - c. Las pautas alternativas de vacunación que reducen el número de dosis se han estudiado ampliamente, pero se recomienda la pauta de 3 dosis, porque proporciona una mayor seguridad e inmunogenicidad.

Pregunta 25

¿Debería hacerse la prueba de detección del VPH a toda mujer que desea vacunarse?

- a. Sí, ya que si es positiva para la prueba, se le recomendaría no vacunarse.
- b. No es necesario realizar la prueba de detección del VPH previa a la vacunación.

Correcta

- c. Sí, porque la vacuna sólo es eficaz en las mujeres que sean negativas para los tipos del VPH incluidos en la vacuna.

Pregunta 26

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

- a. Tener nuevas parejas sexuales e iniciación sexual a una edad temprana. Correcta
- b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.
- c. Todas las anteriores.

Pregunta 27

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

- a. La prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello no puede interpretarse como un indicador de causalidad a excepción del caso de los tumores de orofaringe.

Correcta

- b. Si observa una elevada prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello, y es probable que el VPH tenga en este tipo de tumores un rol similar al que tiene en el cáncer de cuello uterino.
- c. Los tumores de cabeza y cuello no están asociados al VPH.

Pregunta 28

¿Cuál de estos problemas está asociado a la infección por VIH?

- a. Una menor probabilidad de detectar las infecciones por el VPH.
- b. Una mayor prevalencia del VPH. Correcta
- c. Un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de la orofaringe.

Pregunta 29

¿Qué regiones del mundo tienen las prevalencias más elevadas de cáncer de cuello uterino?

- a. China y Asia Occidental.
- b. Europa, Norteamérica y Japón.
- c. América Latina y Caribe, África Sub-Sahariana y Asia Central y del Sur. Correcta

Pregunta 30

¿Está la mujer protegida con una sola dosis de vacuna?

- a. Sí, pero sólo en aquellas mujeres menores de 20 años, ya que su sistema inmunitario es mucho más eficaz que el de las mujeres mayores a esa edad.
- b. Por el momento no existen pruebas suficientes de que con una sola dosis la mujer quede totalmente protegida. Correcta
- c. No, con una sola dosis el sistema inmunológico no tiene el tiempo suficiente para generar anticuerpos contra los tipos que incluye la vacuna.

Las preguntas varían. Aquí están mis respuestas.

Pregunta 1

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

Seleccione una:

- a. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida.
- b. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna.

Correcta

- c. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.

Pregunta 2

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. En la actualidad, hay varias técnicas de PCR comerciales que han sido clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- b. No existen técnicas clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- c. En la actualidad, las pruebas de HC2 y la de PCR con GP5+ /6+ e inmunoensayo enzimático han sido clínicamente validadas como método de cribado. Correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un tema clave en la introducción de la vacuna del VPH es si vacunar a ambos sexos aumenta significativamente el impacto comparado con vacunar sólo a mujeres. ¿Cuál de

estas afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

- a. Los beneficios de vacunar solo a niñas son limitados.
- b. Vacunar a un solo sexo equivale a lograr la mitad de la cobertura que se conseguiría si se vacunara a ambos sexos.
- c. Vacunar a un número determinado de mujeres consigue mayor reducción que vacunar el mismo número total de ambos sexos. Correcta

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico. ¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

Seleccione una:

- a. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección por otros agentes de transmisión sexual. Correcta
- b. Antecedentes familiares y ser fumadora.
- c. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué pasa si se vacuna a una mujer que ya está infectada por el VPH?

Seleccione una:

- a. La vacuna es perjudicial en mujeres ya infectadas por el VPH y no se recomienda su uso en este grupo de mujeres.
- b. La vacuna no sería perjudicial pero tampoco le proporcionará ningún tipo de efecto beneficioso ya que la paciente ya sufre una infección por VPH.
- c. La vacuna le proporcionará un cierto beneficio. Aunque la vacuna no tiene un efecto terapéutico demostrado, le proporcionará inmunidad contra los tipos vacunales para los que no está infectada. Correcta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad es más alta la prevalencia del VPH en una población determinada?

Seleccione una:

- a. La prevalencia del VPH no depende de la edad.
- b. La prevalencia del VPH es más elevada en los adultos jóvenes. Correcta
- c. La prevalencia del VPH es más elevada en la menopausia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos problemas está asociado a la infección por VIH?

Seleccione una:

- a. Una menor probabilidad de detectar las infecciones por el VPH.
- b. Un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de la orofaringe.
- c. Una mayor prevalencia del VPH. Correcta

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones no es la correcta?

Seleccione una:

- a. Las lesiones precancerosas son a menudo sintomáticas. Correcta
- b. CIN 3 es un precursor cierto del cáncer.
- c. CIN 1 es una lesión que indica que existe una infección por el VPH.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Las vacunas contra el VPH, actualmente disponibles, son vacunas profilácticas o terapéuticas?

Seleccione una:

- a. Profilácticas y terapéuticas.
- b. Terapéuticas.
- c. Profilácticas. Correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los factores que pueden reducir el riesgo de infección por el VPH?

(Existe más de una respuesta correcta)

Seleccione una o más de una:

- a. Uso de preservativo masculino. Correcta
- b. Bajo consumo de carne.
- c. Circuncisión masculina. Correcta

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente. Correcta
- b. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia de piel.
- c. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia cervical.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes estrategias puede reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino a nivel mundial?

Seleccione una:

- a. Tratamiento y los cuidados paliativos.
- b. La vacunación frente al VPH y el cribado del cáncer de cuello uterino. Correcta
- c. El uso del preservativo masculino y de la circuncisión masculina.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones NO es la correcta?

Seleccione una:

- a. Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.
- b. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.
- c. La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen. Correcta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué regiones del mundo tienen las prevalencias más elevadas de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. Europa, Norteamérica y Japón.
- b. China y Asia Occidental.
- c. América Latina y Caribe, África Sub-Sahariana y Asia Central y del Sur. Correcta

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH se recomiendan?

Seleccione una:

- a. Aunque para ambas vacunas se recomienda una pauta de vacunación de tres dosis, una pauta con 2 dosis confiere suficiente protección.
- b. Para ambas vacunas se recomienda actualmente una pauta de vacunación de 3 dosis, aunque existen varios estudios en curso analizando pautas alternativas. Correcta
- c. Las pautas alternativas de vacunación que reducen el número de dosis se han estudiado ampliamente, pero se recomienda la pauta de 3 dosis, porque proporciona una mayor seguridad e inmunogenicidad.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.
- b. Aproximadamente el 40% de los cánceres de vulva y el 70% de cánceres de vagina son atribuibles al VPH. Correcta
- c. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las oncoproteínas que promueven la proliferación y la supervivencia de las células infectadas por el VPH?

Seleccione una:

- a. L1 y L2.
- b. E1, E2, E4 y E6.
- c. E6 y E7. Correcta

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesaria la aplicación de una "dosis de recuerdo" después de las 3 dosis de la vacuna?

Seleccione una:

- a. Por ahora no se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo. Correcta
- b. No. Está suficientemente demostrado que con las tres dosis que forman la vacuna está protegida de por vida.
- c. Sí, pero sólo en mujeres mayores de 26 años.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aunque los tipos del VPH 16, 18 y 45 son los más frecuentes en los casos de cáncer de cuello uterino, su distribución varía de manera significativa entre el carcinoma de células escamosas (CEC) y el adenocarcinoma (ADC).

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con igual frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.
- b. Los tipos del VPH 18 y 45 se encuentran con mayor frecuencia en los adenocarcinomas que en los carcinomas de células escamosas. Correcta
- c. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con mayor frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad deben vacunarse las mujeres para que la vacuna tenga la máxima eficacia?

Seleccione una:

- a. Sólo pueden ser vacunadas las niñas y mujeres de 15 años que no están infectadas con el VPH.
- b. Prioritariamente entre los 9 y los 14 años, porque a esta edad la mayoría de las niñas no habrán tenido todavía relaciones sexuales. Correcta
- c. Cualquier mujer puede ser vacunada, la eficacia es independiente de la edad.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

Seleccione una:

- a. Tener nuevas parejas sexuales e iniciación sexual a una edad temprana. Correcta
- b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.
- c. Todas las anteriores.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el cribado del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. El cribado de cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública que se realiza en una población asintomática cuyo objetivo es prevenir la incidencia y mortalidad por cáncer invasivo mediante la detección precoz de las lesiones precancerosas. Correcta
- b. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública realizada en forma independiente de un programa organizado o en base poblacional.
- c. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública diseñada por una estructura central de salud pública para alcanzar la mayor cobertura posible de las mujeres.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en todas las edades.
- b. No se ha demostrado la seguridad y eficacia de la vacuna contra el VPH en niños

menores de 9 años de edad. Correcta

c. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en niños menores de 9 años.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

a. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente en las mujeres, pero la incidencia es particularmente elevada en los hombres.

b. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente, pero la incidencia es especialmente elevada entre los hombres que tienen sexo con hombres. Correcta

c. El cáncer anal es el tumor con mayor incidencia entre los tumores anogenitales asociados al VPH.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar contra el VPH a una mujer embarazada?

Seleccione una:

a. No se recomienda la administración de la vacuna en mujeres embarazadas.

b. Los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo. En caso de embarazo, la vacunación debe posponerse.

c. Ambas respuestas son correctas. Correcta

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los niveles de anticuerpos más altos y duraderos, los debidos a la vacuna o los producidos por una infección adquirida?

Seleccione una:

a. Los resultados publicados hasta ahora, demuestran que el nivel de anticuerpos anti-L1 de VLPs en individuos vacunados no tiene ninguna diferencia significativa con los niveles de anticuerpos producidos por una infección adquirida.

b. Los resultados publicados hasta ahora ponen de manifiesto que los individuos inmunizados con la vacuna han reportado respuestas de anticuerpos anti-L1 de VLPs sustancialmente superiores a las observadas en las infecciones naturales. Correcta

c. Aún no hay estudios que nos demuestren si el nivel de anticuerpos es mayor con la

vacuna o con la infección natural por VPH.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. A medida que disminuye la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.
- b. A medida que se incrementa la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16. Correcta
- c. La proporción del tipo 16 del VPH es similar en las mujeres con lesiones precancerosas que en las mujeres con cáncer de cuello uterino.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el estado actual de la vacunación contra el VPH en los países en vías de desarrollo?

Seleccione una:

- a. Desde que GAVI comenzó a apoyar la vacunación contra el VPH en el año 2013, algunos países han sido aceptados para obtener las vacunas a un coste de 4,50 US\$ por dosis. En la mayoría de los casos se trata de proyectos de demostración con el fin de desarrollar la capacidad e infraestructuras necesarias para establecer un programa de vacunación en todo el país. Correcta
- b. Debido al alto coste de la vacuna y a la complejidad para vacunar a las niñas de 9 a 13 años, las vacunas contra el VPH están disponibles en programas de vacunación sistemática únicamente en los países de altos ingresos.
- c. Desde el año 2013, la gran mayoría de los países en vías de desarrollo han llevado a cabo proyectos de demostración a un coste de 4,50 US\$ por dosis, con el fin de adquirir la experiencia necesaria para la puesta en marcha de programas nacionales de vacunación contra el VPH.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se podría vacunar a una paciente con VIH?

Seleccione una:

- a. No se recomienda la administración de la vacuna en pacientes VIH positivos, pues se ha establecido que no se segura.
- b. Sí se podría vacunar. El hecho de estar infectada por el VIH no representa, en ningún caso, una contraindicación para la vacuna frente al VPH. Correcta
- c. No, no se podría vacunar en ningún caso, porque en personas inmunodeprimidas, el riesgo de quedar infectadas por los tipos del VPH que contiene la vacuna es muy alto.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. Si observa una elevada prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello, y es probable que el VPH tenga en este tipo de tumores un rol similar al que tiene en el cáncer de cuello uterino.
- b. La prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello no puede interpretarse como un indicador de causalidad a excepción del caso de los tumores de orofaringe.
- Correcta
- c. Los tumores de cabeza y cuello no están asociados al VPH.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es la correcta?

- a. La papilomatosis respiratoria recurrente es una infección de las vías respiratorias por el VPH, que se producen principalmente en los niños menores de 10 años de edad, y principalmente asociada a la transmisión de madres a recién nacidos a través de la exposición a las verrugas genitales en el canal de parto.
- b. La papilomatosis respiratoria recurrente está causada principalmente por los tipos 6 y 11 del VPH, con una pequeña fracción causada por el HPV 16 u otros tipos.
- c. Ambas respuestas son correctas. CORRECTA

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

- a. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna.

CORRECTA

- b. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.
- c. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún

efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida

Las preguntas varían. Aquí están mis respuestas.

Pregunta 1

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una mujer acude a la consulta. Hace 2 años fue tratada por una lesión de alto grado. Actualmente se le ha hecho una citología con diagnóstico de ASC-US y nos pregunta si se puede vacunar. ¿Sería efectiva la vacuna para esta mujer?

Seleccione una:

- a. No tendría sentido, la vacuna no sería perjudicial pero tampoco le causaría ningún efecto beneficioso ya que la paciente está afectada por una infección por VPH previamente establecida.
- b. La vacuna no tiene ningún efecto terapéutico, pero le puede conferir inmunidad para aquellos tipos para los que aún no esté infectada y estén contenidos en la vacuna. Correcta
- c. Quedaría inmunizada igualmente, la eficacia de la vacuna es independiente de una infección previa.

Pregunta 2

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. En la actualidad, hay varias técnicas de PCR comerciales que han sido clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- b. No existen técnicas clínicamente validadas para ser utilizadas como método de cribado.
- c. En la actualidad, las pruebas de HC2 y la de PCR con GP5+ /6+ e inmunoensayo enzimático han sido clínicamente validadas como método de cribado. Correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un tema clave en la introducción de la vacuna del VPH es si vacunar a ambos sexos aumenta significativamente el impacto comparado con vacunar sólo a mujeres. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

- a. Los beneficios de vacunar solo a niñas son limitados.
- b. Vacunar a un solo sexo equivale a lograr la mitad de la cobertura que se conseguiría si se vacunara a ambos sexos.
- c. Vacunar a un número determinado de mujeres consigue mayor reducción que vacunar el mismo número total de ambos sexos. Correcta

Pregunta 4

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Muchas mujeres adquieren una infección por VPH, pero la gran mayoría de estas infecciones no progresan a cáncer de cérvix. Así pues, probablemente otros co-factores intervienen en el proceso patológico. ¿Cuáles de estos co-factores han sido establecidos en la carcinogénesis cervical?

Seleccione una:

- a. Alta paridad, uso a largo plazo de anticonceptivos orales, ser fumadora y co-infección por otros agentes de transmisión sexual. Correcta
- b. Antecedentes familiares y ser fumadora.

c. Dieta rica en grasas saturadas y el uso de algunos fármacos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué pasa si se vacuna a una mujer que ya está infectada por el VPH?

Seleccione una:

- a. La vacuna es perjudicial en mujeres ya infectadas por el VPH y no se recomienda su uso en este grupo de mujeres.
- b. La vacuna no sería perjudicial pero tampoco le proporcionará ningún tipo de efecto beneficioso ya que la paciente ya sufre una infección por VPH.
- c. La vacuna le proporcionará un cierto beneficio. Aunque la vacuna no tiene un efecto terapéutico demostrado, le proporcionará inmunidad contra los tipos vacunales para los que no está infectada.

Correcta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad es más alta la prevalencia del VPH en una población determinada?

Seleccione una:

- a. La prevalencia del VPH no depende de la edad.
- b. La prevalencia del VPH es más elevada en los adultos jóvenes. Correcta
- c. La prevalencia del VPH es más elevada en la menopausia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos problemas está asociado a la infección por VIH?

Seleccione una:

- a. Una menor probabilidad de detectar las infecciones por el VPH.
- b. Un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de la orofaringe.
- c. Una mayor prevalencia del VPH. Correcta

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones no es la correcta?

Seleccione una:

- a. Las lesiones precancerosas son a menudo sintomáticas. Correcta
- b. CIN 3 es un precursor cierto del cáncer.
- c. CIN 1 es una lesión que indica que existe una infección por el VPH.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Las vacunas contra el VPH, actualmente disponibles, son vacunas profilácticas o terapéuticas?

Seleccione una:

- a. Profilácticas y terapéuticas.
- b. Terapéuticas.
- c. Profilácticas. Correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los factores que pueden reducir el riesgo de infección por el VPH?

(Existe más de una respuesta correcta)

Seleccione una o más de una:

- a. Uso de preservativo masculino. Correcta
- b. Bajo consumo de carne.
- c. Circuncisión masculina. Correcta

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente. Correcta
- b. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia de piel.
- c. Los tipos del VPH 6 y 11 son responsables de la mayoría de casos de neoplasia cervical.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes estrategias puede reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino a nivel mundial?

Seleccione una:

- a. Tratamiento y los cuidados paliativos.
- b. La vacunación frente al VPH y el cribado del cáncer de cuello uterino. Correcta
- c. El uso del preservativo masculino y de la circuncisión masculina.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones NO es la correcta?

Seleccione una:

- a. Las infecciones por VPH, que persisten durante 2 o más años están altamente vinculadas a las lesiones precancerosas.
- b. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una cadena de eventos que pueden tardar más de 10 años en desarrollarse.
- c. La mayoría de las infecciones en las mujeres jóvenes no desaparecen. Correcta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué regiones del mundo tienen las prevalencias más elevadas de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. Europa, Norteamérica y Japón.
- b. China y Asia Occidental.
- c. América Latina y Caribe, África Sub-Sahariana y Asia Central y del Sur. Correcta

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el VPH se recomiendan?

Seleccione una:

- a. Aunque para ambas vacunas se recomienda una pauta de vacunación de tres dosis, una pauta con 2 dosis confiere suficiente protección.
- b. Para ambas vacunas se recomienda actualmente una pauta de vacunación de 3 dosis, aunque existen varios estudios en curso analizando pautas alternativas. Correcta
- c. Las pautas alternativas de vacunación que reducen el número de dosis se han estudiado ampliamente, pero se recomienda la pauta de 3 dosis, porque proporciona una mayor seguridad e inmunogenicidad.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 60% de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe son atribuibles al VPH.
- b. Aproximadamente el 40% de los cánceres de vulva y el 70% de cánceres de vagina son atribuibles al VPH. Correcta
- c. Aproximadamente el 100% de los cánceres de pene y el 40% de los cánceres anales son atribuibles al VPH.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las oncoproteínas que promueven la proliferación y la supervivencia de las células infectadas por el VPH?

Seleccione una:

- a. L1 y L2.
- b. E1, E2, E4 y E6.
- c. E6 y E7. Correcta

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesaria la aplicación de una "dosis de recuerdo" después de las 3 dosis de la vacuna?

Seleccione una:

- a. Por ahora no se ha establecido la necesidad de una dosis de recuerdo. Correcta
- b. No. Está suficientemente demostrado que con las tres dosis que forman la vacuna está protegida de por vida.
- c. Sí, pero sólo en mujeres mayores de 26 años.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aunque los tipos del VPH 16, 18 y 45 son los más frecuentes en los casos de cáncer de cuello uterino, su distribución varía de manera significativa entre el carcinoma de células escamosas (CEC) y el adenocarcinoma (ADC).

Seleccione una:

- a. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con igual frecuencia en los CEC's que en los adenocarcinomas.
- b. Los tipos del VPH 18 y 45 se encuentran con mayor frecuencia en los adenocarcinomas que en los carcinomas de células escamosas. Correcta
- c. Los tipos del VPH 18 y 45 se detectan con mayor frecuencia en los CEC's que en los

adenocarcinomas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad deben vacunarse las mujeres para que la vacuna tenga la máxima eficacia?

Seleccione una:

- a. Sólo pueden ser vacunadas las niñas y mujeres de 15 años que no están infectadas con el VPH.
- b. Prioritariamente entre los 9 y los 14 años, porque a esta edad la mayoría de las niñas no habrán tenido todavía relaciones sexuales. Correcta
- c. Cualquier mujer puede ser vacunada, la eficacia es independiente de la edad.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué comportamientos aumentan el riesgo de exposición al VPH?

Seleccione una:

- a. Tener nuevas parejas sexuales e iniciación sexual a una edad temprana. Correcta
- b. La paridad y el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales.
- c. Todas las anteriores.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el cribado del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- a. El cribado de cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública que se realiza en una población asintomática cuyo objetivo es prevenir la incidencia y mortalidad por cáncer invasivo mediante la detección precoz de las lesiones precancerosas. Correcta
- b. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública realizada en forma independiente de un programa organizado o en base poblacional.
- c. El cribado del cáncer de cuello uterino es una intervención de salud pública diseñada por una estructura central de salud pública para alcanzar la mayor cobertura posible de las mujeres.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en todas las edades.
- b. No se ha demostrado la seguridad y eficacia de la vacuna contra el VPH en niños menores de 9 años de edad. Correcta
- c. La vacuna contra el VPH es segura y eficaz en niños menores de 9 años.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente en las mujeres, pero la incidencia es particularmente elevada en los hombres.
- b. El cáncer anal es una neoplasia poco frecuente, pero la incidencia es especialmente elevada entre los

hombres que tienen sexo con hombres. Correcta

c. El cáncer anal es el tumor con mayor incidencia entre los tumores anogenitales asociados al VPH.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar contra el VPH a una mujer embarazada?

Seleccione una:

a. No se recomienda la administración de la vacuna en mujeres embarazadas.

b. Los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo. En caso de embarazo, la vacunación debe posponerse.

c. Ambas respuestas son correctas. Correcta

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los niveles de anticuerpos más altos y duraderos, los debidos a la vacuna o los producidos por una infección adquirida?

Seleccione una:

a. Los resultados publicados hasta ahora, demuestran que el nivel de anticuerpos anti-L1 de VLPs en individuos vacunados no tiene ninguna diferencia significativa con los niveles de anticuerpos producidos por una infección adquirida.

b. Los resultados publicados hasta ahora ponen de manifiesto que los individuos inmunizados con la vacuna han reportado respuestas de anticuerpos anti-L1 de VLPs sustancialmente superiores a las observadas en las infecciones naturales. Correcta

c. Aún no hay estudios que nos demuestren si el nivel de anticuerpos es mayor con la vacuna o con la infección natural por VPH.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

a. A medida que disminuye la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16.

b. A medida que se incrementa la severidad de las lesiones, también aumenta el papel del VPH del tipo 16. Correcta

c. La proporción del tipo 16 del VPH es similar en las mujeres con lesiones precancerosas que en las mujeres con cáncer de cuello uterino.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el estado actual de la vacunación contra el VPH en los países en vías de desarrollo?

Seleccione una:

a. Desde que GAVI comenzó a apoyar la vacunación contra el VPH en el año 2013, algunos países han sido aceptados para obtener las vacunas a un coste de 4,50 US\$ por dosis. En la mayoría de los casos se trata de proyectos de demostración con el fin de desarrollar la capacidad e infraestructuras necesarias para establecer un programa de vacunación en todo el país. Correcta

b. Debido al alto coste de la vacuna y a la complejidad para vacunar a las niñas de 9 a 13 años, las vacunas contra el VPH están disponibles en programas de vacunación sistemática únicamente en los países de altos ingresos.

c. Desde el año 2013, la gran mayoría de los países en vías de desarrollo han llevado a cabo proyectos de demostración a un coste de 4,50 US\$ por dosis, con el fin de adquirir la experiencia necesaria para la puesta en marcha de programas nacionales de vacunación contra el VPH.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se podría vacunar a una paciente con VIH?

Seleccione una:

- a. No se recomienda la administración de la vacuna en pacientes VIH positivos, pues se ha establecido que no se segura.
- b. Sí se podría vacunar. El hecho de estar infectada por el VIH no representa, en ningún caso, una contraindicación para la vacuna frente al VPH. Correcta
- c. No, no se podría vacunar en ningún caso, porque en personas inmunodeprimidas, el riesgo de quedar infectadas por los tipos del VPH que contiene la vacuna es muy alto.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta?

Seleccione una:

- a. Si observa una elevada prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello, y es probable que el VPH tenga en este tipo de tumores un rol similar al que tiene en el cáncer de cuello uterino.
- b. La prevalencia del VPH en los tumores de cabeza y cuello no puede interpretarse como un indicador de causalidad a excepción del caso de los tumores de orofaringe. Correcta
- c. Los tumores de cabeza y cuello no están asociados al VPH.