

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS - 2ª EDICIÓN

[Página Principal](#) / [DF-CEU](#) / [Módulo 2: Actualizac...](#) / [Prueba de conocimi...](#)

Comenzado el
domingo, 6 de noviembre de 2022, 10:37

Estado
Finalizado

Finalizado en
domingo, 6 de noviembre de 2022, 10:50

Tiempo empleado
13 minutos 23 segundos

Puntos
20,00/20,00

Calificación
10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -
Apto

PREGUNTA 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes, cuál no es por si sólo, un criterio de exclusión del código ICTUS:

Seleccione una:

- a. Convulsiones.
- b. GCS de 8.
- c. Ranking de 4.
- d. 87 años de edad. ✓

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El omeprazol es:

Seleccione una:

- a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- c. Un antiemético.
- d. Un emetizante.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

- a. Un patrón Electrocardiográfico.
- b. Respiratorio. ✓
- c. Diabético.
- d. Urinario.

PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que es el estado proscritico de un paciente:

Seleccione una:

- a. Periodo limitado de desorientación, bradipsiquia y otros déficit neurológicos, tras un crisis convulsiva. ✓
- b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.
- c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.
- d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el shock hipovolémico la dopamina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- a. 200mg + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que 10µgr/kg/min = 21 ml/h. ✓
- b. 200ml + 245 ml SG/Dx5% o SSF 0,9 a ritmo mayor o igual que 10µgr/kg/min = 21 ml/h.
- c. 70 gr.
- d. 100mg+100 ml de SSF 0.9%.

PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, cuál es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipos:

Seleccione una:

- a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- d. Nunca se modifica la función respiratoria.

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es un signo de complicación en un cólico reno ureteral:

Seleccione una:

- a. Fiebre. ✓
- b. Vómitos.
- c. Dolor.
- d. Disuria.

PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es un coloide natural:

Seleccione una:

- a. Gelafundina.
- b. Hemoce.
- c. Voluven.
- d. Albúmina. ✓

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el shock hipovolémico la Noradrenalina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- a. 6 mg + 44 ml de SG/Dx 5% a 4 ml/h de inicio. ✓
- b. 6 mg en bolo sin disolver.
- c. 6 mg + 50 ml de Sg/Dx 5% o SSF 0,9 a 8 ml/h.
- d. 12 mg + 88 ml de SG/Dx 5% a 16 ml/min inicialmente.

PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por muchos coloides y cristaloides que perfundamos a un paciente en shock, tenemos que tener claro que a diferencia de los hemoderivados, la citada sueroterapia no aporta:

Seleccione una:

- a. Volumen.
- b. Aumento de tensión arterial.
- c. Capacidad de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. ✓
- d. Lavado gástrico.

PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

NO es un tipo de SHOCK:

Seleccione una:

- a. Hipovolémico.
- b. Cardiogénico.
- c. Séptico.
- d. Anaerobio. ✓

PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que tipo de shock aparece una piel caliente y sonrojada en el paciente:

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico.
- b. Shock séptico. ✓
- c. Shock cardiogénico.
- d. Shock neurogénico.

PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis inicial de insulina en bolo IV ante una cetoacidosis diabética será de:

Seleccione una:

- a. 15 U.I.
- b. 10 U.I. de insulina regular/rápida. ✓
- c. 10 U.I de insulina NPH.
- d. 12 U.I de insulina rápida/regular.

PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes, cuál es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:

- a. Nauseas.
- b. Cefalea.
- c. Malestar general.
- d. Mareo con giro de objetos. ✓

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. El pH.
- b. K+.
- c. Edema cerebral.
- d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tratamiento de elección ante sospecha de úlcera en un dolor abdominal:

Seleccione una:

- a. Omeprazol.
- b. Ondansetron.
- c. Buscapina.
- d. Omeprazol y Ranitidina. ✓

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- a. Los vómitos.
- b. El agotamiento. ✓
- c. La infección.
- d. El mareo.

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Medicación de primera elección en caso de urgencia hipertensiva:

Seleccione una:

- a. Captopril 25mg VO. o SL. ✓
- b. Furosemida 40 mg IV.
- c. Labetalol cápsulas de 20 mg VO.
- d. Tarka 180mg/2mg (verapamilo/trandolapril) VO.

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una solución cristalóide hipertónica:

Seleccione una:

- a. Ringer Lactato. ✓
- b. Bicarbonato 1M.
- c. Glucosa 20%.
- d. Salino al 7,5 %.

PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotóxica:

Seleccione una:

- a. Penicilinas.
- b. Gluten.
- c. Yodo. ✓
- d. Polen.

[◀ Documento de estudio](#)[Ir a...](#)[Caso práctico: Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en urgencias ▶](#)**MENÚ PRINCIPAL**

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas