

Comenzado el	miércoles, 21 de junio de 2017, 10:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 21 de junio de 2017, 11:02
Tiempo empleado	19 minutos 16 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la administración intramuscular de fármacos es falsa:
Seleccione una:

- a. En el músculo deltoides se administran fármacos en poco volumen (2 ml)
- b. En insuficiencia cardíaca la absorción se encuentra aumentada
- c. Se realiza en músculos muy irrigados
- d. El flujo sanguíneo que irriga el músculo condiciona la absorción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En insuficiencia cardíaca la absorción se encuentra aumentada

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vía de administración intrarraquídea y epidural de fármacos es correcta:
Seleccione una:

- a. En la administración epidural el efecto farmacológico es prácticamente inmediato
- b. La administración epidural conlleva menor duración de la acción farmacológica
- c. En la administración intratecal el fármaco debe difundir al espacio subaracnoideo
- d. Ambas vías presentan un mayor riesgo de neurotoxicidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas vías presentan un mayor riesgo de neurotoxicidad

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes fármacos se monitorizan habitualmente en la práctica clínica:
Seleccione una:

- a. Teicoplanina
- b. Digoxina
- c. Gentamicina y digoxina
- d. Gentamicina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gentamicina y digoxina

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De la relación fármaco-efecto secundario en el recién nacido uno de ellos es incorrecto:

Seleccione una:

- a. Tetraciclinas - tinción de dientes
- b. Opioides - síndrome de abstinencia
- c. Betabloqueantes - taquicardia
- d. Aminoglucósidos - ototoxicidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Betabloqueantes - taquicardia

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El valor del aclaramiento de creatinina en la insuficiencia renal severa es:

Seleccione una:

- a. <15
- b. 30-60
- c. <5
- d. 15-30

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15-30

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el anciano la excreción de fármacos puede verse alterada por:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Disminución velocidad de filtración glomerular.
- c. Disminución flujo sanguíneo renal.
- d. Disminución secreción tubular activa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el embarazo los cambios fisiológicos pueden alterar la respuesta a los fármacos. Uno de ellos es incorrecto:

Seleccione una:

- a. Disminución de la secreción ácida y aumento de la secreción de moco: Aumento pH gástrico
- b. Disminución de la secreción de ácidos biliares
- c. Disminución albúmina sérica: Disminución Unión a proteínas plasmáticas

d. Disminución del volumen sanguíneo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución del volumen sanguíneo

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el enfermo renal, los cambios farmacodinámicos pueden alterar la respuesta a fármacos. Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Aumento del riesgo de hiperpotasemia con diuréticos ahorradores de potasio
- b. Aumento del riesgo de hemorragia gastrointestinal por AAS
- c. Aumento del riesgo de hiperglucemia con sulfonilureas
- d. Aumento de la acción depresora del SNC de opiodes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento del riesgo de hiperglucemia con sulfonilureas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la toma de muestras para la determinación de los niveles séricos de un fármaco, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- a. En general se suele extraer la muestra en la concentración mínima o valle
- b. Se extraen 3-5 ml de sangre de una vía periférica
- c. Se debe extraer la muestra del mismo catéter por el que se administra la medicación
- d. Es necesario conocer la hora exacta de la última dosis y la de la extracción de la muestra

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe extraer la muestra del mismo catéter por el que se administra la medicación

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La absorción de fármacos vía oral puede verse condicionada por múltiples factores. Uno de ellos es falso:

Seleccione una:

- a. Efecto de primer paso hepático
- b. Interacciones fármaco-alimento
- c. pH
- d. Es independiente de la forma farmacéutica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es independiente de la forma farmacéutica

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La absorción de un fármaco desde su administración hasta que llega al torrente sanguíneo depende de:
Seleccione una:

- a. La velocidad de liberación del fármaco de la forma farmacéutica
- b. La velocidad de disolución del fármaco
- c. Efecto del primer paso hepático
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La concentración que alcanzan los fármacos en el lactante no depende de:
Seleccione una:

- a. Horario de administración del fármaco y horario de toma del lactante.
- b. Todas son correctas
- c. Capacidad del fármaco para acceder a la leche
- d. Edad del lactante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La reacción idiosincrásica:
Seleccione una:

- a. B y C son ciertas
- b. B Es una reacción determinada genéticamente
- c. A Es una respuesta normal frente a un fármaco
- d. C Puede provocar un aumento o disminución del efecto terapéutico, del efecto tóxico o la aparición de un efecto nuevo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son ciertas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía de administración que origina el mayor número de errores de medicación y reacciones adversas en pediatría es:
Seleccione una:

- a. Inhalatoria
- b. Tópica
- c. Oral

d. Intravenosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intravenosa

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mediante que proceso un fármaco puede ser reabsorbido desde la orina:

Seleccione una:

- a. Filtración glomerular
- b. Ningún fármaco puede ser reabsorbido desde la orina
- c. Secreción tubular

d. Reabsorción tubular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reabsorción tubular

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para que un fármaco pueda acceder al lugar de acción y ejercer su efecto farmacológico debe encontrarse:

Seleccione una:

- a. De forma libre
- b. Todas son falsas
- c. Unido a células sanguíneas
- d. Unido a proteínas plasmáticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De forma libre

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes características de los efectos secundarios es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Frecuente
- b. Dosis-independiente
- c. Predecible
- d. Baja mortalidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dosis-independiente

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes vías de administración no es inmediata o directa:
Seleccione una:

- a. Intracardiaca
- b. Intradérmica
- c. Intraperitoneal
- d. Transdérmica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transdérmica

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los cambios fisiológicos que se producen en el anciano no es correcto:
Seleccione una:

- a. Disminución del flujo sanguíneo gastrointestinal
- b. Disminución motilidad intestinal
- c. Disminución de la actividad enzimática
- d. Disminución secreción ácida gástrica: disminución del pH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución secreción ácida gástrica: disminución del pH

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes fármacos no es un inductor enzimático
Seleccione una:

- a. Fenobarbital
- b. Carbamazepina
- c. Claritromicina
- d. Rifampicina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Claritromicina