

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Tras realizar un bloqueo central para el parto se debe realizar:

Seleccione una:

- a. Monitorización fetal
- b. Monitorización de la hemodinámica materna
- c. Sondaje urinario intermitente
- ☒ d. Todas se deben hacer ✓

La respuesta correcta es: Todas se deben hacer

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

A diferencia del bloqueo epidural, en el bloqueo subaracnoideo es cierto que:

Seleccione una:

- a. Su efecto se inicia más lentamente
- ☒ b. Las dosis de anestésico es mucho menor ✓
- c. Se puede producir un bloqueo parcheado
- d. Todas son propias del bloqueo epidural

La respuesta correcta es: Las dosis de anestésico es mucho menor

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

En la analgesia epidural para el trabajo del parto es cierto que:

Seleccione una:

- a. La paciente tarda en notar la analgesia unos cinco minutos
- ☒ b. La falta de mejoría a los 30-40 minutos indica un posible fallo de la epidural ✓
- c. La analgesia comienza por abajo, por el periné
- d. Infrecuentemente es causa de temblor

La respuesta correcta es: La falta de mejoría a los 30-40 minutos indica un posible fallo de la epidural

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Para un bloqueo intradural:

Seleccione una:

- a. Se utiliza la aguja de Tuohy
- ☒ b. Se utiliza la aguja de Whitacre o de punta de lápiz ✓
- c. Se utilizan agujas de grueso calibre del 18G
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Se utiliza la aguja de Whitacre o de punta de lápiz

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Son consecuencias de un bloqueo central:

Seleccione una:

- a. Pérdida de fuerza en las piernas
- b. Retención urinaria
- c. Íleo intestinal
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas