

**Señale cuál de las siguientes circunstancias se desarrolla en España en la actualidad en relación con el tabaquismo:**

- a) Baja capacidad para dañar la salud b) Intervención homogénea por parte de los profesionales de la salud c) Imposibilidad de prescribir tratamiento farmacológico d) **Posibilidad de desarrollar intervención mínima frente al tabaquismo en consulta** e) Formación específica en Tabaquismo de carácter obligatorio

**Señale el obstáculo fundamental en el tratamiento de los fumadores por parte de los profesionales sanitarios.**

- a) Apoyo institucional inadecuado b) Limitaciones de tiempo c) Falta de formación adecuada de todos los profesionales d) Deficiente organización del trabajo e) **Todas son verdaderas**

**¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?**

- a) Una alta proporción de fumadores consigue la abstinencia tras 12 meses en su primer intento b) Es poco habitual mantener periodos alternos de abstinencia y recaídas c) **Más del 70% de fumadores desearía dejar de fumar, y aproximadamente el 27% lo ha intentado en el último año** d) Tras la recaída se debe iniciar un nuevo proceso cuanto antes e) El proceso de acercamiento previo al inicio del intento de abandono tiene escasa importancia en el resultado final

**En relación con la estrategia Mpower, señale la afirmación falsa:**

- a) **<i>Raise</i>: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio** b) **<i>Monitor</i>: vigilar el consumo de tabaco** c) **<i>Offer</i>: ofrecer ayuda para el abandono** d) **<i>Warm</i>: advertir de los peligros del tabaco** e) Todas son verdaderas

**Señale la opción correcta de la encuesta EDADES 2017/2018 con relación al consumo de tabaco:**

- a) Ha fumado alguna vez en la vida: 39,7% b) En los últimos doce meses: 25,6% c) **Últimos treinta días: 38,8%** d) Diariamente en los últimos treinta días 14% e) Los últimos fines de semana, un 73%

**Con relación al humo ambiental del tabaco, señale la aseveración acertada:**

- a) El tabaquismo pasivo es la exposición voluntaria al aire contaminado por el humo del tabaco b) Al tabaquismo pasivo se le atribuye el 30% de la mortalidad total del tabaco c) **Puede causar muerte prematura y enfermedad tanto en niños como en adultos** d) En los ambientes cerrados con humo ambiental de tabaco no se han detectado aumento de nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos ni monóxido de carbono (CO) e) Se refiere al humo inhalado de ropas en contacto con el humo del tabaco

**A todo paciente fumador se le debe preguntar... Señale la afirmación falsa:**

- a) Entorno de fumadores (domicilio, trabajo, amigo, otros) b) Número de cigarrillos diarios c) Debemos preguntar por el consumo de cannabis. Cada vez existe más evidencia del nudo cannabis-tabaco (Évict). Prestar especial atención a los adolescentes y tratar conjuntamente d) Presencia de comorbilidades como EPOC y asma e) **Todas son verdaderas**

**Señale la aseveración correcta de entre las siguientes:**

a) El consejo de dejar de fumar es una intervención efectiva, pero no más coste-efectiva para el abandono del tabaco b) **A los fumadores que no quieren dejar de fumar en ese momento, no se les debe motivar para el abandono** c) Ante los que están dispuestos a hacer un serio intento, podemos iniciarlo de manera inmediata sin preparación previa d) La entrevista motivacional sólo debe realizarse en fumadores no motivados. En los motivados resulta contraproducente e) El control telefónico en pacientes en fase de abandono no ha demostrado ser útil

**¿Cuál de los siguientes aspectos de la entrevista motivacional es adecuado?**

a) **Expresar empatía** b) Anular la discrepancia c) Estimular la resistencia d) Rechazar la autoeficacia e) Remarcar las debilidades

**Con relación a la entrevista motivacional, y considerando sus características más importantes, señale la afirmación falsa:**

a) Relevancia, animar al paciente a que señale por qué el abandono es relevante para él b) Riesgo, el profesional sanitario debe pedir al paciente que identifique consecuencias negativas del consumo de tabaco c) Recompensa, el profesional sanitario debe pedir al paciente que identifique los posibles beneficios del abandono del tabaco d) Todas son verdaderas e) **Todas son falsas**

**Señale la respuesta correcta respecto a los fármacos disponibles para dejar de fumar:**

a) La diferencia entre fármacos de primera línea y segunda línea se fundamenta en su precio y disponibilidad b) Los ansiolíticos como terapia única constituyen una alternativa farmacológica válida en casos de fracasos terapéuticos previos c) La terapia sustitutiva con nicotina (TSN) en España sólo está disponible en forma de «parches» d) Bupropión, vareniclina y los parches de nicotina son considerados como fármacos de primera línea e) **Bupropión, al ser considerado como fármaco antidepresivo, no ha sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) como terapia farmacológica para el abandono del tabaco.**

**De los siguientes fármacos, ¿cuál de ellos tiene un mecanismo de acción doble, antagonista/agonista?**

a) Amitriptilina b) **Vareniclina** c) Clonidina d) Bupropión e) Nortriptilina

**Con relación a las distintas características de los tratamientos, señale la respuesta correcta:**

a) En la terapia sustitutiva de nicotina (TSN), la dosis se debe aumentar de modo progresivo, conforme avanza el tratamiento b) El spray nasal de nicotina, debido a su acción lenta, no está especialmente indicado para tratar el *craving* c) Cuando se indica bupropión, no hace falta hacerlo una semana antes de la fecha señalada para la interrupción del consumo de tabaco d) Si utilizamos vareniclina desde la primera semana de tratamiento, el paciente no puede fumar e) Los **fármacos de primera** línea presentan en general un balance beneficio/riesgo positivo

**Indique cuál de los siguientes fármacos ha demostrado mayor eficacia respecto a placebo, en tasas de abstinencia:**

a) Bupropión b) Parches de nicotina c) Fluoxetina d) Clonidina e) **Vareniclina**

**¿Qué fármaco para la deshabituación tabáquica no suele alterar la presión arterial?**

a) **Vareniclina** b) Parche de nicotina c) Bupropión d) Clonidina e) Chicles de nicotina

**En el paciente EPOC fumador no es frecuente encontrar:**

a) Elevado consumo de cigarrillosb) Alta **motivación tras el diagnóstico** para dejar el consumoc) Mayor grado de dependencia a la nicotinad) Menor motivación para dejar de fumare) Mayor incidencia de trastornos psiquiátricos como ansiedad o depresión

**¿Cuál de las siguientes medidas no ha demostrado efectividad o balance positivo beneficio/riesgo en la lucha contra el tabaquismo?**

a) Limitación de consumo de tabaco en el medio laboralb) Estrategias educativas en el entorno escolarc) Campañas publicitarias con mensajes antitabacod) Promoción de la sustitución del **cigarrillo de tabaco por el cigarrillo electrónico**e) Prohibición de la venta de cigarrillos a menores de 18 años

**¿Cuál de las siguientes características es fundamental en la estrategia motivacional general?**

a) Ofrecer consejos sólo si se solicitanb) Realizar la investigación exclusivamente centrada en la enfermedadc) **Establecer** medidas que disminuyan el deseo de fumar d) Ofrecer un camino cerradoe) Evidenciar los errores y recriminarlos

**La terapia psicológica desempeña un papel fundamental en los siguientes grupos de pacientes fumadores, siendo de primera elección, excepto en uno de ellos:**

a) Mujeres embarazadasb) Personas ancianasc) Población psiquiátricad) Jóvenes y adolescentese) **En todos los anteriores es recomendable**

**¿Cuál de las siguientes terapias alternativas considera más eficaz para dejar de fumar?**

a) Acupunturab) Acupuntura combinada con láserc) Hipnosisd) Homeopatíae) **Ninguna de las anteriores tiene suficiente evidencia científica para afirmar su eficacia**

**¿Cuál de las siguientes opciones no es propia de la actividad Enfermería?**

a) Sensibilizar sobre los riesgos del tabacob) **Establecer las interacciones entre** fármacos para la deshabituación y otros tratamientos psiquiátricos que tuviera el paciente.c) Aclarar dudas sobre falsas creencias o mitosd) Prevenir el inicio del consumoe) Promover el abandono del consumo del tabaco

**La utilización del método de las 5 Aes se encuadra dentro de:**

a) Intervención intensivab) Intervención especializadac) Intervención comunitariad) Intervención poblacionale) **Intervención mínima**

**¿Cuál de las siguientes intervenciones no estaría dentro de lo que conocemos por intervención comunitaria?**

a) **Sesiones de intervención intensiva** grupalb) Promoción de la Saludc) Prevención del tabaquismod) Acciones colectivas y socialese) Actividades de información

**¿Cuál de las siguientes técnicas de educación para la salud y entrenamiento de habilidades se utiliza habitualmente en el proceso de abandono del tabaco?**

a) Demostración con entrenamientob) Simulación operativac) *Role Playing*d) Ayuda a la toma de decisionese) Todas las **anteriores son correctas**

**El test de Richmond mide:**

a) Abstinencia b) Dependencia c) Nivel de nicotina en orina d) **Motivación** e) Depresión

**Las personas que ponen fecha para dejar de fumar en el próximo mes están en fase...**

a) Precontemplativa b) **Contemplativa** c) De preparación d) De acción e) De evaluación

**¿Dónde no es aconsejable realizar un consejo o visita de captación para iniciar el proceso de abandono?**

a) En una visita domiciliar b) A los padres, en una consulta de pediatría con paciente con asma infantil c) En una consulta de revisión de diabetes d) En una consulta de revisión de hipertensión arterial (HTA) e) Durante una **asistencia** de urgencias grave

**De las siguientes aseveraciones sobre los pacientes psiquiátricos, ¿cuál es la menos acertada?**

a) Les cuesta más cambiar rutinas y desarrollar mecanismos de afrontamiento b) Generalmente, tienen una mayor dependencia de la nicotina c) **No deben dejar de fumar porque empeoraría su patología** d) Pueden necesitar combinaciones de más de un fármaco para dejar de fumar e) Habitualmente, requieren más tiempo en la consulta de tabaquismo

**La intervención muy breve, debe durar:**

a) **Menos de 1 minuto** b) Menos de 3 minutos c) Menos de 5 minutos d) Menos de 10 minutos e) Depende del número de motivos de consulta

**¿Cuándo es mayor el peligro de una recaída?**

a) Después de los 6 meses de haberlo dejado b) Los tres primeros días después del cese c) Después del tercer mes d) **Las primeras semanas** e) Después de un año de abstinencia