


Puntos 100,00/100,00
Calificación 10,00 de 10,00 (100%)
Comentario - ¡¡¡ APTO !!!

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

1. Indique el enunciado incorrecto en relación a las abreviaturas.


Seleccione una:

- ☐ a. Los acrónimos permiten que puedan ser pronunciados como una palabra. Ejemplo OMS.
- ☒ b. En los informes clínicos de los pacientes y la prescripción de medicamentos para tratar distintas patologías se usan abreviaturas, no se utilizan acrónimos.
- ☐ c. No se recomienda el uso de abreviaturas o acrónimos en los procesos de diagnóstico, prescripción y administración de medicamentos.
- ☐ d. En los programas de prescripción electrónica informatizada o bien no permiten la utilización de abreviaturas o bien ofrecen despleables explicativos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

2. Si lo precisa, ¿a qué abreviatura común de las órdenes médicas corresponde?

Seleccione una:


- ☐ a. slp.
- ☐ b. pmv.
- ☒ c. prn.

☐ d. po.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

3. La abreviatura qid, corresponde a:


Seleccione una:

- ☐ a. Cada día.
- ☒ b. Cuatro veces al día.
- ☐ c. Suspensión.
- ☐ d. Dosis única.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

4. En relación a las unidades básicas de medidas usadas en el cálculo de dosis, el mol

¿Cuál es su magnitud?


Seleccione una:

- ☒ a. Cantidad de sustancia.
- ☐ b. Tiempo.
- ☐ c. Masa.
- ☐ d. Velocidad de sedimentación.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


5. Una cucharada sopera equivale a:
Seleccione una:

- ☐ a. 2,5 ml.
- ☐ b. 5 ml.
- ☐ c. 10 ml.
- ☒ d. 15 ml.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


6. El enunciado correcto es:
Seleccione una:

- ☒ a. Las reglas de tres cada vez son menos usadas y han sido substituidas por factores de conversión.
- ☐ b. Otra fórmula usada en el cálculo de dosis fraccionadas es: $Q2/Q1 \times F$, siendo F la cantidad de la que se desea conocer la proporción.
- ☐ c. El porcentaje para una forma líquida indica los gramos de soluto por cada 100 ml de disolución y se expresa con el signo ml.
- ☐ d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

7. La concentración su fórmula es:


Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de fármaco X Volumen.
- ☒ b. Cantidad de fármaco/Volumen.
- ☐ c. Peso de la sustancia X cantidad de fármaco/Volumen.
- ☐ d. Cantidad de fármaco/Volumen X Peso de la sustancia.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

8. Mide el número de partículas que existen en una solución.


Seleccione una:

- ☐ a. Concentración.
- ☐ b. Disolución.
- ☐ c. Equivalencia.
- ☒ d. Osmolaridad.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

9. Número de equivalentes en 1 l de disolución.


Seleccione una:

- ☐ a. Peso equivalente.
- ☒ b. Normalidad.
- ☐ c. Densidad.
- ☐ d. Osmolaridad.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

10. En el cálculo de la dosis según la superficie corporal (m^2), las fórmulas más usadas son:


Seleccione una:

- ☐ a. La fórmula de Ballesteros.
- ☐ b. La de Lastres García.
- ☐ c. La de Suñe Negre.
- ☒ d. La de Dubois y Dubois y la de Mosteller.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

11. Forma externa o forma de acondicionamiento de un fármaco, que permite su administración por una vía que resulte eficaz para conseguir el efecto deseado.

Seleccione una:


- ☐ a. Solución farmacéutica.
- ☐ b. Vía de administración.

- ☒ c. Forma farmacéutica.
- ☐ d. Modelo de administración farmacéutica.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

12. Indique el enunciado incorrecto en relación a la vía sublingual:


Seleccione una:

- ☐ a. El fármaco se coloca debajo de la lengua en forma de comprimidos o aerosol.
- ☒ b. Su absorción y paso a la circulación sistémica son lentos.
- ☐ c. Al no absorberse a través del intestino, inicialmente no llega al hígado y no es metabolizado, con lo que hay una mayor cantidad de fármaco disponible y el efecto puede ser más intenso que con la vía oral.
- ☐ d. Es una vía adecuada para situaciones urgentes como los tratamientos de crisis de angina de pecho.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

13. Comprimidos no recubiertos destinados a ser colocados en la boca, donde se dispersan rápidamente antes de ser tragados.


Seleccione una:

- ☐ a. Comprimidos laqueados.
- ☐ b. Comprimidos efervescentes.
- ☐ c. Grageas.
- ☒ d. Comprimidos bucodispersables.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

14. El enunciado incorrecto en relación a los comprimidos sublinguales:


Seleccione una:

- ☐ a. Deban absorberse a través de la mucosa bucal y no tragarse.
- ☐ b. Deben ser pequeños y redondos.
- ☐ c. Elípticos o biconvexos.
- ☒ d. Pueden tener ángulos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

15. En relación a las formas farmacéuticas de liberación modificada, ¿Cuál de las siguientes liberan inicialmente una dosis simple de fármaco y posteriormente liberan otra dosis similar?


Seleccione una:

- ☐ a. De liberación sostenida.
- ☐ b. De liberación prolongada.
- ☒ c. De liberación repetida.
- ☐ d. De liberación retardada.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


16. No es una forma farmacéutica líquida oral.
Seleccione una:

- ☒ a. Grageas.
- ☐ b. Suspensión.
- ☐ c. Jarabe.
- ☐ d. Elixir.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


17. ¿Qué zona para la inyección intramuscular no se puede utilizar en lactantes ni en niños de menos de tres años?
Seleccione una:

- ☐ a. Área del recto femoral.
- ☐ b. Área deltoidea.
- ☒ c. Área dorsoglútea.
- ☐ d. Todas se pueden utilizar.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

18. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de la terapia intravenosa?


Seleccione una:

- ☐ a. Rápida distribución del fármaco dentro del sistema sanguíneo.
- ☐ b. Ausencia de pérdida del fármaco en los tejidos.
- ☐ c. Mayor control del efecto del fármaco.
- ☒ d. Disminución del coste del tratamiento respecto a otra forma de administración.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

19. La velocidad de administración por vía intravenosa periférica debe ser inferior a:


Seleccione una:

- ☐ a. 50 ml/h.
- ☐ b. 100 ml/h.
- ☒ c. 200 ml/h.
- ☐ d. 300 ml/h.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

20. A través de la vía subcutánea se pueden administrar fármacos mediante sistemas que posibilitan la liberación del fármaco durante largos periodos de tiempo, es un ejemplo:

Seleccione una:


- ☐ a. Anticonceptivos hormonales.

- ☐ b. Análogos de LHRH.
- ☐ c. Insulina.
- ☒ d. Todos son correctos.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

21. No se considera una vía extravascular:


Seleccione una:

- ☐ a. Vía intradérmica.
- ☒ b. Vía intravenosa.
- ☐ c. Vía intratecal.
- ☐ d. Vía intraarticular.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

22. El ángulo de la inyección intradérmica es de:


Seleccione una:

- ☒ a. 10-15°
- ☐ b. 20-45°.
- ☐ c. 45-90°.
- ☐ d. A 90°.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


23. ¿Qué tipo de aerosoles fue el primer dispositivo para la administración de fármacos por inhalación que apareció en el mercado, es una preparación galénica consistente en un aerosol, dentro del cual existen cristales del fármaco en fase líquida y un propelente? Seleccione una:

- ☐ a. Cámara de inhalación.
- ☒ b. Cartucho presurizado.
- ☐ c. Cámara de inhalación.
- ☐ d. Inhalador de fármacos en polvo.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


24. Indique cuál de las siguientes no se considera una ventaja del nebulizador. Seleccione una:

- ☐ a. Facilidad de inhalación.
- ☐ b. Facilidad de administración dosis altas.
- ☐ c. Indicado en pacientes críticos.
- ☒ d. Preparación rápida del fármaco.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


25. El inhalador de fármacos en polvo:
Seleccione una:

- ☒ a. No contiene gas propulsor y, por tanto, no contiene CFC.
- ☐ b. Puede utilizarse en pacientes inconscientes.
- ☐ c. Se consiguen depósitos pulmonares de hasta el 50%.
- ☐ d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


26. La apertura de un envase de gotas oftalmológicas hace que pierda su esterilidad, una vez abierto debe desecharse a los:
Seleccione una:

- ☐ a. 5 días.
- ☒ b. 7 días.
- ☐ c. 15 días.
- ☐ d. 30 días.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

27. Los parches de fentanilo han de reemplazarse cada:


Seleccione una:

- ☐ a. 12 horas.
- ☐ b. Cada día.
- ☐ c. Cada dos días.
- ☒ d. Cada tres días.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

28. Las gotas óticas:


Seleccione una:

- ☒ a. Se utilizan para suavizar y desprender la cera del canal auricular, en el tratamiento de otitis externas.
- ☐ b. Han de ser estériles.
- ☐ c. Su utilización no tiene por qué ser individual.
- ☐ d. Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

29. En relación al acondicionamiento del medicamento, ¿Cómo se denomina el envase o cualquier forma de acondicionamiento que se encuentra en contacto con el medicamento?


Seleccione una:

- ☐ a. Embalaje exterior.
- ☒ b. Acondicionamiento primario.
- ☐ c. Acondicionamiento secundario.
- ☐ d. Prospecto.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

30. ¿Cuál es el significado del siguiente símbolo?:




Seleccione una:

- ☐ a. Dispensación sujeta a prescripción médica.
- ☒ b. Medicación que contiene sustancias psicotrópicas.
- ☐ c. Medicamento que puede producir fotosensibilidad.
- ☐ d. Gas medicinal comburente.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

31. En el caso en el aparezca en el etiquetado de los medicamentos significa.




Seleccione una:

- ☐ a. Con principios activos nuevos.
- ☐ b. Dispensación con receta oficial de estupefacientes.
- ☒ c. Conservación en el frigorífico.
- ☐ d. No mantener abierto más de dos semanas.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

32.- En el acondicionamiento primario no aparece:


Seleccione una:

- ☐ a. Fecha de caducidad.
- ☐ b. Número de lote de fabricación.
- ☐ c. Nombre del titular del medicamento.
- ☒ d. Indicaciones terapéuticas.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

33.- La sigla H en un medicamento significa:

Seleccione una:


- ☐ a. Equivalente farmacéutico genérico.
- ☒ b. Medicamento de uso hospitalario.

- ☐ c. Medicamento de diagnóstico hospitalario.
- ☐ d. Medicamentos sin receta.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

34. Los medicamentos termolábiles se deben conservar a temperatura:


Seleccione una:

- ☐ a. Ambiente.
- ☐ b. De -3°C.
- ☒ c. 2 y 8 °C.
- ☐ d. Entre 5 y 15 °C.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

35. Las especialidades farmacéuticas quedan recogidas en el catálogo de medicamentos, ¿en qué grupo farmacológico se engloba el sistema digestivo y órganos hematopoyéticos?


Seleccione una:

- ☒ a. A.
- ☐ b. B.
- ☐ c. G.
- ☐ d. R.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

36. ¿Cuál de las siguientes informaciones se incluyen en el índice ATC?


Seleccione una:

- ☐ a. Denominación común internacional del principio activo.
- ☐ b. Nomenclatura química y estructura.
- ☐ c. Peso molecular.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

37. Se reglamenta simultáneamente la receta en formato papel y electrónico:


Seleccione una:

- ☐ a. Real Decreto 1654/2011 del 23 de noviembre.
- ☒ b. Real Decreto 1718/2010 del 17 de diciembre.
- ☐ c. Real Decreto 1543/2010 del 15 de enero.
- ☐ d. Real Decreto 1987/2012 de 17 de diciembre.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

38. ¿Cuál es el tiempo de validez de las recetas a contar desde la fecha de prescripción, a excepción de las vacunas antialérgicas y antibacterianas?


Seleccione una:

- ☐ a. 15 días.
- ☒ b. 10 días.
- ☐ c. 7 días.
- ☐ d. 90 días.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

39. La prescripción médica no debe porque contener:


Seleccione una:

- ☐ a. Fecha y hora de prescripción.
- ☐ b. Dosis del fármaco.
- ☒ c. Diagnostico para que se prescribe el fármaco.
- ☐ d. Via de administración.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

40. ¿Qué tipo de prescripción es aquella en la que el médico prescribe un tratamiento con una dosis y frecuencia determinada, pero indica que se administre de forma inmediata una dosis inicial?


Seleccione una:

- ☐ a. De continuación.
- ☒ b. Dosis de carga.
- ☐ c. Dosis única.
- ☐ d. AHORA.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

41. Regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermería:


Seleccione una:

- ☒ a. Real Decreto 1302/2018.
- ☐ b. Real Decreto 1456/2017.
- ☐ c. Real Decreto 1302/2016.
- ☐ d. Real Decreto 1456/2016.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

42. Medicamento publicitario, se corresponde con la sigla:


Seleccione una:

- ☐ a. Cs.
- ☐ b. MTP.
- ☐ c. ECM.
- ☒ d. EFP.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

43. En relación a la administración de medicamentos se utiliza los “diez correctos”, ¿Cuál sería el paso numero dos?


Seleccione una:

- ☐ a. Medicación correcta.
- ☒ b. Reconstitución y dilución correcto.
- ☐ c. Indicación y dosis.
- ☐ d. Via de administración.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

44. ¿En qué paso se encuentra el registro de la administración?


Seleccione una:

- ☐ a. Cuarto lugar.
- ☐ b. Quinto lugar.
- ☐ c. Octavo lugar.
- ☒ d. Noveno lugar.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


45. La validación y dispensación de medicamentos es competencia de:
Seleccione una:

- ☐ a. Médico.
- ☐ b. Personal de enfermería.
- ☒ c. Farmacéuticos.
- ☐ d. Auxiliares de enfermería.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

46. Tiene como objetivo impulsar y promover estrategias de seguridad del paciente y que, en colaboración con las comunidades autónomas, integra a todos los profesionales sanitarios.


Seleccione una:

- ☐ a. Instituto de Salud.
- ☒ b. Agencia de Calidad.
- ☐ c. Sistema Nacional de Salud.
- ☐ d. Sistema sanitario estándar de calidad.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

47. La falta en la administración de una dosis prescrita a un paciente antes de la próxima, ¿Qué tipo de error es?


Seleccione una:

- ☐ a. De prescripción.
- ☐ b. En la preparación.
- ☐ c. En la técnica de administración.
- ☒ d. De omisión.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

48. La falta de protocolos en la unidad o difícil accesibilidad a ellos. Organización interna de los equipos sanitarios deficitaria y la carga de trabajo elevada, puede ser motivo por el cual se produce un fallo involuntario en la cadena terapéutica que se engloba como factores:


Seleccione una:

- ☒ a. De la unidad o servicio.
- ☐ b. Relacionados con el profesional.
- ☐ c. Interrupciones.
- ☐ d. Relacionados con el paciente.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

49. Según la ISMP de medicamentos específicos de alto riesgo en hospitales, no se incluye:


Seleccione una:

- ☐ a. Cloruro potásico IV.
- ☒ b. Ibuprofeno.
- ☐ c. Oxitocina IV.
- ☐ d. Tintura de opio.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

50. Uno de los errores que se puede cometer con los opiáceos es la prescripción de parches de fentanilo en dosis demasiado altas en pacientes que no habían recibido antes opiáceos, ¿Cuál sería su medida de prevención propuesta?


Seleccione una:

- ☐ a. Uso de bombas inteligentes.
- ☐ b. Doble chequeo de la preparación y programación.
- ☐ c. Informar a los pacientes sobre el uso de los parches.
- ☒ d. Establecer protocolos de tratamiento.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

51. Se trata de una traducción y adaptación de la lista de NIOSH 2016 en la que se incluyen recomendaciones para la manipulación segura de medicamentos peligrosos.

Seleccione una:


- ☐ a. Lista del Ministerio de Salud.

- ☐ b. Lista de la Agencia de la calidad.
- ☒ c. Lista de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- ☐ d. Lista de medicamentos y productos tóxicos para la salud.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

52. El enunciado incorrecto es:


Seleccione una:

- ☐ a. El NIOSH en 2016 establece una clasificación de medicamentos peligrosos en tres grupos.
- ☒ b. La susceptibilidad del manipulador de medicamentos peligrosos no se considera un factor que condiciona el riesgo de exposición de los manipuladores.
- ☐ c. La administración de un comprimido o una cápsula entera no requiere de medidas de protección especiales.
- ☐ d. Triturar un comprimido para administrarlo a través de una sonda nasogástrica comporta un riesgo de exposición real que aconseja extremar precauciones.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

53. Son dispositivos que aseguran que el fármaco no entra en contacto con el medio externo, gracias a las conexiones herméticas entre los componentes del sistema y a la retención de los posibles aerosoles y derrames en cámaras estancas diseñadas con esta finalidad.


Seleccione una:

- ☒ a. Sistemas cerrados de transferencia de medicamentos.
- ☐ b. Sistemas certificados de seguridad.
- ☐ c. Sistemas estancos de minimización de riesgos.
- ☐ d. Sistemas de exposición cerrados de seguridad.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

54. ¿Qué equipo de protección individual son de uso obligatorio en todos los procesos de manipulación de medicamento peligroso?


Seleccione una:

- ☒ a. Guantes de protección.
- ☐ b. Protección ocular.
- ☐ c. Protección cuerpo (bata).
- ☐ d. Todas son de uso obligatorio.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


55. La protección respiratoria (mascarilla FFP3), no se utiliza en la forma farmacéutica: Seleccione una:

- ☐ a. Comprimido fraccionado.
- ☐ b. Solución para irrigación.
- ☐ c. Polvo/suspensión para inhalación.
- ☒ d. Cápsula/ comprimido intacto.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

56. Los residuos del Grupo IV (citostáticos y sustancias químicas) deben desecharse en contenedores rígidos de color:


Seleccione una:

- ☐ a. Rojo.
- ☐ b. Verde.
- ☒ c. Azul.
- ☐ d. Amarillo.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

57. Es un fármaco antiarrítmico de estrecho margen terapéutico:


Seleccione una:

- ☐ a. Warfarina.
- ☐ b. Teofilina.
- ☐ c. Vancomicina.
- ☒ d. Digoxina.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


58. ¿De cuántos tipos pueden ser las interacciones medicamentosas?
Seleccione una:

- ☐ a. 2.
- ☒ b. 3.
- ☐ c. 4.
- ☐ d. 5.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


59. Efectos luminiales:
Seleccione una:

- ☐ a. Suceden por la alteración de la solubilidad de los medicamentos y, por tanto, afectan a la absorción.
- ☐ b. En general son debidos a reacciones fisicoquímicas como la quelación.
- ☐ c. Este tipo de interacciones se puede evitar administrando los fármacos 2 horas antes o 6 horas después de los alimentos.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


60. ¿Qué tipo de interacción medicamentosa sucede tras la administración de un medicamento gastrolesivo que altera la absorción de otros medicamentos o alimentos? Seleccione una:

- ☐ a. Efectos sobre la motilidad gástrica.
- ☐ b. Alteración de la flora bacteriana.
- ☒ c. Efectos en el ámbito de la pared intestinal.
- ☐ d. Efectos lumbinales.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


61. ¿Cuál de los siguientes no es un inhibidor de la enzima CYP1A2? Seleccione una:

- ☒ a. Tiotepa.
- ☐ b. Fluvoxamina.
- ☐ c. Ciprofloxacino.
- ☐ d. Mexiletina.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

62. ¿Cuál de los siguientes fármacos no es un inductor del metabolismo? Seleccione una:


- ☐ a. Rifampicina.
- ☐ b. Fenitoína.

- ☐ c. Fenobarbital.
- ☒ d. Ácido fólico.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

63. En relación a las interacciones farmacológicas, en concreto los fármacos Corticoides + diuréticos ¿Cuáles son sus efectos?


Seleccione una:

- ☐ a. Hipopotasemia.
- ☒ b. Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono.
- ☐ c. Hipotensión.
- ☐ d. Estimulación de la insulina.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

64. La trombocitopenia es el efecto de la interacción ¿de qué fármacos?


Seleccione una:

- ☐ a. Depresores del SNC combinados entre sí.
- ☐ b. AINE +alcohol +corticoides.
- ☒ c. Heparina +antineoplásicos.
- ☐ d. Diuréticos + corticoides.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

65. ¿Qué término se utiliza para aquellas reacciones químicas irreversibles e incontroladas que generan un nuevo producto que, en el mejor de los casos, es terapéuticamente inactivo?


Seleccione una:

- ☐ a. Incompatibilidad.
- ☒ b. Inestabilidad.
- ☐ c. Tiempo útil.
- ☐ d. Estabilidad.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

66. No es un factor que influya en la estabilidad de un medicamento.


Seleccione una:

- ☒ a. Forma de fabricación.
- ☐ b. pH.
- ☐ c. Temperatura.
- ☐ d. Carga iónica.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


67. Es un alimento alcalinizante de la orina:
Seleccione una:

- ☐ a. Carne.
- ☒ b. Limón.
- ☐ c. Vinagre.
- ☐ d. Café.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


68. En relación a las interacciones farmacodinámicas, como por ejemplo el regaliz puede alterar la acción de:
Seleccione una:

- ☐ a. Anticoagulantes.
- ☒ b. Antihipertensivos.
- ☐ c. Antidepresivos.
- ☐ d. Antidiabéticos.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

69. ¿El consumo de gran cantidad de que alimento potencia el efecto de los anticoagulantes?


Seleccione una:

- ☐ a. Alimentos ricos en tiramina.
- ☐ b. Chocolate.
- ☒ c. Cebollas.
- ☐ d. Almendras.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

70. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe administrarse en ayunas?


Seleccione una:

- ☐ a. Morfina.
- ☐ b. Ranitidina.
- ☐ c. Tramadol.
- ☒ d. Amoxicilina.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

71. Los antiácidos, como las sales de aluminio:

Seleccione una:


- ☒ a. Disminuyen la absorción de fosfatos y vitamina A.

- ☐ b. Puede provocar estados de malabsorción, especialmente de vitamina D.
- ☐ c. Reducen el ácido fólico.
- ☐ d. Pueden causar hipofosfatemia.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

72. Existen estudios de estabilidad que observan el tiempo máximo de permanencia de los medicamentos a temperatura ambiente, así por ejemplo el Reopro que el nombre comercial cuyo principio activo es el Abciximab ¿Qué información se nos aporta sobre la estabilidad?


Seleccione una:

- ☐ a. 24 horas a temperatura ambiente.
- ☐ b. 2 semanas a temperatura inferior a 25°C.
- ☐ c. 7 días a temperatura ambiente.
- ☒ d. 72 horas (incluyendo tiempo de infusión) a temperatura inferior a 30°C.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

73. Reducen el ácido fólico y la vitamina B12 y causan anemia megaloblástica:


Seleccione una:

- ☐ a. Isoniacida.
- ☒ b. Anticonvulsiantes.
- ☐ c. Laxantes.
- ☐ d. Lactulosa.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

74. ¿Qué principio activo puede permanecer 25 meses a 25°C?


Seleccione una:

- ☐ a. Tipranavir.
- ☒ b. Tirotropina.
- ☐ c. Tuberculina.
- ☐ d. Isoprenalina.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

75. Los sistemas automáticos de dispensación son dispositivos de almacenamiento de fármacos, actualmente en España se comercializan tres modelos, ¿Cuál es el incorrecto?


Seleccione una:

- ☐ a. Medstation ® RX system.
- ☐ b. Sistema Omnicell®.
- ☐ c. Sistema Autodrug®.
- ☒ d. Sistema Wollfolf®.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

76. Los dispositivos de almacenamiento:


Seleccione una:

- ☐ a. Se compone de varios módulos y controlados a través de un sistema informativo con una configuración flexible.
- ☐ b. Se pueden conectar a la red general del hospital.
- ☐ c. Incorpora a la estructura de almacenaje de medicamentos una pantalla que permite visualizar la información de la prescripción al paciente y las características de los fármacos.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

77. Los medicamentos no incluidos en el SAD:


Seleccione una:

- ☒ a. El servicio de farmacia lo deposita en unas gavetas habilitadas para dejar dicha medicación.
- ☐ b. Estas gavetas siempre tienen que estar dentro del SAD.
- ☐ c. Los medicamentos prescritos no incluidos en el SAD.
- ☐ d. Los medicamentos prescritos no incluidos en el SAD se visualizan en color rojo.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

78. ¿A quién le corresponde controlar la caducidad de los medicamentos incluidos en el SAD?


Seleccione una:

- ☐ a. Médico.
- ☐ b. Enfermeros.
- ☒ c. Servicio de farmacia.
- ☐ d. Auxiliares de enfermería.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

79. Indique el enunciado incorrecto en relación a la nutrición parenteral (NP).


Seleccione una:

- ☐ a. Está indicada en caso de isquemia intestinal.
- ☐ b. Existen dos tipos de NP.
- ☐ c. La nutrición parenteral central permite cubrir los requerimientos completos del paciente.
- ☒ d. En la nutrición parenteral central se utiliza las vías subclavias, nunca la yugular.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

80. La nutrición parenteral periférica se ha de utilizar en periodos de tiempo, ¿Cuál es el máximo de días?


Seleccione una:

- ☐ a. 5 días.
- ☒ b. 7 días.
- ☐ c. 10 días.
- ☐ d. 15 días.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

81. La mayoría de los pacientes requieren un aporte energético de:


Seleccione una:

- ☒ a. 20-35 Kcal/Kg/día.
- ☐ b. 35-40 Kcal/Kg/día.
- ☐ c. 40-45 Kcal/Kg/día.
- ☐ d. 45-60 Kcal/Kg/día.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

82. En la NP, una forma sencilla de estimar las necesidades basales de líquidos en un adulto, es que cuando el individuo tiene entre 18-60 años, la cantidad es:


Seleccione una:

- ☐ a. 30 ml/kg/día.
- ☒ b. 35 ml/kg/día.
- ☐ c. 25 ml/kg/día.
- ☐ d. 40 ml/Kg/día.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

83. La misión esencial es mantener la presión osmótica en el medio extracelular y evitar así una pérdida excesiva de agua. También tiene importancia en el mantenimiento de la excitabilidad normal del músculo y en la permeabilidad celular.


Seleccione una:

- ☐ a. Potasio.
- ☐ b. Magnesio.
- ☒ c. Sodio.
- ☐ d. Lípidos.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

84. La velocidad de administración del potasio en NP no debe superar:


Seleccione una:

- ☐ a. 5-10 mEq/h.
- ☒ b. 10-15 mEq/h.
- ☐ c. 15-20 mEq/h.
- ☐ d. 20-25 mEq/h.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

85. Es el principal anión intracelular y participa en el mantenimiento del PH y de la composición de la membrana celular.


Seleccione una:

- ☐ a. Magnesio.
- ☐ b. Potasio.
- ☐ c. Sodio.
- ☒ d. Fósforo.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

86. ¿Cuál es el requerimiento diario de ácido fólico en adultos según la recomendación de la Food and Drug Administration (FDA)?

Seleccione una:


- ☐ a. 6 mg.
- ☐ b. 60 µg.
- ☒ c. 600 µg.

- ☐ d. 40 mg.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

87. ¿Y de vitamina D?


Seleccione una:

- ☐ a. 10 mg.
- ☐ b. 150 µg.
- ☐ c. 6 mg.
- ☒ d. 200 UI.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

88. Indique el enunciado incorrecto.


Seleccione una:

- ☒ a. La preparación del NP no es necesario realizarse en el servicio de farmacia del hospital.
- ☐ b. La NP de adultos suele ser una mezcla ternaria, es decir, se mezclan en la misma bolsa aminoácidos, glucosa y lípidos.
- ☐ c. En la NP de neonatos, en algunos centros, se administran los lípidos aparte.
- ☐ d. Uno de los problemas más importantes que se plantea en la preparación de la NP es la estabilidad.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

89. ¿Cuál de las siguientes es una complicación metabólica de la NP?


Seleccione una:

- ☐ a. Neumotórax.
- ☒ b. Hiperhidratación.
- ☐ c. Hemotórax.
- ☐ d. Perforación cardiaca.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

90. En relación a la clasificación de las fórmulas de nutrición enteral, ¿Cuál de las siguientes pertenece al grupo de fuente de proteínas?


Seleccione una:

- ☐ a. Módulos.
- ☒ b. Poliméricas.
- ☐ c. Normoproteica.
- ☐ d. Completas.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


91. ¿Cuántos tipos de administración de la nutrición enteral existe?
Seleccione una:

- ☒ a. 2.
- ☐ b. 3.
- ☐ c. 4.
- ☐ d. Solamente una, administración continua.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


92. En relación a las vías de administración de fármacos, cuando nos referimos a la vía intravenosa en concreto la fluidoterapia, los requerimientos diarios de fluidos de la población pediátrica dependen del peso del paciente (fórmula Holliday-Segar), así un peso <10 Kg, supone:
Seleccione una:

- ☐ a. 1500 ml/Kg.
- ☐ b. 2500 ml/Kg.
- ☐ c. 1000 ml/Kg.
- ☒ d. 100 ml/Kg.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

93. En relación a la vía intramuscular, el volumen máximo que se debe administrar hasta los 3 años de edad es de:


Seleccione una:

- ☒ a. 1 ml.
- ☐ b. 0,5 ml.
- ☐ c. 1,5 ml.
- ☐ d. 2 ml.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

94. Pertenece al grupo farmacológico ácido salicílico y derivados.


Seleccione una:

- ☐ a. Acetilcisteína.
- ☐ b. Adrenalina.
- ☒ c. Acetilsalicilato de lisina.
- ☐ d. Epinefrina.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

95. ¿Cuál de los siguientes sueros no es compatible con la acetilcisteína?


Seleccione una:

- ☐ a. SG isotónico al 5%.
- ☒ b. Ringer lactato.
- ☐ c. SF isotónico al 0,9%,
- ☐ d. Todos son compatibles.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

96. Utilizada en via intramuscular en anafilaxia grave, ataque agudo de asma y reacciones alérgicas:


Seleccione una:

- ☒ a. Adrenalina.
- ☐ b. Amiodarona.
- ☐ c. Dexmedetomidina.
- ☐ d. Dopamina.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

97. La dobutamina, ¿a qué grupo farmacéutico pertenece?

Seleccione una:


- ☐ a. Antídotos.
- ☐ b. Hipnóticos y sedantes.

- ☐ c. Anestésicos opioides.
- ☒ d. Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


98. Principal neurotransmisor liberado por las neuronas adrenérgicas posganglionares. Seleccione una:

- ☐ a. Morfina.
- ☒ b. Noradrenalina.
- ☐ c. Propofol.
- ☐ d. Remifentanilo.

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


99. No se debe utilizar en vía intramuscular y vía subcutánea. Seleccione una:

- ☐ a. Morfina.
- ☐ b. Remifentanilo.
- ☐ c. Propofol.
- ☒ d. Noradrenalina.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

100. Pertenece al grupo de los antídotos:
Seleccione una:

- ☒ a. Flumazenilo.
- ☐ b. Dopamina.
- ☐ c. Noradrenalina.
- ☐ d. Propofol.