



Navegación por el
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

Comenzado el miércoles, 29 de marzo de 2017, 07:10
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 29 de marzo de 2017, 07:11
Tiempo empleado 54 segundos
Puntos 5,00/5,00
Calificación **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)
Comentario - Apto

Información

Marcar pregunta

Niña de 15 meses de edad que ingresa en urgencias con cuadro de dificultad respiratoria, fiebre de 38°C de 2 días de evolución. Acompañada de su madre que refiere que la niña no termina los biberones, está algo irritable y presenta secreción nasal. A la valoración no presenta quejido espiratorio, mínimo aleteo nasal, ligera retracción xifoidea y movimientos toraco abdominales regulares y sincronizados con tiraje intercostal intenso. Se comprueba que cumple calendario vacunal. La madre informa que la niña va a guardería y tiene un hermano de 4 años.

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Según el test de Silverman que tipo de insuficiencia respiratorio obtendría nuestro paciente según los datos obtenidos en la valoración?

Seleccione una:

- ☐ a. insuficiencia leve
- ☒ b. insuficiencia moderada ✓
- ☐ c. Insuficiencia grave
- ☐ d. Según los datos obtenidos no podemos valorar qué tipo de insuficiencia padece

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Según el calendario común de del Consejo Interterritorial que vacuna le corresponde administrar según la edad de la niña?

Seleccione una:

- ☐ a. DTP
- ☐ b. Poliometilitis
- ☐ c. Hepatitis B
- ☒ d. Varicela ✓

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los resultados obtenidos de la gasometría realizada en el servicio de urgencias son los siguientes: pH:7,25 pCO₂: 38 mmHg. ¿Qué nos indican estos valores?

Seleccione una:

- ☐ a. Acidosis respiratoria
- ☒ b. Acidosis metabólica ✓
- ☐ c. No existe alteración
- ☐ d. Alcalosis metabólica

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según la bibliografía de estudio, el VRS es muy contagioso penetrando en el organismo a través de las secreciones nasales o fómites. ¿Cuál de estas medidas preventivas se han de tomar para evitar posibles contagios?

Seleccione una:

- ☐ a. Lavado de manos de los cuidadores
- ☐ b. Limitar visitas en niños pequeños y prematuros
- ☐ c. Educación sanitaria en las familias con factores de riesgo sobre los signos y síntomas de dicha enfermedad.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se indica la administración de salbutamol vía inhalatoria dada la cooperación de la pequeña. ¿Qué dosis inicial, según nuestra bibliografía de estudio es la recomendada?

Seleccione una:

- ☐ a. ICP + Cámara: 2 pulsaciones únicas
- ☐ b. ICP + Cámara: 2 pulsaciones cada 8h
- ☒ c. ICP + Cámara: 4-8 pulsaciones cada 15min ✓
- ☐ d. No está indicado el uso de salbutamol inhalado en pacientes menores de 5 años

[Finalizar revisión](#)