


## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En relación a los cuidados postoperatorios, ¿Qué realizaremos para mantener un control térmico óptimo?.

Seleccione una:

- a. Realizar aseo para retirar los restos sanguíneos y de antiséptico
- b. Recibirlo en cuna térmica o incubadora
- c. Medir temperatura inmediatamente
- d. B y C son correctas ✓

### Retroalimentación

Para mantener el control térmico en el postoperatorio, se recibirá al neonato en cuna térmica o incubadora, y se monitorizará la temperatura inmediatamente.


La respuesta correcta es:

B y C son correctas

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué alteraciones fisiológicas se encuentran en el neonato con dolor?. Seleccione la correcta:

Seleccione una:

- a. Aumento de frecuencia cardiaca
- b. Disminución de saturación de oxígeno
- c. Aumento de presión intracraneal
- d. Todas son correctas. ✓

### Retroalimentación


En el neonato con dolor ocurren alteraciones fisiológicas como son el aumento de la frecuencia cardiaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión intracraneal, de la sudoración; disminuyendo la saturación de oxígeno, el tono vagal y la presión perfusión cerebral.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué intervención realizaremos para minimizar las pérdidas de calor en la gastrosquisis y/o onfalocele?

Seleccione una:

- a. Estos pacientes no necesitan cuna térmica
- b. Colocar la mitad inferior del lactante, incluidas las asas intestinales en una bolsa de poliuretano ✓
- c. Dejar al asas intestinales expuestas al ambiente sin protección para no dañar la mucosa
- d. Usar gasas húmedas con solución fisiológica

### Retroalimentación

En el paciente congastrosquisis y/o onfalocele uno de los objetivos de cuidados tras el nacimiento es evitar las pérdidas de calor por las asas intestinales extrusadas, así para evitar la pérdida excesiva de calor, se cubrirá con bolsa transparente la mitad inferior del lactante, incluidas las asas intestinales. Se evitará usar gasas húmedas con solución fisiológica ya que se enfrían rápidamente y roban el calor; en caso de usarlas, se deben colocar fuera de la bolsa de plástico


La respuesta correcta es:

Colocar la mitad inferior del lactante, incluidas las asas intestinales en una bolsa de poliuretano

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La gastrosquisis es una alteración de la pared abdominal que consiste en: Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Salida de las vísceras abdominales sin la envoltura del cordón umbilical
- b. Generalmente ocurre hacia el lado derecho de la inserción del cordón umbilical
- c. El cordón umbilical está inserto en la parte distal de la membrana que cubre el defecto ✓
- d. No suele estar asociada a otros defectos congénitos

### Retroalimentación


En el caso de la gastrosquisis el contenido abdominal eventrado puede estar enmarañado y cubierto por un material fibroso grueso, pero esta membrana no se parece a la piel. Generalmente ocurre hacia el lado derecho de la inserción del cordón umbilical. ES en el caso del onfalocele donde el contenido abdominal se hernia a través del ampliado anillo umbilical y el cordón umbilical está inserto en la parte distal de la membrana que cubre el defecto

La respuesta correcta es: El cordón umbilical está inserto en la parte distal de la membrana que cubre el defecto

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad de la mucosa :

Seleccione una:

- a. Intestinal ✓
- b. Gástrica
- c. Biliar
- d. Pulmonar

### Retroalimentación


Es una enfermedad de la mucosa intestinal que afecta comúnmente al íleo y colon, y que ocurre casi exclusivamente en el periodo neonatal.

La respuesta correcta es: Intestinal

## Pregunta 6

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Cuál es el tipo de atresia esofágica más común?

Seleccione una:

- a. Tipo A
- b. Tipo B
- c. Tipo C ✓
- d. Tipo D

### Retroalimentación


Tipo C con una incidencia del 86% del total. Es una atresia Esofágica con fistula traqueoesofágica distal, es decir, el extremo inferior de la atresia fistuliza con la tráquea, y el extremo superior de la atresia de esófago es ciego.

La respuesta correcta es: Tipo C

## Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a la posición del paciente intervenido de atresia de esófago portador de sonda trananastomótica, seleccione la correcta:

Seleccione una:

- a. Decúbito prono
- b. Cabecero elevado aproximadamente 30°, evitando la extensión del cuello, manteniendo la línea media, con la cabeza neutra ✓
- c. No está indicada ninguna posición en concreto
- d. Ninguna es correcta

### Retroalimentación


Para prevenir las complicaciones tempranas, como la deshiscencia anastomótica esofágica o de la sutura esofágica, se evitará la extensión del cuello, realizando la movilización del recién nacido en bloque, manteniendo la línea media, con la cabeza neutra.

La respuesta correcta es: Cabecero elevado aproximadamente 30°, evitando la extensión del cuello, manteniendo la línea media, con la cabeza neutra

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

De las siguientes escalas para la valoración del dolor, cuál no está indicada para el paciente neonatal:

Seleccione una:

- a. Premature Infant Pain Profile Revised (PIPP-R)

- b. Crying, Requires Oxygen for Saturation >95%, Increased Vital Signs, Expression, and Sleeplessness (CRIES)
- c. Neonatal pain, agitation and sedation scale (N-PASS)
- d. EVA ✓

### Retroalimentación

Las escalas más usadas y validadas en la población neonatal son: Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), Premature Infant Pain Profile (PIPP) y su reciente versión validada, Premature Infant Pain Profile Revised (PIPP-R), COMFORT scale, Neonatal pain, agitation and sedation scale (N-PASS) y Crying, Requires Oxygen for Saturation >95%, Increased Vital Signs, Expression, and Sleeplessness (CRIES)


La respuesta correcta es:

EVA

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Previo a la realización de un procedimiento invasivo menor en el neonato, se administrará analgesia no farmacológica. ¿cuál es la medida de elección primaria si el neonato puede succionar?

Seleccione una:

- a. Chupete
- b. Sacarosa
- c. Lactancia materna ✓
- d. Contención

### Retroalimentación


La leche materna como amamantamiento sería la primera medida a elegir si está disponible, y si las características del pretérmino permiten la succión. Se debe de colocar al pecho al menos 15 minutos antes del procedimiento y no interrumpirla durante el mismo

La respuesta correcta es: Lactancia materna

## Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En un paciente portador de un drenaje quirúrgico, se vigilará:

Seleccione una:

- a. Permeabilidad
- b. Localización
- c. Fijación
- d. Todas son correctas ✓

### Retroalimentación


Ante la presencia de drenajes quirúrgicos se vigilará permeabilidad, cantidad y características del drenado, localización, fijación y pérdidas peridrenajes.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué medidas recomendarías a una madre de un bebé prematuro para mejorar la producción de leche materna?. Selecciona la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Utilizar sacaleches de doble salida
- b. Masajear la mama previamente a la extracción con sacaleches
- c. Favorecer el contacto visual con el bebé
- d. Extracción durante el canguro ✓

## Retroalimentación


Para mejorar la producción de leche materna se recomienda entre otras medidas: masajear las mamas previa a la extracción con el sacaleches, utilizar sacaleches de doble salida, favorecer la intimidad y el contacto visual con el bebé en el momento de la extracción, y realizar la extracción tras realizar cuidado canguro si es posible.

La respuesta correcta es: Extracción durante el canguro

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a las consecuencias a largo plazo del dolor en el neonato, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Las exposiciones repetidas al dolor tan solo tienen consecuencias inmediatas
- b. Se pueden dar alteraciones en la función cognitiva y motora ✓
- c. Las consecuencias a largo plazo, solo se dan en el sistema sensorial del dolor
- d. Existe un aumento del umbral del dolor

## Retroalimentación

Las experiencias repetidas y continuadas al dolor en el neonato prematuro tienen efectos a corto y largo plazo, disminuyendo el umbral del dolor, hiperalgesia y alodinia, además de alteraciones en la función cognitiva y motora, en el comportamiento, en la personalidad entre otros


La respuesta correcta es:

Se pueden dar alteraciones en la función cognitiva y motora

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué signos se encuentran en la atresia esofágica?

Seleccione una:

- a. Exceso de saliveo
- b. No progresión de sonda gástrica
- c. Dificultad respiratoria
- d. Todas son correctas ✓

### Retroalimentación


Los signos y síntomas que presentará el neonato serán sialorrea, incapacidad para tragar saliva, intolerancia digestiva y no progresión de la sonda gástrica. Si además presenta FTE aparecerá cianosis, distensión abdominal (si FTE fistal), atragantamiento y neumonía por aspiración.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En el paciente neonato postquirúrgico portador del silo, realizaremos los siguientes cuidados:

Seleccione una:

- a. Mantener la tensión del mismo, vigilando la sutura del silo a la piel ✓
- b. Realizar cambios posturales, soltando la tensión del silo
- c. Fomentar que los padres cojan en brazos al bebé, soltando el silo
- d. Soltar el silo una vez por turno

## Retroalimentación

En el paciente portador de silo, se vigilará la tensión del silo, manteniendo al neonato lo más tranquilo posible, para disminuir así la presión intrabdominal, por lo tanto aquellas medidas que modifiquen la tensión del silo estarán contraindicadas, como que los padres lo cojan. Además las asas intestinales deben de estar cubiertas por plástico transparente para poder visualizar la coloración de las mismas.


La respuesta correcta es:

Mantener la tensión del mismo, vigilando la sutura del silo a la piel

## Pregunta 15

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Cual de las siguientes anomalías congénitas es la menos frecuente?

Seleccione una:

- a. Hernia diafragmática congénita
- b. Onfalocele
- c. Gastrosquisis ✓
- d. Atresia de esófago

## Retroalimentación

De menor a mayor incidencia: La incidencia de la gastrosquisis 2 a 5 por cada 10000 nacidos vivos; de la hernia diafragmática congénita es de 1 de cada 4000 nacidos; atresia de esófago 1 de cada 2400 a 4500 nacimientos ; el onfalocele 1-3 por 1 000 nacidos vivos.


La respuesta correcta es:

Gastrosquisis

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a los cuidados en la gastrostomía. Seleccione la incorrecta:  
Seleccione una:

- a. Limpiar el estoma con agua y jabón
- b. Limpiar el estoma con clorhexidina alcohólica. ✓
- c. Vigilar la piel periestomal
- d. Girar el dispositivo sobre el estoma varias veces al día para evitar adherencias

### Retroalimentación


Limpiar el estoma con agua y jabón de dentro hacia fuera, en dispositivos con anclaje externo, este se levantará para limpiar debajo y posteriormente se volverá a fijar bien a piel (se evitan fugas que alteran la integridad de esta piel). Girar el dispositivo sobre el estoma varias veces al día para evitar adherencias y minimizar el roce con la piel Vigilar la piel periestomal

La respuesta correcta es: Limpiar el estoma con clorhexidina alcohólica.

## Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En la extrofia vesical se encuentra:  
Seleccione una:

- a. Protrusión de la vejiga sobre la pared abdominal, de forma que queda expuesta y en contacto con el exterior.
- b. Epispadias completo
- c. Ninguna es correcta
- d. A y B son correctas ✓


## Retroalimentación

La extrofia vesical extrofia consiste en la protrusión de la vejiga sobre la pared abdominal, de forma que queda expuesta y en contacto con el exterior. El ombligo se desplaza inferiormente y se produce una amplia separación de las ramas púbicas en la línea media y de los músculos rectos. En los varones suele verse un epispadias completo, criptorquidia y hernias inguinales. En las niñas suele presentarse también el epispadias con separación de ambos lados del clítoris (clítoris bifido). En ambos sexos el ano suele desplazarse hacia delante e incluso puede producirse un prolapso rectal. La respuesta correcta es: A y B son correctas

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Cual es una de las medidas inmediatas en el paciente con atresia de esófago?

Seleccione una:

- a. Colocar sonda rectal
- b. Colocar sonda replogle con aspiración suave ✓
- c. Realizar intubación orotraqueal
- d. Iniciar alimentación enteral

## Retroalimentación

Se colocará en el fondo del saco una sonda Replogle de acceso naso/orogastico (10 french entre 9-11 cm), con aspiración continua


La respuesta correcta es:

Colocar sonda replogle con aspiración suave

## Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes complicaciones no es frecuente en la extrofia vesical?

Seleccione una:

- a. Incontinencia urinaria
- b. Reflujo vesicouretral
- c. Incontinencia doble ✓
- d. Descontento con aspecto externo de genitales

### Retroalimentación


Las complicaciones frecuentes en la extrofia vesical son: infecciones (reflujo vesicouretral), incontinencia y escapes de orina, descontento con aspecto externo de genitales y mayor riesgo de padecer cáncer de vejiga.

La respuesta correcta es: Incontinencia doble

## Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Durante la reanimación de un neonato con hernia diafragmática congénita que intervención no está indicada:

Seleccione una:

- a. Evaluación durante el minuto de oro de vida
- b. Realizar el test de Apgar
- c. Ventilar con ambú ✓
- d. Colocar sonda gástrica de gran calibre.

### Retroalimentación

Ventilar con ambú

La respuesta correcta es:

Ventilar con ambú

[Finalizar revisión](#)