

Pregunta 1

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿cuáles son las cifras objetivo de TAS en los cuidados post-parada?

Seleccione una:



- a. Mayor de 80mmHg
- b. Mayor de 60mmHg
- c. Mayor de 110mmHg
- d. Mayor de 90mmHg

Pregunta 2

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale cual de los siguientes NO es un mecanismo neuroprotector de la hipotermia

Seleccione una:



- a. Reducción del metabolismo neuronal
- b. Modulación de la respuesta inflamatoria.
- c. Disminución del edema neurogénico
- d. Todas son mecanismos neuroprotectores de la hipotermia.

Pregunta 3

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo se administra la adrenalina intra PCR según la AHA?

Seleccione una:



- a. En un suero en 100cc de suero glucosado



b. Cada 3-5 min



c. Durante unos 30-60 minutos.



d. Junto con la Amiodarona.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la INCORRECTA respecto al uso del DESA.

Seleccione una:



a. Durante el análisis del ritmo se puede tocar a la víctima.



b. Es seguro mantener las compresiones mientras el DESA está cargando



c. Si hay sudor o agua en el pecho de la víctima conviene secarlo rapidamente para poder pegar bien los parches.



d. Tras la descarga iniciar compresiones.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no se considera una causa reversible de PCR por la AHA?

Seleccione una:



a. Traumatismo craneo-encefálico



b. Taponamiento cardiaco



c. Neumotorax a tensión



d. Trombosis pulmonar

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si a un paciente que no respira y no tiene pulso al conectarle el desfibrilador observamos una taquicardia de QRS estrecho regular estamos ante un ritmo:

Seleccione una:

- ☐ a. Desfibrilable
- ☒ b. No desfibrilable
- ☐ c. Cardiovertible
- ☐ d. Es un artefacto.

Pregunta 7

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué FiO2 aproximada tiene el aire que insuflamos mediante la técnica del boca a boca?

Seleccione una:

- ☐ a. Entorno a 50%
- ☐ b. Al menos 30%
- ☐ c. Del 100% si hay un sello adecuado.
- ☒ d. Entre 16-18%

Pregunta 8

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿cuándo deben cambiarse los reanimadores durante la RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Cada 30 compresiones.
- ☒ b. Cada 2 minutos o 5 ciclos de RCP.
- ☐ c. No deben cambiarse a menos que uno esté demasiado fatigado.
- ☐ d. Cada 5 minutos o 2 ciclos de RCP.

Pregunta 9

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si tenemos un paciente en PCR por ritmo no desfibrilable al que se le está haciendo RCP y en el siguiente análisis de ritmo pasa a desfibrilable ¿Qué se debe hacer?

Seleccione una:



a. Continuar con Compresiones y ventilaciones hasta el siguiente análisis, claramente se trata de un artefacto.



b. Aplicar una desfibrilación lo antes posible.



c. Interrumpir compresiones y cuando el desfibrilador esté preparado aplicar una descarga.



d. Administrar una dosis de amiodarona lo antes posible mientras se continúa con RCP.

Pregunta 10

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un ritmo no desfibrilable, ¿Cuándo se administra la Amiodarona?

Seleccione una:



a. Tras la 2ª descarga



b. Tras la 3ª descarga junto con la adrenalina



c. Tras la 3ª descarga sola.



d. Nunca

Pregunta 11

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En un paciente con asistolia en qué momento debemos administrar la primera dosis de adrenalina?

Seleccione una:



a. Tras la segunda descarga



b. En cuanto se tenga un acceso IV/IO



c. Tras la segunda comprobación de ritmo



d. La adrenalina no está indicada en este ritmo.

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si un paciente presenta un ritmo desfibrilable pero nuestro desfibrilador es monofásico ¿Qué dosis de energía sería necesaria?

Seleccione una:



a. 100-150J



b. 200J en la primera descarga



c. 360J



d. 300J en la primera descarga y 360 en la segunda.

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En Soporte vital avanzado ¿cuál de las siguientes acciones le parece prioritaria?

Seleccione una:



a. Conectar el desfibrilador para valorar si el ritmo es desfibrilable.



b. Colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea



c. Canalizar un acceso IV/IO



d. Administrar adrenalina 1mg

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿cuáles son los problemas principales que pueden aparecer durante la fase de inducción a temperaturas bajas en el manejo de la temperatura corporal tras RCE?

Seleccione una:

- ☒ a. Hipopotasemia
- ☐ b. Hipoglucemia
- ☐ c. Anuria
- ☐ d. Todas son correctas

Pregunta 15

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación del manejo de la temperatura corporal?

Seleccione una:

- ☐ a. No debe iniciarse en la atención prehospitalaria.
- ☐ b. La temperatura seleccionada debe estar entre 32-36º
- ☐ c. Está indicada en ritmos desfibrilables
- ☒ d. Está contraindicada en pacientes con ritmos No desfibrilable

Pregunta 16

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué complicaciones pueden aparecer durante la fase de recalentamiento en un paciente sometido a Manejo de la temperatura corporal?

Seleccione una:

- ☐ a. Hiperpotasemia
- ☐ b. Hipoglucemia
- ☐ c. Temblores
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 17

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál debe ser nuestra primera actuación al llegar a una escena con un paciente que parece inconsciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar la consciencia de la víctima
- ☐ b. Comprobar pulso
- ☒ c. Comprobar que la escena es segura.
- ☐ d. Comprobar si respira

Pregunta 18

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto tiempo debemos emplear en comprobar el pulso del paciente en la valoración inicial?

Seleccione una:

- ☐ a. Al menos 15 segundos
- ☐ b. Entre 2-5 segundos
- ☐ c. El suficiente para estar seguros de que no hay pulso.
- ☒ d. Entre 5-10 segundos

Pregunta 19

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la relación óptima entre compresiones-ventilaciones en la RCP en un adulto?

Seleccione una:

- ☐ a. 15:2 solo si hay dos reanimadores
- ☒ b. 30:2



c. 100 compresiones por minuto sin ventilaciones



d. 15;2

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuándo debe hacerse la valoración neurológica para establecer el pronóstico del paciente?

Seleccione una:



a. Justo tras la RCE



b. A las 72h del restablecimiento de la normotermia



c. Tras 24h de ingreso aunque esté bajo hipotermia



d. A los 5 días de ingreso.