

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No se considera donación en asistolia controlada:

Seleccione una:

- a. Pacientes a la espera del paro cardiaco.
- b. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica en hospital.
- c. Pacientes con resucitación extrahospitalaria infructuosa. ✓
- d. Pacientes con paro cardiaco y muerte encefálica antes de quirófano.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- a. Ecografía.
- b. Compresor torácico mecánico.
- c. RCP-ECMO Extracorporea.
- d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aerea en RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- a. La Frova.



b. Canula orofaringea.



c. La maniobra frente-menton. **X**



d. El combitube.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "T" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:



a. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Pulmonar 5)Trombosis Coronaria. **✓**



b. 1)HemoneumoTórax abierto 2)Talasemia 3)Tóxicos 4)Trauma 5)Torniquete.



c. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Venosa Profunda 5)Trombosis Coronaria.



d. 1)Timo 2)Talamo 3)Tiroides 4)Talio 5)Temperatura

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:

Seleccione una:



a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. **✓**



b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.



c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.



d. El golpe precordial.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La relación de compresiones torácicas -ventilaciones en una RCP de adulto, es:

Seleccione una:

- a. 30:2. ✓
- b. 15:1.
- c. 15:2.
- d. 30:1.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:

Seleccione una:

- a. Tras la 2ª descarga.
- b. Tras la 3ª adrenalina.
- c. Tras la 3ª descarga. ✓
- d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte subita, implica:

Seleccione una:

- a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓
- b. Posible donación en asistolia controlada.
- c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).
- d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP-A ¿A partir de que descarga se administra la Amiodarona?

Seleccione una:

- a. 15.
- b. 30.
- c. 3. ✓
- d. 5.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Sistólica (TAS) de un niño recién nacido medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- a. 50-75 mmHg. ✓
- b. 60-80 mmHg.
- c. 120 mmHg.
- d. 40-50 mmHg.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al mejor indicador de la eficiencia de la RCP-A es:

Seleccione una:

- a. La capnometría/capnografía. ✓
- b. La pulsioximetría.



c. Un electrocardiograma.



d. Una gasometria arterial basal.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Puede un desfibrilador semiautomático tipo DESA/DEA causar daño a un paciente:

Seleccione una:



a. Si, de no estar en PCR.



b. No, sólo descargará energía si el paciente en PCR tiene el ritmo adecuado. ✓



c. Si, si tiene un ritmo de PCR NO desfibrilable.



d. Si, si se invierte la colocación de los parches adhesivos en un DESA/DEA monofasico sin toma de tierra.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es motivo de exclusión del procedimiento de donante en asistolia:

Seleccione una:



a. Neoplasias previas. ✓



b. Más de 50 años de edad.



c. Muerte no esperada.



d. Accidente doméstico.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las recomendaciones de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) la comunicación del planteamiento de la donación, siempre que sea posible, la realizará:

Seleccione una:

- a. El mismo profesional que comunicó el fallecimiento.
- b. Un psicólogo clínico experto en urgencias y emergencias.
- c. Un profesional diferente al que comunicó el fallecimiento. ✓
- d. Sólo el coordinador de la ONT del hospital receptor.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto julios programaremos en la primera descarga, para desfibrilar en RCP-A con un equipo bifásico?

Seleccione una:

- a. 100-120 Julios.
- b. 500 watios.
- c. 150-360 Julios.
- d. 150-200 Julios. ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

Seleccione una:

- a. Entre 7 a 10. ✓
- b. De 3 a 5.
- c. De 10 a 12.
- d. 8.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que no haremos ante una PCR intrahospitalaria:

Seleccione una:

- a. Llamar al equipo de reanimación/parada.
- b. Iniciar RCP cuanto antes.
- c. Buscar un DESA/DEA o desfibrilador manual y un carro de parada.
- d. Llamar al 112. ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la comprobación de la respiración en RCP básica usamos la fórmula:

Seleccione una:

- a. Veo-Oigo-Siento. ✓
- b. Ver-Oir-Saber.
- c. A-B-C.
- d. START.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

Seleccione una:

- a. Llamar al socorrista acuático.
- b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓

- c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.
- d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- a. El médico.
- b. El centro coordinador.
- c. El aspirador de secreciones. ✓
- d. El cardio-compresor.