

[Saltar a contenido principal](#)[Postgrados](#)[Universitarios](#)[Formación](#)[acreditada](#)[Evaluación de las](#)[Competencias](#)[Oposiciones](#)[Formación EIR](#)[Proyectos 2019](#)[Aula Virtual](#)[CISCEN](#)Francisco Salmerón Ibarra | [Perfil](#) | [Salir](#)

Navegación por el cuestionario

[Pregunta 1 Esta página](#) [Pregunta 2 Esta página](#) [Pregunta 3 Esta página](#) [Pregunta 4 Esta página](#) [Pregunta 5 Esta página](#) [Pregunta 6 Esta página](#) [Pregunta 7 Esta página](#) [Pregunta 8 Esta página](#) [Pregunta 9 Esta página](#) [Pregunta 10 Esta página](#) [Pregunta 11 Esta página](#) [Pregunta 12 Esta página](#) [Pregunta 13 Esta página](#) [Pregunta 14 Esta página](#) [Pregunta 15 Esta página](#) [Pregunta 16 Esta página](#) [Pregunta 17 Esta página](#) [Pregunta 18 Esta página](#) [Pregunta 19 Esta página](#) [Pregunta 20 Esta página](#) [Finalizar revisión](#)

Comenzado el viernes, 29 de marzo de 2019, 18:55

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 29 de marzo de 2019, 19:11

Tiempo empleado 16 minutos 19 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la comprobación de la respiración en RCP básica usamos la fórmula:

Seleccione una:

- ☒ a. Veo-Oigo-Siento. ✓
- ☐ b. Ver-Oir-Saber.
- ☐ c. A-B-C.
- ☐ d. START.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es
Seleccione una:

- ☐ a. 10:1.
- ☐ b. 11:15.
- ☒ c. 15:2. ✓
- ☐ d. 5:2.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☐ a. 60-80 mmHg.
- ☐ b. 95 mmHg.
- ☐ c. 50-80 mmHg.
- ☒ d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según la clasificación de Maastricht, un fallecido fuera de un hospital por muerte súbita, implica:

Seleccione una:

- ☒ a. Posible donación en asistolia no controlada. ✓
- ☐ b. Posible donación en asistolia controlada.
- ☐ c. Una PCR refractaria que precisara E-RPC (ECMO).
- ☐ d. Posible donante, sólo si porta el carné que lo identifique como tal.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Puede un desfibrilador semiautomático tipo DESA/DEA causar daño a un paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Si, de no estar en PCR.
- ☒ b. No, sólo descargará energía si el paciente en PCR tiene el ritmo adecuado. ✓
- ☐ c. Si, si tiene un ritmo de PCR NO desfibrilable.
- ☐ d. Si, si se invierte la colocación de los parches adhesivos en un DESA/DEA monofasico sin toma de tierra.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el test de APGAR la puntuación mínima será:

Seleccione una:

- ☒ a. 0. ✓
- ☐ b. 3 como en la escala de coma de glasgow, no puede existir la puntuación 0.
- ☐ c. 2.
- ☐ d. 1.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de que aparezcan signos evidentes de isquemia en el ECG de un paciente en fase post-parada, deberemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Ignorarlos, es secundario a la RCP.
- ☒ b. Hacer una angiografía coronaria urgente. ✓
- ☐ c. Inducir una hipotermia severa.
- ☐ d. Tratar las tiritonas que causan los cambios en el ECG.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. El médico.
- ☐ b. El centro coordinador.
- ☒ c. El aspirador de secreciones. ✓
- ☐ d. El cardio-compresor.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un cuidado post-parada:

Seleccione una:

- ☐ a. Vía aérea avanzada.
- ☐ b. Control de temperatura.
- ☐ c. Mantener oxigenación.
- ☒ d. Retirar capnografía. ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La relación de compresiones torácicas -ventilaciones en una RCP de adulto, es:

Seleccione una:

- ☒ a. 30:2. ✓
- ☐ b. 15:1.
- ☐ c. 15:2.
- ☐ d. 30:1.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cinco "T" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- ☒ a. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Pulmonar 5) Trombosis Coronaria. ✓
- ☐ b. 1)HemoneumoTórax abierto 2)Talasemia 3)Tóxicos 4)Trauma 5)Torniquete.
- ☐ c. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Venosa Profunda 5)Trombosis Coronaria.
- ☐ d. 1)Timo 2)Talamo 3)Tiroides 4)Talio 5)Temperatura

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores normales de Frecuencia Respiratoria (FR) de un niño de 3 a 6 años son:

Seleccione una:

- ☐ a. 15-30 rpm.
- ☒ b. 15-20 rpm. ✓
- ☐ c. 20-30 rpm.
- ☐ d. 10-15 rpm.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:

Seleccione una:

- ☒ a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓
- ☐ b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.
- ☐ c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.
- ☐ d. El golpe precordial.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aerea en RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. La Frova.
- ☒ b. Canula orofaringea. ✓
- ☐ c. La maniobra frente-menton.
- ☐ d. El combitube.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es el valor de APGAR del niño sano:

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 7 a 10. ✓
- ☐ b. De 3 a 5.
- ☐ c. De 10 a 12.
- ☐ d. 8.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la dosis de Amioradona que se administra tras la 5ª descarga en PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. 300 mg.
- ☐ b. 120 mg.
- ☒ c. 150 mg. ✓
- ☐ d. 200 mg.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una OVACE, con tos productiva y sospechando obstrucción parcial, NO es correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Incentivar y animar a toser.
- ☐ b. Prepararse para una mala evolución de la obstrucción.
- ☐ c. Vigilar la posible salida del cuerpo extraño de la o en la orofaringe.
- ☒ d. Realizar al paciente 5 compresiones abdominales, colocándolo para ello tumbado en el suelo.



Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cada cuantos minutos podemos administrar Adrenalina en un PCR?

Seleccione una:

- ☐ a. De 1 a 2 minutos.
- ☒ b. De 3 a 5 minutos. ✓
- ☐ c. Cada 10 minutos.
- ☐ d. De 10 a 15 minutos.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es motivo de exclusión del procedimiento de donante en asistolia:

Seleccione una:

- ☒ a. Neoplasias previas. ✓
- ☐ b. Más de 50 años de edad.
- ☐ c. Muerte no esperada.
- ☐ d. Accidente doméstico.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde la de la piscina, antes de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

Seleccione una:

- ☐ a. Llamar al socorrista acuático.
- ☒ b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓
- ☐ c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.
- ☐ d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

[Finalizar revisión](#)