

NTICONCEPCION EFICAZ- OLVIDOS E INCOVENIENTES

1. Entre las complicaciones obstétricas del embarazo adolescente no se halla:
D. Alimentación adecuada.
2. Entre los condicionamientos y complicaciones del embarazo adolescente vemos:
D. Maltrato infantil.
3. Es falso respecto a la mayoría de las madres adolescentes en el momento de la concepción de su primer hijo:
E. Tienen independencia económica.
4. La maternidad adolescente NO anticipa y precipita:
C. La tasa de éxito laboral.
5. La maternidad adolescente NO retrasa:
B. Aumenta las tasas de actividad.
6. El aborto se despenalizó en España en el año:
B. 1985
7. Entre los factores que intervienen en los embarazos no deseados en adolescentes, podemos observar todos los siguientes, excepto:
B. Utilización de métodos anticonceptivos.
8. No forman parte de los programas de Educación Sexual para la prevención del embarazo no deseado:
C. Desaconsejar uso de preservativos para evitar ETS y VIH/SIDA.
9. La píldora postcoital:
D. No protege contra el VIH/SIDA, ni contra otras enfermedades de transmisión Sexual (ETS).
10. Los métodos anticonceptivos preferidos por la adolescencia son:
A. El preservativo y la contracepción hormonal oral.
11. Dentro de las implicaciones que el embarazo adolescente tiene en la sexualidad, encontramos:
D. Un 60% de las madres adolescentes vuelven a embarazarse dentro de los 2 años siguientes.
12. Entre las múltiples alteraciones en la vida social y afectiva de las madres adolescentes con vivencia negativa de la sexualidad, podemos encontrar todo lo siguiente excepto:
D. Alta autoestima.
13. ¿La píldora anticonceptiva se legalizó en España y en Estados Unidos en los años?
D. 1978 y 1960 respectivamente.
14. En el siglo XXI, la anticoncepción ideal debería cumplir diferentes condiciones, excepto:
C. Ser irreversible.
15. Entre las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo. ¿Cuál es cierta?
A. Las menores de 19 años son las mujeres que menos utilizan métodos anticonceptivos.
16. En las diferentes Comunidades Autónomas existe una normativa y/o programas propios ¿Cual es cierta?
D. Hay diferencias importantes entre Comunidades Autónomas sobre las normativas y programas.
17. Efectos beneficiosos no contraceptivos de los LARC, no se observa protección frente a:
E. Todas las anteriores.
18. Efectos beneficiosos no contraceptivos y protección frente al cáncer de los ACH son los siguientes excepto:
A. Cáncer de mama.
19. Efectos adversos más frecuentes que motivan el abandono del método anticonceptivo:
E. Todas.
20. Indica el perfil clínico de los métodos denominados LARC (Long Acting Reversible Contraconception):
E. Todas.
21. Señala la incorrecta en relación a la AHOSG (anticoncepción hormonal oral sólo gestágenos):
E. Todas son correctas.
22. Los inyectables sólo de gestágenos (acetato de medroxiprogesterona) constituyen un método anticonceptivo con las siguientes indicaciones excepto:
B. Alto nivel socio-económico-
23. Elige cual es la respuesta correcta respecto al consejo anticonceptivo:
E. Todas son ciertas.
24. El Consejo anticonceptivo:
C. Debe darse a toda mujer en periodo fértil.
- 25.- Es necesario, antes de iniciar un plan anticonceptivo, excluir el embarazo cuando:
E. Si esta con lactancia artificial y se encuentra en amenorrea, antes de los 6 meses post parto.
26. Cual es el único requisito para la prescripción de cualquier método anticonceptivo:
B. Anamnesis.
27. Señale en cuál de los siguientes supuestos NO debe utilizarse el DIU de cobre:
E. En ninguno de los anteriores supuestos.
28. Respecto a las complicaciones del DIU de cobre, señale la correcta:
D. El dispositivo no aumenta el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica.
29. Señale la opción correcta sobre el DIU de cobre:
E. Comienza su acción de forma inmediata tras insertarlo.
30. Ana, es una mujer de 41 años, nulípara, con antecedente de un aborto hace 9 años. Tiene ciclos menstruales cada 30 días, con sangrados abundantes y prolongados. En su última analítica, presenta una hemoglobina de 9.8 g/dl y ferritina de 9. Ha sido valorada en varias ocasiones por ginecología con diagnóstico de miomas uterinos que no deforman cavidad. Acude a consulta de su médico de familia preguntando por métodos anticonceptivos que pudieran mejorar sus sangrados y a la vez actuar como anticonceptivo. Señale la respuesta correcta.
D. El DIU hormonal produciría en esta paciente una alteración en el patrón menstrual, disminuyendo la cantidad y

duración de sangrado, llegando incluso a amenorrea.

31. ¿Cuál de las siguientes situaciones es contraindicación absoluta (categoría 4 OMS) para la utilización del DIU hormonal?

C.Observación de cérvix " en fresa" en la exploración previa a la inserción.

32. Marta, acude a la consulta refiriendo que desea insertarse un DIU hormonal de levonorgestrel, pero está algo preocupada porque su vecina le ha comentado que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de mama. Señale la respuesta correcta.

B.No se ha encontrado asociación, según últimos estudios, entre la inserción de DIU hormonal y aparición de cáncer de mama o de endometrio.