

Son subsidiarias de tratamiento médico fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. Arritmias cardíacas
- ☐ b. Malformaciones renales
- ☒ c. Hernia diafragmática
- ☐ d. Teratoma sacrococcígeo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arritmias cardíacas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La patología que puede requerir transfusión fetal es:

Seleccione una:

- ☐ a. Infección por toxoplasma
- ☐ b. Infección por treponema
- ☒ c. Isoinmunización Rh
- ☐ d. Infección por VIH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Isoinmunización Rh

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es verdadero que:

Seleccione una:

- ☐ a. La punción del cordón umbilical se denomina cordocentesis

- ☐ b. La punción del corazón fetal se denomina cardiocentesis
- ☐ c. La punción de la vejiga fetal se denomina vesicocentesis
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF):

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene tratamiento
- ☒ b. En algunos casos está indicada la cirugía mediante fetoscopia
- ☐ c. Aparecen en gestaciones con feto único
- ☐ d. Las amniocentesis seriadas están contraindicadas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En algunos casos está indicada la cirugía mediante fetoscopia

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es cierto en referencia a la fetoscopia que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se utiliza un instrumento endoscópico que se introduce en cavidad amniótica o en el propio feto
- ☐ b. Es una técnica mínimamente invasiva

☐ c. Se realiza vía transabdominal

☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento médico fetal se puede realizar:

Seleccione una:

☐ a. A través de la gestante

☐ b. Directamente en el feto vía intramuscular

☐ c. Directamente en el feto vía subcutánea

☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es básico como requisito previo a la cirugía fetal:

Seleccione una:

☒ a. Realización de cariotipo fetal

☐ b. Placenta inserta en cara posterior

☐ c. Presentación cefálica

☐ d. Gestaciones mayores de 35 semanas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realización de cariotipo fetal

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las infecciones susceptibles de tratamiento médico se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Toxoplasmosis
- ☐ b. Sífilis
- ☐ c. Gonococia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son indicaciones de corrección mediante fetoscopia:

Seleccione una:

- ☒ a. Hernias diafragmáticas
- ☐ b. Comunicación interauricular
- ☐ c. Mielomeningocele
- ☐ d. Son correctas a y c

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La transfusión fetal se puede realizar mediante:

Seleccione una:

- ☒ a. Cordocentesis
- ☐ b. Amniocentesis
- ☐ c. Punción intracardiaca
- ☐ d. Son correctas a y c.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c.

En la taquicardia supraventricular fetal es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. La frecuencia cardiaca fetal oscila entre 220-260 latidos/minuto
- ☐ b. Puede conducir a una situación de fracaso cardiaco en 24-48 horas
- ☒ c. Se acompaña de una cardiopatía estructural en un 85% de los casos
- ☐ d. Como tratamiento de primera línea se utiliza la digoxina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se acompaña de una cardiopatía estructural en un 85% de los casos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las punciones percutáneas es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se trata de procedimientos mínimamente invasivos
- ☐ b. Se realizan vía transabdominal materna
- ☐ c. No utilizan los ultrasonidos
- ☒ d. Son correctas a y b

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y b

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del STFF:

Seleccione una:

- ☐ a. Los amniodrenajes seriados están contraindicados
- ☐ b. La fetoscopia es la mejor opción de tratamiento a las 33 semanas de gestación
- ☐ c. La oclusión del cordón del feto donante se emplea como tratamiento en casos muy seleccionados
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La oclusión del cordón del feto donante se emplea como tratamiento en casos muy seleccionados

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. La punción del cordón umbilical se denomina cordocentesis
- ☐ b. La punción del corazón fetal se denomina cardiocentesis
- ☒ c. La punción del tórax fetal se denomina paracentesis
- ☐ d. La punción de la vejiga fetal se denomina vesicocentesis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La punción del tórax fetal se denomina paracentesis

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El bloqueo aurículo-ventricular completo:

Seleccione una:

- ☐ a. Se caracteriza por una frecuencia ventricular <100 latidos/minuto

- ☐ b. Su mortalidad se sitúa en torno al 50%
- ☐ c. La mejor opción, siempre que el feto esté maduro, es la extracción de éste y colocación de un marcapasos
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es básico como requisito previo a la cirugía fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. Realización de cariotipo fetal
- ☐ b. Inmadurez pulmonar
- ☐ c. Descartar otra alternativa de tratamiento prenatal
- ☒ d. Todas son básicas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son básicas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la toxoplasmosis, es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una zoonosis
- ☒ b. El cuadro fetal cursa siempre subclínico
- ☐ c. El diagnóstico materno se basa en pruebas serológicas
- ☐ d. En el diagnóstico fetal se utilizan técnicas de PCR

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cuadro fetal cursa siempre subclínico

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las pautas de tratamiento más aceptadas en infección por toxoplasmosis son:

Seleccione una:

- ☐ a. Espiramicina como tratamiento preventivo de transmisión fetal
- ☐ b. Eritromicina como tratamiento de infección fetal
- ☐ c. Pirimetamina + espiramicina + sulfadiazina como tratamiento de infección fetal
- ☒ d. Son correctas a y c

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es subsidiario de tratamiento quirúrgico fetal ex útero:

Seleccione una:

- ☐ a. Hernia diafragmática
- ☒ b. Comunicación interventricular
- ☐ c. Mielomeningocele
- ☐ d. Tumores sacrococcígeos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicación interventricular

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento de la patología tiroidea en la gestante:

Seleccione una:

- ☐ a. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipotiroidismo materno
- ☐ b. El hipertiroidismo se trata con la administración al feto de hormonas tiroideas
- ☐ c. El tratamiento de elección en el hipertiroidismo es el propiltiouracilo vía oral a la gestante



d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tratamiento de elección en el hipertiroidismo es el propiltiouracilo vía oral a la gestante

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto en referencia a la fetoscopia que:

Seleccione una:



a. Consiste en la visualización del feto



b. Es una técnica mínimamente invasiva



c. Se realiza vía transcervical



d. Se utiliza un instrumento endoscópico que se introduce en la cavidad amniótica o en el propio feto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realiza vía transcervical

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las infecciones susceptibles de tratamiento médico no se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Toxoplasmosis
- ☒ b. Rubéola
- ☐ c. Sífilis
- ☐ d. Gonococo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rubéola

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las principales anomalías fetales que se pueden corregir por fetoscopia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Hernias diafragmáticas
- ☐ b. Mielomeningocele
- ☐ c. Obstrucciones del tracto urinario
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La terapia quirúrgica fetal ex útero incluye:

Seleccione una:

- ☐ a. Laparotomía
- ☐ b. Extracción fetal
- ☐ c. Histerotomía
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las indicaciones más frecuentes de punciones percutáneas fetales no se encuentran:

Seleccione una:

- ☒ a. Hidrocefalia
- ☐ b. STFF
- ☐ c. Hidronefrosis
- ☐ d. Megavejiga

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hidrocefalia

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica EXIT:

Seleccione una:

- ☐ a. Se utiliza en las patologías que pueden ocasionar obstrucción de las vías aéreas del feto inmediato al nacimiento
- ☐ b. Significa tratamiento intraparto in útero
- ☐ c. Utiliza el soporte placentario
- ☒ d. Son correctas a y c

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la sífilis:

Seleccione una:

- ☐ a. El fármaco de elección en la sífilis primaria es la penicilina G benzatina

- ☐ b. El fármaco de elección en la sífilis secundaria es la penicilina G benzatina
- ☐ c. El fármaco de elección en la sífilis en fase latente es la penicilina G benzatina
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hiperplasia suprarrenal congénita:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una alteración genética autosómica recesiva
- ☐ b. Se utiliza tratamiento con corticoides para evitar virilización fetal cuando la alteración es materna
- ☐ c. Se utiliza tratamiento con corticoides para evitar virilización cuando la alteración es fetal
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF):

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece en las gestaciones gemelares bicoriales
- ☒ b. Es debido a anastomosis arterio-venosas intraplacentarias
- ☐ c. No existe tratamiento
- ☐ d. No afecta al pronóstico de la gestación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es debido a anastomosis arterio-venosas intraplacentarias

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sífilis puede ocasionar en el feto:

Seleccione una:

- ☐ a. Hepatoesplenomegalia
- ☐ b. Anemia
- ☐ c. Ascitis
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

El porcentaje de depresión sufrida tras una muerte peri natal es:

Seleccione una:

- ☐ a. Muy bajo , menor de 5%
- ☒ b. Entre un 20-25%
- ☐ c. Alrededor de un 10%
- ☐ d. Por encima de un 40%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre un 20-25%

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Depresión, negación y culpa forman parte de:

Seleccione una:

- ☐ a. Manifestaciones somáticas
- ☐ b. Manifestaciones emocionales
- ☐ c. Problemas cognitivos
- ☒ d. Dificultades sociales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultades sociales

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La muerte de un gemelo y la supervivencia del otro puede producir:

Seleccione una:

- ☐ a. Un duelo encubierto
- ☐ b. Un duelo menos intenso y doloroso
- ☒ c. Un duelo difícil de superar
- ☐ d. Un proceso similar la duelo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un duelo difícil de superar

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un síntoma cognitivo del duelo puede ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Incredulidad
- ☐ b. Aislamiento
- ☒ c. Dificultad en la toma de decisiones



d. Preocupación por la muerte

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultad en la toma de decisiones

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Comunicación efectiva en el duelo significa:

Seleccione una:



a. Hacer preguntas cerradas y sencillas



b. Hacer varias preguntas a la vez



c. Hacer preguntas abiertas de una en una



d. Esperar a que nos demanden información sin hacer preguntas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hacer preguntas abiertas de una en una

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fase de desorganización en el proceso del duelo se produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre el 1º y el 3º mes
- ☒ b. Entre el 5º y el 9º mes
- ☐ c. Después del primer año
- ☐ d. Al final del primer trimestre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 5º y el 9º mes

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para hacer real la pérdida podemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Ponerle nombre y bautizarlo
- ☐ b. Permitir que el entorno familiar vea al bebe
- ☒ c. Crear recuerdos
- ☐ d. Entregar doble certificado de defunción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Crear recuerdos

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una característica no común del duelo patológico, podría ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Autoinculpacion o sentimiento de fracaso
- ☒ b. Shock
- ☐ c. Hostilidad hacia el personal sanitario
- ☐ d. Sentimientos negativos hacia otros recién nacidos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el proceso del duelo perinatal no es frecuente:

Seleccione una:

- ☐ a. Pensamientos incapacitantes
- ☐ b. Pensamientos suicidas
- ☒ c. Pensamientos ansiógenos
- ☐ d. Pensamientos auto-agresivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pensamientos suicidas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ver y tocar al bebe es:

Seleccione una:

- ☐ a. Científicamente efectivo
- ☐ b. Empíricamente desaconsejable
- ☒ c. No hay evidencia empírica de su efectividad
- ☐ d. ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No hay evidencia empírica de su efectividad

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las respuestas disfuncionales de duelo están:

Seleccione una:

- ☒ a. Negación manifiesta
- ☐ b. Conductas autoagresivas

- ☐ c. Distorsiones cognitivas
- ☐ d. Llanto excesivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conductas autoagresivas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El nacimiento social de un sujeto:

Seleccione una:

- ☒ a. Suele ocurrir antes del nacimiento
- ☐ b. Se produce tras el parto
- ☐ c. Aparece en la interacción real madre-hijo
- ☐ d. Tiene lugar pasadas las primeras 24 horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suele ocurrir antes del nacimiento

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los diagnósticos de enfermería incluyen principalmente:

Seleccione una:

- ☒ a. Problemas psicológicos relacionados con el duelo
- ☐ b. Problemas físicos relacionados con el post-parto
- ☐ c. Problemas del entorno hospitalario
- ☐ d. Problemas concomitantes a su proceso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Problemas psicológicos relacionados con el duelo

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es aconsejable decir en estos casos a los padres:

Seleccione una:

- ☐ a. Me siento triste
- ☐ b. Lo siento
- ☒ c. El tiempo todo lo cura
- ☐ d. No se que decir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tiempo todo lo cura

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de enfermería no se debe prestar especial atención a:

Seleccione una:

- ☐ a. Al lenguaje verbal
- ☐ b. Al lenguaje escrito
- ☐ c. Al lenguaje no verbal
- ☒ d. Al lenguaje kinesico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al lenguaje escrito

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los síntomas sociales y psicológicos del duelo se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Tristeza y celos
- ☐ b. Llanto y fracaso
- ☐ c. Autocompasión y llanto
- ☒ d. Negación y tristeza

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Negación y tristeza

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por regla general, ante una muerte Perinatal:

Seleccione una:

- ☐ a. El personal de salud sabe que hacer en estos casos
- ☐ b. La mayoría de los profesionales no esta preparado
- ☒ c. Existen protocolos de actuación en todos los hospitales
- ☐ d. El hospital cuenta con un servicio de apoyo específico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mayoría de los profesionales no esta preparado

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un síntoma común en el duelo perinatal no es:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor de cabeza

- ☐ b. Dolor punzante de estomago
- ☐ c. Dolor en los brazos
- ☒ d. Dolor de garganta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor de garganta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la orientación anticipada se informa sobre:

Seleccione una:

- ☐ a. Tramites burocráticos
- ☒ b. Signos y síntomas asociados al duelo
- ☐ c. Presencia de pensamientos automáticos
- ☐ d. Formas de afrontamiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Signos y síntomas asociados al duelo

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las cuatro tareas del doliente, según Worden son:

Seleccione una:

- ☐ a. Aceptar la pérdida, superar el dolor, aceptar el ambiente y olvidar
- ☐ b. Rechazar la pérdida, aceptar el dolor, manejar el ambiente y continuar adelante
- ☐ c. Superar el dolor, silenciar la pérdida, aceptar el ambiente y olvidar
- ☒ d. Aceptar la pérdida, superar el dolor, adaptarse al ambiente y seguir adelante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aceptar la pérdida, superar el dolor, adaptarse al ambiente y seguir adelante