

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	lunes, 25 de marzo de 2024, 14:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 25 de marzo de 2024, 15:03
Tiempo empleado	19 minutos 19 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable: Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.
- b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
- c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la incorrecta. La compresión medula:

Seleccione una:

- a. En muchos casos supone el debut oncológico del paciente.
- b. La demora en la atención puede producir parálisis irreversible e incontinencia de esfínteres.
- c. No supone una emergencia médica. ✓
- d. A y b son correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.
- b. Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.
- c. Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.
- d. El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta. ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de la incapacidad de la persona para retener la orina, unido en la mayoría de los casos de un deseo continuo de orinar, nos referimos a: Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Retención urinaria.
- b. Tenesmo vesical.
- c. Espasmo vesical.
- d. Incontinencia urinaria. ✓

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los laxantes utilizados en el estreñimiento en el paciente paliativo se encuentra: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Laxantes osmóticos salinos y no salinos.
 - b. Lactulosa y macrogol.
 - c. Laxantes formadores de volumen o reguladores.
 - d. A y b son correctas ✓
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta. En el síndrome de vena cava superior.

Seleccione una:

- a. Entre los signos y síntomas se encuentra edema en esclavina, ingurgitación yugular y cianosis en cara y miembros superiores.
- b. Puede ser debida a tumores de pulmón, trombosis de vena cava superior por trastornos paraneoplásicos y pacientes con accesos venosos centrales relacionado con la trombosis del mismo.
- c. Entre los tratamientos se encuentra la radioterapia y colocación de endoprotesis.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a el ejercicio en el paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. El ejercicio al final de la vida debe ser reducido y focalizado en objetivos sencillos como pasar de la cama a la silla.
- b. El ejercicio al final de la vida debe incrementarse y aumentar la intensidad. ✓
- c. La presencia de metástasis y otros síntomas puede producir disminución de la función física y el estado general del paciente.
- d. Se debe fomentar la ocupación del paciente en su tiempo libre siempre que su situación lo permita, que lea, escriba o salga a pasear.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para la administración de fármacos en el paciente paliativo? Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
 - b. Subcutánea.
 - c. Oral. ✓
 - d. Rectal.
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente de 44 años con cáncer de próstata recientemente diagnosticado, refiere dolor intolerable en localizaciones múltiples. Su humor ha cambiado, está callado, ausente y su familia evita hablar de su enfermedad ¿Qué deberíamos establecer de manera prioritaria a la hora de instaurar un tratamiento? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. La prescripción de psicofármacos.
- b. La evaluación multidimensional del dolor. ✓
- c. La prescripción del tratamiento antineoplásico.
- d. La evaluación del estadio evolutivo de la enfermedad.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la evaluación de los síntomas del paciente con necesidades paliativas: Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se debe evaluar la intensidad de los mismo.
- b. La frecuencia con que se producen.
- c. La evaluación la hace el personal sanitario sin contar con el paciente. ✓
- d. La opinión del paciente es importante.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las terapias complementarias del dolor podemos encontrar. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Técnicas de relajación.
 - b. Musicoterapia.
 - c. Risoterapia.
 - d. Todas son correctas. ✓
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta. La expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores donde se produce un volumen de sangrado de 400-600ml /24h:

Seleccione una:

- a. Puede ser causada por infecciones, coagulopatias, carcinoma epidermoide y tratamientos con radioterapia.
- b. Es una hemoptisis leve. ✓
- c. Utilizar toallas, sábanas o paños de color oscuro para reducir el impacto psicológico de ver la sangre.
- d. Se recomienda reposo absoluto semisentado o en decúbito lateral sobre el lado del sangrado si se conoce.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Podemos encontrar como medidas generales para evitar las náuseas y los vómitos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Dieta fraccionada en 6-10 tomas.
- b. Buena postura, sentado, semisentado o incorporado si está en la cama. ✗
- c. Café, etc.
- d. A y B son correctas.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. El paciente sólo tolera líquidos.
- b. El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.
- c. El paciente presenta eritema en la mucosa oral. ✓
- d. El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paciente paliativo existen alteraciones en la nutrición debido a problemas al tragar, deglutir o masticar, náuseas, vómitos, anorexia, dificultades en la absorción y efectos secundarios a fármacos, de ahí que la enfermera como objetivo prioritario en los cuidados básicos establezca: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Invitaremos a que coma todo lo posible, cuanto más mejor.
- b. Se servirá en cantidades copiosas y platos grandes para nutrir bien al paciente.
- c. Añadiremos salsas picantes con textura adecuada para propiciar la deglución.
- d. Haremos hincapié en los cuidados higiénicos de la boca e hidratación adecuada. ✓

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hipercalcemia tumoral aparecen síntomas como: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anorexia.
- b. Polidipsia.
- c. Deshidratación.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La xerostomía es un síntoma frecuente en los pacientes paliativos. Entre sus causas están: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Fármacos como opioides y corticoesteroides.
 - b. Radioterapia.
 - c. A y b son correctas. ✓
 - d. La hiperhidratación.
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método válido para la detección de alteraciones en la deglución es: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Test clínico volumen viscosidad (MECV-V). ✓
- b. Test de Lattinen.
- c. MaGill Pain Questionnaire (MPQ).
- d. B y c son correctas.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A un paciente paliativo con diarrea le recomendaríamos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Limitar el azúcar y las grasas en la dieta. ✓
- b. Beber mucho volumen de líquidos de una sóla vez y con gran contraste de temperatura.
- c. Comer alimentos integrales, así como legumbres y frutas.
- d. Ingerir bebidas gaseosas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué se refiere el concepto de "dolor total" definido por la Dra. Cicely Saunders? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. A la suma de los dolores que refiere un paciente.
- b. A la queja del dolor por el paciente y su familia.
- c. A los aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales del dolor. ✓
- d. Al mecanismo, la intensidad y la clasificación del dolor.

Actividad previa

◀ Polos de manzanilla para la mucositis

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Atención enfermera al final de la vida ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>