

Comenzado el	martes, 20 de julio de 2021, 17:28
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 20 de julio de 2021, 17:29
Tiempo empleado	42 segundos
Puntos	4,00/20,00
Calificación	2,00 de 10,00 (20%)
Comentario -	No Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el antagonista de la morfina?

Seleccione una:

- ☐ a. El ácido valproico.
- ☐ b. La naloxona.
- ☐ c. El flumacenil.
- ☐ d. Los antihistamínicos.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: La naloxona.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Grandes dosis de diazepam IV intraparto pueden ocasionar:

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor susceptibilidad al kernicterus.
- ☐ b. Hipertonía neonatal.
- ☐ c. Hipertermia neonatal.
- ☐ d. a y c son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Mayor susceptibilidad al kernicterus.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El efecto depresor de los opioides sobre el feto y recién nacido se potencia por:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión arterial.
- ☐ b. Parto precipitado.
- ☐ c. Cesárea.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Cesárea.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La oxitocina:

Seleccione una:

- ☐ a. No influye en la diuresis.
- ☐ b. Tiene efecto diurético.
- ☐ c. Tiene efecto antidiurético
- ☐ d. Es antidiurética a bajas dosis y diurética a altas dosis.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: Tiene efecto antidiurético

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario de la oxitocina sobre el feto?

Seleccione una:

- ☐ a. Convulsiones en el postparto inmediato en recién nacidos a término con CIR.
- ☐ b. La hiperbilirrubinemia neonatal en partos inducidos.
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación


Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto se administra la meperidina?

Seleccione una:

- ☐ a. Cada 2-4 horas.
- ☐ b. Cada 4-6 horas.
- ☐ c. Cada 6-8 horas.
- ☐ d. Cada 12-24 horas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Cada 4-6 horas.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tiempo dura el efecto analgésico de la morfina IV?

Seleccione una:

- ☐ a. 20-40 minutos.
- ☐ b. 1-2 horas.
- ☐ c. 4 horas.
- ☐ d. 6 horas.

Retroalimentación


Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: 4 horas.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se sintetiza la oxitocina?

Seleccione una:

- ☐ a. En la placenta.
- ☐ b. En el fondo del útero.
- ☐ c. En el hipotálamo.

☐d. En la hipófisis.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: En el hipotálamo.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación de las prostaglandinas?

Seleccione una:

- ☐a. Enfermedad inflamatoria pélvica.
- ☐b. Cualquier tipo de asma.
- ☐c. Hipertensión arterial.
- ☐d. Cesárea anterior.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: Cualquier tipo de asma.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los antagonistas de los receptores H2:

Seleccione una:

- ☐a. Aumentan la secreción de ácido clorhídrico.
- ☐b. Reducen el pH gástrico.
- ☐c. Se usan para disminuir los efectos de una posible broncoaspiración del contenido gástrico
- ☐d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Se usan para disminuir los efectos de una posible broncoaspiración del contenido gástrico

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la administración de oxitocina durante el parto se aconseja ir doblando la dosis hasta conseguir una dinámica eficaz cada:

Seleccione una:

- ☐ a. 5-10 minutos.
- ☐ b. 15-20 minutos.
- ☐ c. 30-40 minutos.
- ☐ d. 45-60 minutos.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: 15-20 minutos.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un efecto materno del sulfato de magnesio?

Seleccione una:

- ☐ a. Bradicardia.
- ☐ b. Edema pulmonar.
- ☐ c. Somnolencia.
- ☐ d. Náuseas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: Bradicardia.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los anestésicos locales actúan:

Seleccione una:

- ☐ a. Bloqueando la conducción del impulso nervioso.
- ☐ b. Aumentando la permeabilidad del canal de sodio de la membrana celular.
- ☐ c. Incrementando la despolarización inicial del potencial de acción.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica espinal.

La respuesta correcta es: Bloqueando la conducción del impulso nervioso.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué dosis de oxitocina se aconseja en la profilaxis de la hemorragia postparto?

Seleccione una:

- ☐ a. 2 UI.
- ☐ b. 5 UI.
- ☐ c. 10 UI.
- ☐ d. 20 UI.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación Obstétrica.

La respuesta correcta es: 10 UI.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la parturienta a quien se le han administrado opioides se observará:

Seleccione una:

- ☐ a. Midriasis.
- ☐ b. Miosis.
- ☐ c. Diarrea.
- ☐ d. Aumento de la frecuencia respiratoria.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Miosis.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre la administración de los opiáceos durante el parto:

Seleccione una:

- ☐ a. La vía más utilizada es la intravenosa.
- ☐ b. La vía intravenosa puede ser en bolo o mediante perfusión continua.
- ☐ c. La vía intramuscular es más simple y estable en su intensidad y duración.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: La vía intravenosa puede ser en bolo o mediante perfusión continua.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja del uso de opioides espinales?

Seleccione una:

- ☐ a. La escasa incidencia de efectos adversos importantes.
- ☐ b. La reducción del prurito del anestésico.
- ☐ c. La reducción del bloqueo peridural.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica espinal.

La respuesta correcta es: La escasa incidencia de efectos adversos importantes.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La angustia emocional o el dolor físico, habituales en muchos partos, provoca hiperactividad simpática y un aumento consiguiente de los niveles sanguíneos de catecolaminas, fundamentalmente de adrenalina, lo que puede provocar:

Seleccione una:

- ☐ a. Disfunción uterina.
- ☐ b. Preeclampsia.
- ☐ c. Prolongación del parto.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica sistémica en el parto.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes anestésicos tiene una acción más duradera?

Seleccione una:

- ☐ a. Mepivacaína.
- ☐ b. Lidocaína.
- ☐ c. Procaína.
- ☐ d. Levobupivacaína.

Retroalimentación


Epígrafe Medicación analgésica espinal.

La respuesta correcta es: Levobupivacaína.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes anestésicos tiene un inicio de acción más rápido?

Seleccione una:

- ☐ a. Ropivacaína.
- ☐ b. Bupivacaína.
- ☐ c. Procaína.
- ☐ d. Levobupivacaína.

Retroalimentación

Epígrafe Medicación analgésica espinal.

La respuesta correcta es: Ropivacaína.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario

[Finalizar revisión](#)

MENÚ PRINCIPAL

- [- FUDEN](#)
- [- Campus Virtual](#)
- [- Campus Postgrados](#)
- [- Fuden inclusiva](#)
- [- Tienda](#)

ACTIVIDADES SATSE

- [Aula Virtual](#)
- [Evaluación de las Competencias](#)
- [Oposiciones](#)