

## TEST



12

Señale la respuesta **falsa** con relación a la infección por clamidia:

- ☐ a La clamidia es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en nuestro medio.
- ☐ b Afecta sobretodo a mujeres menores de 25 años.
- ☐ c Puede infectar la faringe, el recto, la uretra y el cérvix.
- ☒ d Es muy sintomática sobretodo en cérvix y en faringe.
- ☐ e El tratamiento de elección es la doxiciclina o la azitromicina.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



13

En cuanto a los condilomas acuminados, señale la respuesta **correcta**:

- ☐ a Los condilomas acuminados están causados por el VPH, tipos 6 y 11.
- ☐ b La infección por el VPH es la infección de transmisión sexual vírica más frecuente en nuestro medio.
- ☐ c El diagnóstico suele ser clínico, en ocasiones en lesiones dudosas, el dermatoscopio nos es de gran ayuda.
- ☐ d Los tratamientos suelen irritar y molestar a los pacientes.
- ☐ e Todas las anteriores son ciertas.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST

74

En la entrevista con el adolescente ¿que **no debemos** hacer?

- ☐ a Dejar la puerta de nuestra consulta abierta para lo que el adolescente necesite sobre su salud sexual.
- ☐ b Preguntar insistentemente sobre todos los detalles de su vida sexual, así el adolescente confiará en nosotros y se abrirá más y detectaremos todos sus problemas.
- ☐ c Mostrarles los posibles recursos de formación y atención a jóvenes, por si alguna vez los necesitan.
- ☐ d Utilizar la escucha activa, para que el adolescente se abra y nos pregunte sus dudas.
- ☐ e Darle la bienvenida a la consulta y transmitirle la confidencialidad de la consulta y lograr un ambiente afable.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar



## TEST



15

Señale la respuesta **correcta** sobre la infección por clamidia y su diagnóstico:

- ☐ a La clamidia infecta la vagina y la uretra, no afecta a ninguna otra mucosa.
- ☐ b La clamidia se puede detectar en una citología.
- ☒ c La clamidia se diagnostica por técnicas de ampliación de ácidos nucleicos, como una PCR específica.
- ☐ d La infección por clamidia es infrecuente en mujeres jóvenes.
- ☐ e La clamidia es muy infrecuente en nuestro medio.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



16

Con respecto a la sífilis señale la respuesta **incorrecta**:

- ☐ a La sífilis es más frecuente en hombres que tiene sexo con hombres..
- ☐ b La sífilis es una enfermedad de declaración obligatoria a salud pública.
- ☐ c El tratamiento de elección de la sífilis es penicilina G benzatina im.
- ☒ d En la sífilis secundaria apenas hay manifestaciones cutáneas.
- ☐ e Es importante localizar a los contactos sexuales ante un diagnóstico de sífilis secundaria.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



17

La vacunación frente a VPH exime a las mujeres del "cribado rutinario". Señale lo **correcto** con respecto a este enunciado:

- ☐ a Solo si se han vacunado entre los 9 y los 14 años.
- ☐ b Solo a mujeres que han recibido 3 dosis.
- ☐ c Solo a mujeres que han recibido una dosis de recuerdo tras la primovacunación.
- ☒ d El enunciado no es correcto.
- ☐ e Solo si se han vacunado antes de los 9 años.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST

18

Señale la respuesta **correcta** con respecto a la seguridad de las vacunas:

- ☐ a La seguridad se relaciona fundamentalmente con los efectos adversos producidos por las vacunas y está regulada por el Departamento de Vacunas y Productos Biológicos de la OMS.
- ☐ b La reactogenicidad vacunal depende del antígeno del preparado vacunal, y las reacciones adversas más comunes suelen aparecer entre 6 y 24 horas después de la vacunación, cediendo espontáneamente o con analgésicos, como el paracetamol en unas 48 horas.
- ☐ c Todos los profesionales que intervienen en la atención de la población vacunada deben enviar las notificaciones a los CRFV de su comunidad autónoma.
- ☐ d Los efectos adversos más frecuentes, de presentarse, suelen ser leves, como reacciones locales en el lugar de la aplicación, fiebre o malestar general de corta duración.
- ☒ e Todas son correctas.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar



## TEST



19

Señale la respuesta **correcta** con respecto a las contraindicaciones y precauciones de las vacunas:

- ☐ a Una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna constituye una contraindicación temporal a la vacunación por dicha vacuna.
- ☒ b La presencia de una encefalopatía de etiología desconocida, aparecida en los 7 días siguientes a la administración de una vacuna con componente frente a la tosferina, contraindica la administración de dosis posteriores de vacunas que contengan dicho componente.
- ☐ c El embarazo, la inmunosupresión o enfermedades descompensadas suponen contraindicaciones permanentes de la vacunación.
- ☐ d Está contraindicada, en el adolescente, la aplicación simultánea de vacunas.
- ☐ e Todas son correctas.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar



## TEST



20

Con respecto a la vacunación VPH señale la opción **correcta**:

- ☐ a No es conveniente la vacunación en aquellas adolescentes que hayan iniciado ya relaciones sexuales completas.
- ☐ b Es conveniente la vacunación en adolescentes con relaciones sexuales porque la vacuna es terapéutica frente a la posible infección por un genotipo vacunal.
- ☐ c La vacunación frente al VPH en adolescentes está desaconsejada durante la menstruación.
- ☒ d Se recomienda la vacunación VPH en adolescentes, independientemente del género, para reducir la carga de enfermedad relacionada con VPH y perseguir el objetivo final de eliminar la circulación y transmisión del virus VPH.
- ☐ e La vacuna nonavalente no está autorizada para su uso en varones, pero sí lo están las vacunas bivalente y la tetravalente.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



21

Sobre la vacunación antimeningocócica en el adolescente, señale la respuesta correcta:

- ☐ a Está indicada la vacunación frente al meningoco B de forma sistemática a los 12 años.
- ☐ b La vacunación antimeningocócica tetravalente, no está aconsejada para viajar a determinados destinos internacionales.
- ☒ c Actualmente la vacuna antimeningocócica tetravalente está incluida en el calendario vacunal infantil a los 12 años de edad.
- ☐ d Los padres pueden elegir la marca comercial de vacuna antimeningocócica que va a ser administrada a su hijo.
- ☐ e La vacuna antimeningocócica tetravalente cubre los serogrupos ABWY.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST

22

Señale la opción correcta:

- ☐ a No está indicada la aplicación simultánea de más de 5 vacunas.
- ☐ b Si el adolescente no está vacunado de varicela, y no tiene antecedentes de infección natural recomendaremos dos dosis de vacuna separadas de un intervalo mínimo de dos semanas.
- ☒ c Estar vacunado contra el VPH no exime, de tener relaciones sexuales con protección de barrera frente a ITS.
- ☐ d Si se ha recibido una vacuna antialérgica, habrá que esperar un mínimo de 10 días para recibir cualquier otro tipo de vacuna.
- ☐ e Si los padres se niegan a vacunar a un adolescente de 15 años, pero el adolescente quiere vacunarse, prevalece la opinión del menor.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar



## TEST



23

Señale la respuesta verdadera:

- ☐ a La edad media de la menarquia en España es aproximadamente 12,6 años.
- ☐ b No existe relación entre la edad de menarquia de hijas y madres.
- ☐ c Las menstruaciones son regulares desde el inicio de los ciclos.
- ☐ d Los ciclos son ovulatorios desde el principio.
- ☐ e Las alteraciones en la menstruación son infrecuentes en las adolescentes.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



24

Si una adolescente consulta por dolor intenso los días de la menstruación que le hacen incluso faltar al colegio ¿cuál debe ser su recomendación?:

- ☐ a Indagaría si tiene problemas escolares , porque la dismenorrea no justifica la ausencia.
- ☐ b Aconsejaría infusiones con propiedades sedantes y antiespasmódicas.
- ☐ c Prescribiría tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo y revisaría su eficacia pasados 2-3 meses.
- ☐ d Aconsejaría un tratamiento anticonceptivo de entrada.
- ☐ e Remitiría al ginecólogo sospechando que pueda padecer endometriosis.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST



25

En relación a la amenorrea, señale la respuesta **incorrecta**:

- ☐ a) Amenorrea primaria es la ausencia de menarquia a los 14 años sin desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o a los 16 años, si estos se han desarrollado adecuadamente.
- ☐ b) En una amenorrea secundaria lo primero a descartar es un embarazo.
- ☐ c) Las amenorreas son con frecuencia debidas a anovulación o por causa central.
- ☐ d) La amenorrea puede suponer una urgencia vital para la adolescente.
- ☒ e) Los baches amenorreicos son tan frecuentes como las alteraciones por exceso en las adolescentes.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar

## TEST

26

¿Cuál es la edad mínima fijada en el Código penal para mantener relaciones consentidas?

☐ a 13 años.

☐ b 14 años.

☐ c 15 años.

☒ d 16 años.

☐ e 17 años.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar



## TEST



27

Señale la respuesta **falsa** en relación a la anticoncepción de emergencia:

- ☐ a) Supone la última oportunidad para evitar un embarazo no deseado.
- ☐ b) Es un fármaco que no tiene contraindicaciones.
- ☐ c) Su eficacia disminuye cuanto más alejado del coito se administre.
- ☐ d) Se dispone de dos "píldoras": una de levonorgestrel y otra de acetato de ulipristal.
- ☐ e) Es una bomba hormonal y no se puede tomar dos veces en el mismo ciclo.

ENVIAR

Marque la opción correcta  
y pulse enviar