

Pregunta 1

119.- ¿Cuándo está contraindicada la codeína?

Seleccione una:

- a. A) En lactantes y menores de 2 años. Correcta ¡Bien, correcto!
- b. B) No en lactantes menores de 5 años.
- c. C) En cualquier niño.
- d. D) B y c son verdaderas.

Pregunta 2

201.- ¿Cuál es la dosis máxima de paracetamol?

Seleccione una:

- a. 20 mg/kg/día.
- b. 30 mg/kg/día.
- c. 40 mg/kg/día. Correcta ¡Bien, correcto !!
- d. 50 mg/kg/día.

Pregunta 3

203.- ¿Cuál es la vía de administración del naproxeno?

Seleccione una:

- a. Oral.
- b. Rectal.
- c. Tópica.
- d. Todas son correctas. Correcta ¡Bien, correcto !!

Pregunta 4

124.- Las vías de administración del diclofenaco son todas excepto:

Seleccione una:

- a. A) Vía oral.
- b. B) Vía rectal.
- c. C) Vía intravenosa. Correcta ¡Bien, correcto!
- d. D) Vía intramuscular.

Pregunta 5

121.- ¿Qué tiempo en el inicio de acción tiene el propofol?

Seleccione una:

- a. A) Menor a 10 sg. Correcta ¡Bien, correcto!
- b. B) Mayor a 10 sg.
- c. C) Menor a 1 minuto.
- d. D) Todas son falsas.

Pregunta 6

205.- La benzodiacepina de elección para la sedación a corto plazo en UCI es:

Seleccione una:

- a. Diazepam.
- b. Lorazepam.
- c. Lormetazepam.
- d. Midazolam. Correcta ¡Bien, correcto !!

Generalidades ante las principales urgencias y emergencias pediátricas para enfermería - Test 2

Pregunta 7

126.- La naloxona se utiliza como antagonista de:

Seleccione una:

- a. A) Tramadol.
- b. B) Cloruro mórfico.
- c. C) Fentanilo.
- d. D) B y c son correctas. CorrectajBien, correcto!

Pregunta 8

120.- ¿Qué dos vías de administración se pueden usar con el fentanilo en niños?

Seleccione una:

- a. A) Oral e intravenosa.
- b. B) Oral e intramuscular.
- c. C) Intramuscular e intravenosa.
- d. D) Intravenosa y sublingual. CorrectajBien, correcto!