

APROBADO CON UN 95%

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los COFs asociados al VPH son más frecuentes en países

Seleccione una:

- a. Del Sur de Europa como España
- b. Del Norte de Europa y Estados Unidos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- c. Las respuestas A y B son correctas
- d. De renta baja

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hay un porcentaje de pacientes de COF asociado al VPH que tienen mal pronóstico

Seleccione una:

- a. Falso, todos tienen buen pronóstico
- b. Verdadero, alrededor de un 27% y están muy bien caracterizados
- c. Verdadero, alrededor de un 40% y aún no están bien caracterizados
- d. Verdadero, alrededor de un 27% y aún no están bien caracterizados

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los COFs causados por el VPH

Seleccione una:

- a. Tienen mejor supervivencia global y libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- b. Tienen peor supervivencia global que los causados por el tabaco y el alcohol.

c. Tienen peor supervivencia libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol.

d. Tienen supervivencia libre de enfermedad similar a los causados por tabaco y alcohol.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 4

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La estrategia de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH se basa en

Seleccione una:

a. Actualmente aún no se dispone de ninguna estrategia efectiva de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH

b. La vacunación contra el VPH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c. El uso del preservativo

d. Las respuestas B y C son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 5

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Si tengo un cáncer de orofaringe causado por el VPH, implica que mi pareja también está infectada y tiene que realizar una visita extra al ginecólogo?

Seleccione una:

a. Sí, seguramente su pareja esté infectada y probablemente te haya sido infiel

b. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga, pero sí debe realizar inmediatamente una visita con el ginecólogo para descartar

c. Sí, seguramente su pareja esté infectada y debe pedir visita con el ginecólogo

d. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga ni que te haya sido infiel. No hay necesidad de realizar una visita extra al ginecólogo, pero es importante que realice las visitas regulares establecidas según el programa de cribado del cáncer de cuello uterino. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos casos nuevos de carcinoma de cabeza y cuello debidos al VPH se estima que cada año se producen en el mundo?

Seleccione una:

- a. Cerca de 5000
- b. Cerca de 500000
- c. Cerca de 20000
- d. Cerca de 50000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de la población general está infectada por VPH a nivel oral y qué porcentaje aclara/elimina la infección?

Seleccione una:

- a. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- b. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- c. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- d. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se puede alguien contagiar por VPH a nivel oral?

Seleccione una:

- a. Practicando sexo oral
- b. Besando en la mejilla o compartiendo bebidas con una persona infectada
- c. Practicando sexo oral y también es posible que el virus pueda llegar a la boca por otras vías como un beso profundo XXXXXXXXXXXXXXX
- d. Compartiendo jeringuillas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alguna de las lagunas de conocimiento en la historia natural de la infección oral por VPH y sus lesiones asociadas es

Seleccione una:

- a. Establecer la relación causal entre el VPH y algunos carcinomas de cabeza y cuello
- b. Tener una idea de la prevalencia de gente sana con una infección oral por VPH
- c. No existen lagunas de conocimiento
- d. Entender cómo y en qué países está aumentando la enfermedad de cabeza y cuello asociada al VPH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las afirmaciones es correcta

Seleccione una:

- a. No existe en la actualidad ningún biomarcador viral (VPH) para el que se recomiende su uso como prevención secundaria y/o terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- b. Se está utilizando la detección de VPH-ADN en enjuague-gárgaras orales para la

detección precoz del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

c. Se recomienda la detección de anticuerpos L1 o E6 frente al VPH16 para la detección precoz de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

d. Se recomienda la detección de anticuerpos E6 frente al VPH16 para la monitorización de pacientes diagnosticados de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral macroscópicamente reconocibles?

Seleccione una:

a. Las displasias orales epiteliales

b. Las leucoplaquias orales y los líquen planos orales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c. Las leucoplaquias orales

d. Los líquen planos orales

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cánceres de cabeza y cuello, los que están más fuertemente asociados al VPH son los de:

Seleccione una:

a. Las respuestas A y B son correctas

b. Cavidad oral

c. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 80%

d. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 30%

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evidencia de la eficacia y efectividad de la vacuna contra el VPH para prevenir la infección oral por VPH

Seleccione una:

- a. Es limitada, con solo un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3%
- b. Es limitada, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados XXXXXXXXXXXXX
- c. Es robusta, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que se debe tener en cuenta para plantear un programa de detección precoz de un cáncer

Seleccione una:

- a. La incidencia de la enfermedad.
- b. Disponer de biomarcadores con sensibilidad y especificidad adecuada
- c. Que el programa reduzca la mortalidad y/o morbilidad
- d. Todas las anteriores son correctas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los factores que se asocian a la infección oral por VPH son

Seleccione una:

- a. Tabaco
- b. Edad

c. Comportamiento sexual INCORRECTA

d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 16

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las lesiones pre-malignas del área de cabeza y cuello

Seleccione una:

a. Las de la orofaringe asociadas al VPH son totalmente desconocidas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. Se conocen las lesiones pre-neoplásicas de la orofaringe asociadas al VPH

c. Se desconocen las lesiones pre-malignas de la cavidad oral

d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 17

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿La PRR está causada por?

Seleccione una:

a. Por exposición a tabaco y alcohol

b. Por infección por VPH de tipo de alto riesgo oncogénico como el VPH16 o 18

c. Por infección por VPH, tabaco o alcohol

d. Por infección por VPHs 6 o 11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Respuesta correcta

Pregunta 18

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

No marcada Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son biomarcadores virales en estudio para la prevención secundaria y terciaria

del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Seleccione una:

- a. Detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales, y detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- b. Sólo detección de VPH-ADN en sangre
- c. Sólo detección de VPH-ADN en enjuagues-gárgaras orales
- d. Sólo detección de anticuerpos E6 anti-VPH16 en sangre

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La incidencia (casos nuevos diagnosticados por 100,000 habitantes-año) de COFs asociados al VPH

Seleccione una:

- a. Están en descenso
- b. Están en aumento en algunos países del mundo  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- c. Se mantienen estables
- d. Están en aumento en todo el mundo

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadas Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Si soy hombre o mujer que no se vacunó contra el VPH a la edad de vacunación sistemática, me puedo vacunar?

Seleccione una:

- a. Las mujeres sí pero los hombres no
- b. Las mujeres no pero los hombres sí
- c. Sí, la vacuna está indicada tanto en hombres como mujeres  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- d. No, la vacuna sólo está indicada en niñas de 9 a 14 años