



CampusVirtual



☎ Teléfono: +34 983 377 999 ✉ Correo electrónico: [dptosoporte@fecyl.com](mailto:dptosoporte@fecyl.com)

[Página Principal](#) ► [Mis cursos](#) ► [FC\\_Reanimación Neonatal\\_ OCTUBRE 2017](#) ► [Prueba de Evaluación](#) ► [Evaluación del Curso](#)

**Comenzado el** jueves, 30 de noviembre de 2017, 18:01

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 30 de noviembre de 2017, 18:09

**Tiempo empleado** 7 minutos 36 segundos

**Puntos** 30,0/40,0

**Calificación** 7,5 de 10,0 (75%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cómo se denomina la estructura que actúa como un acelerador de sangre que ingresa desde la vena umbilical, uniéndose con la vena cava inferior?

Seleccione una:

- a. Comunicación interparaventricular.
- b. Ductus arterioso.
- c. Foramen oval.
- d. Ductus venoso. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Respecto a la preparación previa a la reanimación neonatal, deberá considerarse.

Seleccione una:

- a. La presencia de un personal del equipo adiestrado en intubación neonatal.
- b. Establecer el rol en la secuencia de actuación, previamente.
- c. Todas son correctas. ✓
- d. Revisión de los recursos materiales y humanos disponibles.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- b. En los primeros 60 segundos.
- c. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio. ✓
- d. En los primeros 90 segundos.

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Respecto a la reposición de líquidos, señale la respuesta correcta en cuanto a la administración inicial de sueroterapia isotónica.

Seleccione una:

- a. 20 ml por Kg.
- b. 10 ml por Kg.
- c. 30 ml por Kg. ✗
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Es cierto que el éxito de una reanimación neonatal dependerá de la adecuada preparación previa, antes de que se produzca el parto?

Seleccione una:

- a. Puede que influya en muy poca medida.
- b. Sólo en aquellos casos de prematuros de alto riesgo.
- c. Las urgencias obstétricas no pueden preverse por lo que no implicará en la actuación de la reanimación su preparación previa.
- d. Si de forma indiscutible. ✓

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

Si en el periodo de transición del recién nacido, no existe una correcta fuente de calor, se pueden dar los siguientes sucesos:

Seleccione una:

- a. Aumentará su metabolismo, favoreciendo la acidosis metabólica y la hipoxemia.
- b. El consumo de oxígeno aumentaría.
- c. a) y b) son correctas. ✓
- d. Se produciría una vasodilatación pulmonar.

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de recién nacidos precisa de algún tipo de asistencia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- a. 10-20%.
- b. 1-2%.
- c. 0,5-2%. ✗
- d. 5-10%.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

En el equipo de succión y ventilación preparado para una posible reanimación neonatal, no encontraremos:

Seleccione una:

- a. Mascarillas faciales de diferentes tamaños.
- b. Tubos endotraqueales de diferente numeración.
- c. Cordonete. ✓
- d. Bolsas autoinflables.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Es aconsejable la utilización del pulsioxímetro para informar de la frecuencia cardiaca?

Seleccione una:

- a. No.
- b. Si.
- c. Si, pero sin descuidar la clínica del neonato y la valoración del patrón respiratorio. ✓
- d. Indiferente.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

Del número de muertes neonatales en el mundo a causa de asfixia al nacimiento, ¿qué porcentaje representan?

Seleccione una:

- a. 25%. ✓
- b. 11%.
- c. 40%.
- d. 52%.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Finnegan.
- b. Fagerström.
- c. Apgar.
- d. Ninguno de los anteriores. ✓

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

Señale cuál no se considera un objetivo de ILCOR:

Seleccione una:

- a. Difundir información sobre la formación y la educación en reanimación.
- b. No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación. ✓
- c. Proporcionar un mecanismo para recolectar, revisar y compartir datos científicos internacionales de reanimación.
- d. Producir declaraciones sobre cuestiones específicas relacionadas con la reanimación que se reflejan en el consenso internacional.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Es necesario secar al recién nacido al nacimiento?

Seleccione una:

- a. Si, para mantener la estabilidad térmica. ✓
- b. Sólo cuando el parto sea por cesárea.
- c. Está totalmente contraindicado.
- d. No es necesario.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Qué temperatura es idónea para mantener al neonato después del nacimiento en la fase de estabilización?

Seleccione una:

- a. 36,5°C-37,5°C. ✓
- b. 37°C.
- c. 37-37,5°C.
- d. 35,5-36,5°C.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Quiénes son los principales responsables en la toma de decisiones del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Los enfermeros.
- b. Ninguno de los anteriores.
- c. Los neonatólogos.
- d. Los padres. ✓

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- d. La respuesta a) y b) son correctas. ✓

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuáles son cambios fundamentales en el momento del nacimiento y la primera respiración espontánea?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas. ✓
- b. El líquido en los alvéolos es absorbido por el sistema linfático pulmonar y reemplazado por aire.
- c. Los vasos sanguíneos de los tejidos pulmonares se relajan, disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo.
- d. Las arterias umbilicales se contraen y luego las arterias y las venas umbilicales se cierran cuando se aplican las pinzas al cordón umbilical.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuáles son los principios éticos comunes a seguir?

Seleccione una:

- a. Beneficencia y no maleficencia.
- b. Autonomía, beneficencia y no maleficencia.
- c. Autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia.
- d. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ✓

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuántas horas suele tardar el periodo de transición si todo fluye de forma correcta?

Seleccione una:

- a. 24 horas.
- b. 6-8 horas. ✓
- c. 2 horas.
- d. 48 horas.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuál es la temperatura idónea para mantener a un recién nacido sin asfixia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 35°C.
- b. Entre 35-37,5°C.
- c. Entre 36,5-37,5°C. ✓
- d. Entre 37-38°C.

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

¿Cuánto tiempo recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para favorecer el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. No se recomienda retrasar el pinzamiento de cordón umbilical.
- b. Entre 30 y 60 segundos.
- c. Menos de 30 segundos. ✗
- d. 3 minutos.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuál de las siguientes adaptaciones hepáticas del recién nacido no es correcta?

Seleccione una:

- a. Déficit temporal de los factores de coagulación.
- b. El feto almacena glucógeno en las últimas semanas de gestación.
- c. Los almacenes de glucosa en el neonato se consumen en situación de estrés.
- d. Los almacenes de glucosa en el neonato difícilmente se terminan en una situación de asfixia perinatal e hipotermia. ✓

Pregunta **23**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

¿Qué saturación de oxígeno preductual es considerada como aceptable a los 2 minutos de nacimiento?

Seleccione una:

- a. 90%.
- b. 85%. ✗
- c. 60%.
- d. 70%.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- a. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- b. Los riesgos implicados en el tratamiento y sin el mismo.
- c. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- d. El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa. ✓

Pregunta **25**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Señale la afirmación falsa:

Seleccione una:

- a. La atención del recién nacido en la sala de partos se debe de centrar en evitar complicaciones. ✘
- b. Uno de los objetivos en la asistencia en la sala de partos es la disminución de los índices de morbilidad neonatal.
- c. La atención en la sala de partos de los hospitales necesita la presencia de un equipo entrenado en reanimación neonatal.
- d. En la atención en la sala de partos no es necesaria la presencia de personal multidisciplinar cualificado en reanimación neonatal.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Qué es un Neopuff®?

Seleccione una:

- a. Mascarilla faríngea.
- b. Adrenalina precargada inyectable.
- c. Cánula orofaríngea.
- d. Ventilador automático/manual. ✔

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿En qué consiste la metodología GRADE?

Seleccione una:

- a. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. ✔
- b. Grade of Evidence, Development and Evaluation.
- c. Grade Assessment, Development and Evaluation.
- d. Recommendations, Development and Evidence.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuál no es un representante de ILCOR?

Seleccione una:

- a. Consejo de Resucitación de Asia.
- b. Consejo Europeo de Resucitación.
- c. Consejo de Resucitación de Sudáfrica.
- d. Asociación Americana de cirugía cardiovascular. ✓

Pregunta **29**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

¿Cuál de las siguientes acciones no es propia de la transición a la vida extrauterina?

Seleccione una:

- a. Aumento de las resistencias vasculares pulmonares.
- b. Es necesario la presencia de respiración espontánea.
- c. Contracción de los vasos sanguíneos que promueven la perfusión pulmonar del recién nacido. ✗
- d. Ingreso de aire en los pulmones.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

Señale la opción falsa respecto a las recomendaciones ILCOR 2015 sobre el pinzamiento del cordón umbilical.

Seleccione una:

- a. El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos. ✓
- b. Al menos se suele recomendar una demora en el pinzamiento de un minuto.
- c. No existe evidencia para recomendar un tiempo determinado de pinzamiento.
- d. Está indicada la demora en el pinzamiento del cordón.

Pregunta **31**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Ante una situación de compromiso fetal severo, en la que se precisara infundir medicación, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- b. Indiferente, no depende del número de personas. ✗
- c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- d. 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:

- a. 10.
- b. 3.
- c. 8.
- d. 7. ✓

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuándo se produce la transición de la vida intrauterina a la extrauterina?

Seleccione una:

- a. Es un proceso que finaliza con la etapa neonatal, a los 28 días de vida.
- b. Al cortar el cordón umbilical.
- c. Al iniciar la respiración aérea. ✓
- d. A las 2 horas del alumbramiento.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

Entre las adaptaciones neurológicas, en el recién nacido se puede observar:

Seleccione una:

- a. Reflejos primarios que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla.
- b. Puede presentar temblores transitorios.
- c. Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, al igual que los ciclos del sueño.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta **35**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Cuando no se produce una transición normal, el suministro de oxígeno a los tejidos se ve:

Seleccione una:

- a. Disminuido.
- b. No se puede estimar.
- c. Inalterable. ✗
- d. Aumentado.

Pregunta **36**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

El principio ético de autonomía se refiere a:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. La RCP no debería hacerse en casos fútiles.
- c. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **37**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- a. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado). ✘
- b. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).
- c. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).
- d. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).

Pregunta **38**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Cuándo se considera el empleo de fármacos durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Si persiste una frecuencia cardiaca menor de 60 latidos por minuto. ✔
- b. Independientemente del tipo de ventilación.
- c. Preferiblemente a través de catéter arterial central.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **39**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre  
1,0

¿Qué proporción de recién nacidos a término se estima que necesitarán reanimación en la que se precise masaje cardiaco y empleo de fármacos?

Seleccione una:

- a. 2%.
- b. 0,1%. ✔
- c. 1%.
- d. 5%.

Pregunta **40**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre  
1,0

Entre las recomendaciones ILCOR 2015 se propusieron los siguientes puntos a discutir, identifique el aspecto incorrecto.

Seleccione una:

- a. Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.
- b. Utilización de oxígeno según compromiso hemodinámico neonatal. **X**
- c. Técnicas para mantener de forma óptima la temperatura en los prematuros de bajo peso en las unidades neonatales.
- d. Aspiración endotraqueal de secreciones en neonatos con síndrome de aspiración meconial.



Fundación de Enfermería en Castilla y León

Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León

## Info

Info Formacion on-line feCyL

WEB feCyL

WEB Consejo de Enfermería CyL

Secretaria Virtual feCyL

Soporte para el CapusVirtual

Soporte correo

## Contacto

C/Alcalleres, 5 - 47001-Valladolid

☎Teléfono : +34 983 377 999

✉Correo electrónico: dptosoporte@fecyl.com

Todos los derechos reservados © 2017 - Fundación Enfermería en Castilla y León