



☎ Teléfono: +34 983 377 999 ✉ Correo electrónico: dptosoporte@fecyl.com

Página Principal ► Mis cursos ► FC_Reanimación Neonatal_ OCTUBRE 2017 ►
Prueba de Evaluación ► Evaluación del Curso

Comenzado el jueves, 30 de noviembre de 2017, 17:43

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 30 de noviembre de 2017, 17:57

Tiempo empleado 13 minutos 19 segundos

Puntos 34,0/40,0

Calificación 8,5 de 10,0 (85%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿Cuánto dura la primera fase de reactividad de la adaptación a la vida extrauterina neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. 60 minutos.
- ☐ b. 30-60 minutos.
- ☐ c. 30-60 minutos.
- ☒ d. 30 minutos. ✓

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿Cuál es el cambio en el periodo de transición a la vida extrauterina más representativo?

Seleccione una:

- ☒ a. Establecimiento de la respiración espontánea. ✓
- ☐ b. Modificación de la función endocrina.
- ☐ c. Cambio de circulación placentaria.
- ☐ d. Termogénesis.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente un 6% de los recién nacidos con asfixia perinatal como causa principal condicionará la necesidad de reanimación cardiopulmonar.
- ☐ b. En el caso de los prematuros ese porcentaje se eleva hasta alcanzar el 80%.
- ☒ c. Las respuestas a) y c) son correctas. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuáles son las 3 comunicaciones madre-feto que desaparecen después del nacimiento del recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo son 2 comunicaciones: ductus arterioso y ductus venoso.
- ☐ b. Cuerpo alba, ductus arterioso, ductus venoso.
- ☐ c. Comunicación intercavital, ductus arterioso, ductus venoso.
- ☒ d. Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso. ✓

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

¿Qué semanas de edad gestacional debe de tenerse en cuenta a la hora de la reanimación neonatal para considerar un riesgo elevado de generar discapacidades en el neurodesarrollo de carácter moderado o grave?

Seleccione una:

- ☐ a. Más de las 40 semanas de edad gestacional.
- ☐ b. 22-25 semanas de edad gestacional.
- ☒ c. 37-38 semanas de edad gestacional. ✗
- ☐ d. 30-35 semanas de edad gestacional.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿Qué porcentaje es correcto?

Seleccione una:

- ☒ a. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos. ✓
- ☐ b. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 50 y 60 segundos.
- ☐ c. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.
- ☐ d. Aproximadamente el 65% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Los principios éticos en la reanimación infantil son diferentes a los del adulto. ✓
- ☐ b. Los principios éticos comunes incluyen: Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
- ☐ c. No hay ninguna afirmación incorrecta.
- ☐ d. Los deseos de los padres en la reanimación neonatal deberán ser tenidos en cuenta siempre que sea posible.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

Respecto al material necesario a disponer previo a la reanimación neonatal, la cuna térmica deberá estar:

Seleccione una:

- ☐ a. Es indiferente cuando encenderla.
- ☒ b. Precalentada. ✓
- ☐ c. Apagada.
- ☐ d. Encendida en el momento del parto.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cómo debe implicarse el profesional sanitario ante la toma de decisiones y las consideraciones éticas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. De forma proactiva.
- ☐ b. Ejercer una capacidad de evaluación y juicio que conduzcan a una atención adecuada.
- ☒ c. Las respuestas a) y b) son correctas. ✓
- ☐ d. No es competencia del profesional de enfermería asumir ese rol.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En recién nacidos prematuros para evitar gran cantidad de calor estaría indicado:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuir la temperatura exterior de la sala de partos.
- ☐ b. Bañar al neonato y secarlo.
- ☐ c. Reducir la humedad de la incubadora de transporte.
- ☒ d. Uso de una envoltura de plástico oclusiva. ✓

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuánto es el tiempo estándar de valoración antes de iniciar la secuencia de reanimación neonatal como consenso?

Seleccione una:

- ☐ a. 30 segundos.
- ☒ b. 60 segundos. ✓
- ☐ c. 40 segundos.
- ☐ d. 90 segundos.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿A qué horas después del parto ocurre el segundo periodo de reactividad neonatal?

Seleccione una:

- ☒ a. 4-6 horas. ✓
- ☐ b. 3 horas.
- ☐ c. 10 horas.
- ☐ d. 35 minutos.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Qué aspectos clínicos mejora el retraso de pinzamiento del cordón umbilical?

Seleccione una:

- ☐ a. Incrementa el gasto cardiaco.
- ☐ b. Incrementa la presión arterial sistémica.
- ☐ c. Retrasa el gasto cardiaco.
- ☒ d. Las respuestas a) y b) son correctas. ✓

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es la dosis inicial de adrenalina 1:10000?

Seleccione una:

- ☐ a. 50 microgramos/Kg.
- ☐ b. 20 microgramos/Kg.
- ☒ c. 10 microgramos/Kg. ✓
- ☐ d. 300 microgramos/Kg.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Ante un tipo de parto múltiple, ¿cuantas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- ☐ a. 1 médico, un enfermero y un técnico de cuidados en enfermería.
- ☐ b. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- ☐ c. Un equipo, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.
- ☒ d. Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto. ✓

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Que caracterizó la Conferencia de Consenso ILCOR 2015?

Seleccione una:

- ☐ a. Asistieron 20 países.
- ☐ b. Hubo una representación de más de 70 países.
- ☐ c. Asistieron 550 participantes.
- ☒ d. El 64% de los asistentes procedían de fuera de los Estados Unidos. ✓

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia respiratoria.
- ☒ b. Frecuencia cardíaca. ✓
- ☐ c. Polipnea.
- ☐ d. Tiraje subcostal.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

Señale cuál no se considera un objetivo de ILCOR:

Seleccione una:

- ☒ a. No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación. ✓
- ☐ b. Producir declaraciones sobre cuestiones específicas relacionadas con la reanimación que se reflejan en el consenso internacional.
- ☐ c. Proporcionar un mecanismo para recolectar, revisar y compartir datos científicos internacionales de reanimación.
- ☐ d. Difundir información sobre la formación y la educación en reanimación.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

El principio ético de beneficencia se corresponde con:

Seleccione una:

- ☒ a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio. ✓
- ☐ b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- ☐ c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

En el caso de aplicar succión de secreciones de la orofaringe, debería tener en cuenta.

Seleccione una:

- ☐ a. Limitar la succión a 5 segundos.
- ☐ b. No superar presiones del manómetro a 100 mmHg.
- ☒ c. La respuesta a) y b) son correctas. ✓
- ☐ d. Provocar una reacción vagal para favorecer la eliminación de secreciones.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. Aumentan las resistencias pulmonares.
- ☐ c. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.
- ☒ d. Aumentan las presiones vasculares sistémicas. ✓

Pregunta **22**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre
1,0

Señale la afirmación errónea:

Seleccione una:

- ☐ a. Los principios de la reanimación son simples.
- ☐ b. La presencia de factores de riesgo es independiente de la preparación del escenario de la reanimación.
- ☒ c. El primer paso es comprobar la permeabilidad de las vías aéreas. ✗
- ☐ d. Una situación de hipoxia mantenida en el tiempo puede provocar la muerte del feto o del recién nacido.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿En cuál de los siguientes supuestos no estaría indicado iniciar reanimación?

Seleccione una:

- ☐ a. Malformación mortal confirmada.
- ☐ b. Anencefalia.
- ☒ c. En todas las situaciones anteriores no estaría indicado iniciar reanimación. ✓
- ☐ d. Edad gestacional menor de 23 semanas y peso menor de 400 gramos.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es la relación en las compresiones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. 15:2.
- ☐ b. 90:10
- ☐ c. 100:1
- ☒ d. 3:1 ✓

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuándo dejaría de aplicar compresiones torácicas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Si la frecuencia cardiaca es superior a 50 latidos por minuto.
- ☒ b. Si la frecuencia cardiaca es superior a 60 latidos por minuto. ✓
- ☐ c. A los 60 segundos de iniciar masaje.
- ☐ d. 15 minutos después de haber iniciado masaje.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En la estabilización neonatal en condiciones normales, ¿Cuál es la temperatura a la que debería mantener al neonato?

Seleccione una:

- ☐ a. Temperatura inferior a 36°C.
- ☒ b. Temperatura superior a 36°C. ✓
- ☐ c. Temperatura superior a 37°C.
- ☐ d. Temperatura de hipotermia pasiva.

Pregunta **27**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☒ a. Menos de 120 latido por minuto. ✗
- ☐ b. Menos de 100 latido por minuto.
- ☐ c. Más de 120 latido por minuto.
- ☐ d. d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Entre los cambios de ILCOR 2015, respecto al soporte de transición, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El concepto “soporte de transición” es un concepto nuevo introducido en las últimas recomendaciones.
- ☐ b. En él se incluyen la atención sanitaria en la resucitación como en el apoyo a la transición.
- ☒ c. Las respuestas a) y b) son correctas. ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es el tipo de reanimación en el que se emplean el uso de fármacos?

Seleccione una:

- ☐ a. Tipo I.
- ☒ b. Tipo IV. ✓
- ☐ c. Tipo II.
- ☐ d. Tipo V.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es la frecuencia cardíaca en el neonato que indicaría el inicio de compresiones torácicas?

Seleccione una:

- ☐ a. Más de 100 latidos por minuto.
- ☒ b. Menos de 60 latidos por minuto. ✓
- ☐ c. Más de 60 latidos por minuto.
- ☐ d. Menos de 100 latidos por minuto.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuándo no estaría indicada la reanimación neonatal de los siguientes casos?

Seleccione una:

- ☒ a. Anomalía congénita asociada con una elevada morbilidad. ✓
- ☐ b. Hipertensión pulmonar.
- ☐ c. Distrés respiratorio tipo II.
- ☐ d. Peso al nacer bajo.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿En qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC, encontraríamos el resumen ejecutivo?

Seleccione una:

- ☐ a. 3.
- ☐ b. 7.
- ☐ c. 8.
- ☒ d. 1. ✓

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

El principio ético de justicia se corresponde con:

Seleccione una:

- ☐ a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- ☐ b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- ☒ c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál del siguiente material básico en una reanimación neonatal debería estar preparado y disponible para su posible uso?

Seleccione una:

- ☐ a. Equipo de succión.
- ☒ b. Todos son correctas. ✓
- ☐ c. Equipo de canalización.
- ☐ d. Cuna de calor u otro medio de fuente de calor.

Pregunta **35**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☒ a. Menos de 120 latido por minuto. ✗
- ☐ b. Menos de 100 latido por minuto.
- ☐ c. Más de 120 latido por minuto.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta **36**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. La calidad de vida que se prevé para el recién nacido con y sin tratamiento.
- ☐ b. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- ☒ c. Los años ajustados por calidad de vida o AVAC. ✓
- ☐ d. Las probabilidades de éxito en la terapia.


Pregunta **37**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre
1,0

Respecto a la evaluación óptima de la frecuencia cardiaca, ILCOR recomienda:

Seleccione una:

- ☐ a. Utilización de electrocardiograma.
- ☒ b. No es necesaria la monitorización de la frecuencia cardiaca. 
- ☐ c. Empleo de monitorización electroencefálica.
- ☐ d. Utilización de capnografía.


Pregunta **38**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿Qué significan las siglas ILCOR?

Seleccione una:

- ☐ a. Asociación Americana del Corazón.
- ☐ b. Ninguna es correcta.
- ☒ c. Comité Internacional de Unificación en Resucitación ILCOR. 
- ☐ d. Consejo Europeo de Resucitación.


Pregunta **39**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre
1,0

¿Qué porcentaje de neonatos que no se adapta con las medidas de secado y calor, precisará otro tipo de reanimación más avanzada?

Seleccione una:

- ☐ a. 2%.
- ☒ b. 5%. 
- ☐ c. 11%.
- ☐ d. 8%.

Pregunta **40**

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre
1,0

Ante una situación de compromiso fetal severo, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- ☒ a. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal. ✗
- ☐ b. Indiferente, no depende del número de personas.
- ☐ c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- ☐ d. 3 personas, una de ellas técnico de cuidados en enfermería.



Fundación de Enfermería en Castilla y León

Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León

Info

Info Formacion on-line feCyL

WEB feCyL

WEB Consejo de Enfermería CyL

Secretaria Virtual feCyL

Soporte para el CapusVirtual

Soporte correo

Contacto

C/Alcalleres, 5 - 47001-Valladolid

☎Teléfono : +34 983 377 999

✉Correo electrónico: dptosostporte@fecyl.com

Todos los derechos reservados © 2017 - Fundación Enfermería en Castilla y León