

Si en el periodo de transición del recién nacido, no existe una correcta fuente de calor, se pueden dar los siguientes sucesos:

Seleccione una:

- a. Aumentará su metabolismo, favoreciendo la acidosis metabólica y la hipoxemia.
- b. El consumo de oxígeno aumentaría.
- c. a) y b) son correctas.
- d. Se produciría una vasodilatación pulmonar.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el porcentaje estimado de muertes neonatales secundarias a la asfixia perinatal?

Seleccione una:

- a. 40%.
- b. 35%.
- c. 2%.
- d. 25%.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente un 6% de los recién nacidos con asfixia perinatal como causa principal condicionarán la necesidad de reanimación cardiopulmonar.
- b. En el caso de los prematuros ese porcentaje se eleva hasta alcanzar el 80%.
- c. Las respuestas a) y c) son correctas.



d. Ninguna es correcta.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la respiración entrecortada en el neonato?

Seleccione una:



a. Es una indicación de depresión neurológica y respiración grave.



b. Todas las anteriores son correctas.



c. También es conocida como boqueo.



d. Es una serie de inspiraciones profundas, individuales o sucesivas, que ocurren ante la presencia de hipoxia y/o isquemia.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Del número de muertes neonatales en el mundo a causa de asfixia al nacimiento, ¿qué porcentaje representan?

Seleccione una:



a. 11%.



b. 23%.



c. 52%.



d. 40%.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tiempo Golden minute (minuto de oro) es:

Seleccione una:

- a. Los primeros 100 segundos al nacimiento del recién nacido.
- b. Los primeros 60 segundos al nacimiento del recién nacido.
- c. Los primeros 30 segundos al nacimiento del recién nacido.
- d. Los primeros 200 segundos al nacimiento del recién nacido.

Pregunta 7

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes acciones no es propia de la transición a la vida extrauterina?

Seleccione una:

- a. Es necesario la presencia de respiración espontánea.
- b. Contracción de los vasos sanguíneos que promueven la perfusión pulmonar del recién nacido.
- c. Ingreso de aire en los pulmones.
- d. Aumento de las resistencias vasculares pulmonares.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación falsa:

Seleccione una:

- a. La atención del recién nacido en la sala de partos se debe de centrar en evitar complicaciones.
- b. Uno de los objetivos en la asistencia en la sala de partos es la disminución de los índices de morbilidad neonatal.
- c. La atención en la sala de partos de los hospitales necesita la presencia de un equipo entrenado en reanimación neonatal.
- d. En la atención en la sala de partos no es necesaria la presencia de personal multidisciplinar cualificado en reanimación neonatal.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las adaptaciones neurológicas, en el recién nacido se puede observar:

Seleccione una:

- a. Reflejos primarios que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla.
- b. Puede presentar temblores transitorios.
- c. Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, al igual que los ciclos del sueño.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 10

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la estructura que actúa como un acelerador de sangre que ingresa desde la vena umbilical, uniéndose con la vena cava inferior?

Seleccione una:

- a. Ductus venoso.
- b. Foramen oval.

- c. Comunicación interparaventricular.
- d. Ductus arterioso.

¿Cuántas horas suele tardar el periodo de transición si todo fluye de forma correcta?

Seleccione una:

- a. 6-8 horas.
- b. 2 horas.
- c. 24 horas.
- d. 48 horas.

Pregunta 2

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo se pueden asociar a la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Diabetes materna.
- b. Infección materna.
- c. Actividad fetal aumentada.
- d. Madre mayor de 35 años.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de recién nacidos precisa de algún tipo de asistencia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- a. 1-2%.

- b. 10-20%.
- c. 5-10%.
- d. 0,5-2%.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los métodos seguros y adecuados para proporcionar una estimulación táctil, se incluyen:

Seleccione una:

- a. Dar palmaditas en las plantas de los pies.
- b. Frotar suavemente la espalda.
- c. Frotar suavemente el tronco.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el momento de la evaluación inicial, debería hacerse 3 preguntas:

Seleccione una:

- a. El bebé nació a término.
- b. El bebé está respirando.
- c. El bebé está llorando.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nacimiento, ¿Qué tiempo suelen tardar los neonatos a término en alcanzar una saturación de oxígeno de 90% o superior?

Seleccione una:

- a. 30 minutos.
- b. 15 minutos.
- c. 20 minutos.
- d. 10 minutos.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son cambios fundamentales en el momento del nacimiento y la primera respiración espontánea?

Seleccione una:

- a. Los vasos sanguíneos de los tejidos pulmonares se relajan, disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo.
- b. El líquido en los alvéolos es absorbido por el sistema linfático pulmonar y reemplazado por aire.
- c. Las arterias umbilicales se contraen y luego las arterias y las venas umbilicales se cierran cuando se aplican las pinzas al cordón umbilical.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a los compartimientos de fluidos del pulmón fetal todo lo afirmado es cierto, excepto que:

Seleccione una:

- a. la secreción de cloro a través del epitelio pulmonar fetal genera un gradiente osmótico que causa que el líquido se mueva de la microcirculación al intersticio y de aquí al espacio aéreo potencial.
- b. el endotelio vascular permite el paso de moléculas proteicas grandes al intersticio.
- c. el epitelio pulmonar es una fuerte barrera para el paso de macromoléculas.
- d. los compartimientos de fluidos del pulmón fetal son: la microcirculación, el intersticio y el espacio aéreo potencial.

Pregunta 9

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores que podrían retardar la reabsorción del líquido pulmonar está:

Seleccione una:

- a. el nacimiento sin trabajo de parto.
- b. la disminución de la permeabilidad vascular.
- c. el aumento del número y funcionalidad de las células tipo II.
- d. la presión intravascular baja.

Pregunta 10

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el cambio en el periodo de transición a la vida extrauterina más representativo?

Seleccione una:

- a. Modificación de la función endocrina.
- b. Cambio de circulación placentaria.
- c. Establecimiento de la respiración espontánea.
- d. Termogénesis.

Cuando no se produce una transición normal, el suministro de oxígeno a los tejidos se ve:

Seleccione una:

- a. No se puede estimar.
- b. Disminuido.
- c. Inalterable.
- d. Aumentado.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la forma de confirmar la cianosis percibida en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Mediante una bioquímica.
- b. ECG.
- c. Mediante un oxímetro.
- d. Mediante la tensión arterial.

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las 3 comunicaciones madre-feto que desaparecen después del nacimiento del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Comunicación intercavital, ductus arterioso, ductus venoso.
- b. Sólo son 2 comunicaciones: ductus arterioso y ductus venoso.
- c. Cuerpo alba, ductus arterioso, ductus venoso.
- d. Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación errónea:

Seleccione una:

- a. El primer paso es comprobar la permeabilidad de las vías aéreas.
- b. Una situación de hipoxia mantenida en el tiempo puede provocar la muerte del feto o del recién nacido.
- c. La presencia de factores de riesgo es independiente de la preparación del escenario de la reanimación.
- d. Los principios de la reanimación son simples.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto dura la primera fase de reactividad de la adaptación a la vida extrauterina neonatal?

Seleccione una:

- a. 60 minutos.
- b. 90-120 minutos.
- c. 30 minutos.
- d. 30-60 minutos.

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la vida fetal los pulmones hacen todo lo siguiente, excepto:

Seleccione una:

- a. Realizar funciones respiratorias.
- b. Sintetizar surfactante.
- c. Secretar líquido a los potenciales espacios aéreos.
- d. Simular movimientos respiratorios.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué horas después del parto ocurre el segundo periodo de reactividad neonatal?

Seleccione una:

- a. 10 horas.
- b. 4-6 horas.
- c. 3 horas.
- d. 35 minutos.

Pregunta 8

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presión pulmonar in útero se encuentra aumentada por todas las siguientes causas, excepto por:

Seleccione una:

- a. bajo flujo pulmonar.
- b. alto flujo pulmonar.
- c. aumento de la cantidad de líquido por peso en los pulmones durante la gestación.
- d. marcado engrosamiento de la capa arterial muscular.

Pregunta 9

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como norma general, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. El masaje cardiaco neonatal asegura una mayor supervivencia.
- b. No debe iniciar masaje cardiaco hasta asegurar la vía aérea.
- c. El masaje cardíaco siempre estará acompañado del uso de adrenalina.
- d. Deberá iniciar masaje cardiaco neonatal lo antes posible.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes problemas pueden aparecer durante el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Ventilación inadecuada.
- b. Hipotensión sistémica.
- c. Baja frecuencia cardíaca.
- d. Todas las anteriores.

Cuál de las siguientes adaptaciones hepáticas del recién nacido no es correcta?

Seleccione una:

- a. El feto almacena glucógeno en las últimas semanas de gestación.
- b. Los almacenes de glucosa en el neonato se consumen en situación de estrés.
- c. Los almacenes de glucosa en el neonato difícilmente se terminan en una situación de asfixia perinatal e hipotermia.
- d. Déficit temporal de los factores de coagulación.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando no se produce una transición normal, el suministro de oxígeno a los tejidos se ve:

Seleccione una:

- a. No se puede estimar.
- b. Aumentado.
- c. Disminuido.
- d. Inalterable.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la forma de confirmar la cianosis percibida en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Mediante un oxímetro.
- b. Mediante una bioquímica.
- c. Mediante la tensión arterial.
- d. ECG.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los métodos seguros y adecuados para proporcionar una estimulación táctil, se incluyen:

Seleccione una:

- a. Dar palmaditas en las plantas de los pies.
- b. Frotar suavemente la espalda.
- c. Frotar suavemente el tronco.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes problemas pueden aparecer durante el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Ventilación inadecuada.
- b. Hipotensión sistémica.
- c. Baja frecuencia cardíaca.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente un 6% de los recién nacidos con asfixia perinatal como causa principal condicionarán la necesidad de reanimación cardiopulmonar.
- b. En el caso de los prematuros ese porcentaje se eleva hasta alcanzar el 80%.
- c. Las respuestas a) y c) son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las adaptaciones neurológicas, en el recién nacido se puede observar:

Seleccione una:

- a. Reflejos primarios que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla.
- b. Puede presentar temblores transitorios.
- c. Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, al igual que los ciclos del sueño.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el porcentaje estimado de muertes neonatales secundarias a la asfixia perinatal?

Seleccione una:

- a. 35%.
- b. 25%.
- c. 2%.



d. 40%.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presión pulmonar in útero se encuentra aumentada por todas las siguientes causas, excepto por:

Seleccione una:



a. bajo flujo pulmonar.



b. aumento de la cantidad de líquido por peso en los pulmones durante la gestación.



c. marcado engrosamiento de la capa arterial muscular.



d. alto flujo pulmonar.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como norma general, señale la correcta:

Seleccione una:



a. El masaje cardiaco neonatal asegura una mayor supervivencia.



b. No debe iniciar masaje cardiaco hasta asegurar la vía aérea.



c. Deberá iniciar masaje cardiaco neonatal lo antes posible.



d. El masaje cardíaco siempre estará acompañado del uso de adrenalina.

¿Cuál no es un representante de ILCOR?

Seleccione una:



a. Asociación Americana de cirugía cardiovascular.



b. Consejo Europeo de Resucitación.



c. Consejo de Resucitación de Asia.



d. Consejo de Resucitación de Sudáfrica.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la temperatura idónea para mantener a un recién nacido sin asfixia en la etapa perinatal?

Seleccione una:



a. Entre 35-37,5°C.



b. Entre 36,5-37,5°C.



c. Menos de 35°C.



d. Entre 37-38°C.

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los cambios de ILCOR 2015, respecto al soporte de transición, señale la correcta:

Seleccione una:



a. El concepto "soporte de transición" es un concepto nuevo introducido en las últimas recomendaciones.



b. En él se incluyen la atención sanitaria en la resucitación como en el apoyo a la transición.



c. Las respuestas a) y b) son correctas.



d. Ninguna es correcta.

Pregunta 4

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo empezaría el soporte ventilatorio de un recién nacido a término?

Seleccione una:

- a. Oxígeno en concentraciones superiores a 30%.
- b. Con aire ambiente.
- c. Con oxígeno a concentraciones medias (30-40%)
- d. Con oxígeno a bajas concentraciones (25-30%).

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción falsa respecto a las recomendaciones ILCOR 2015 sobre el pinzamiento del cordón umbilical.

Seleccione una:

- a. No existe evidencia para recomendar un tiempo determinado de pinzamiento.
- b. Está indicada la demora en el pinzamiento del cordón.
- c. Al menos se suele recomendar una demora en el pinzamiento de un minuto.
- d. El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:

- a. 10.
- b. 8.
- c. 7.
- d. 3.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- a. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).
- b. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).
- c. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).
- d. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado).

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la metodología GRADE?

Seleccione una:

- a. Grade of Evidence, Development and Evaluation.
- b. Recommendations, Development and Evidence.
- c. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
- d. Grade Assessment, Development and Evaluation.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la evaluación óptima de la frecuencia cardiaca, ILCOR recomienda:

Seleccione una:

- a. No es necesaria la monitorización de la frecuencia cardiaca.
- b. Utilización de capnografía.
- c. Empleo de monitorización electroencefálica.
- d. Utilización de electrocardiograma.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que caracterizó la Conferencia de Consenso ILCOR 2015?

Seleccione una:

- a. Asistieron 20 países.
- b. El 64% de los asistentes procedían de fuera de los Estados Unidos.
- c. Hubo una representación de más de 70 países.
- d. Asistieron 550 participantes.

Entre los cambios de ILCOR 2015, respecto al soporte de transición, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. El concepto "soporte de transición" es un concepto nuevo introducido en las últimas recomendaciones.
- b. En él se incluyen la atención sanitaria en la resucitación como en el apoyo a la transición.
- c. Las respuestas a) y b) son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:

- a. 10.
- b. 3.
- c. 8.
- d. 7.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- a. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).
- b. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).
- c. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado).
- d. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es un representante de ILCOR?

Seleccione una:

- a. Consejo Europeo de Resucitación.
- b. Asociación Americana de cirugía cardiovascular.
- c. Consejo de Resucitación de Sudáfrica.
- d. Consejo de Resucitación de Asia.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la metodología GRADE?

Seleccione una:

- a. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
- b. Grade of Evidence, Development and Evaluation.
- c. Grade Assessment, Development and Evaluation.
- d. Recommendations, Development and Evidence.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción falsa respecto a las recomendaciones ILCOR 2015 sobre el pinzamiento del cordón umbilical.

Seleccione una:

- a. Está indicada la demora en el pinzamiento del cordón.
- b. No existe evidencia para recomendar un tiempo determinado de pinzamiento.
- c. El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos.
- d. Al menos se suele recomendar una demora en el pinzamiento de un minuto.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no se considera un objetivo de ILCOR:

Seleccione una:

- a. No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación.
- b. Difundir información sobre la formación y la educación en reanimación.
- c. Proporcionar un mecanismo para recolectar, revisar y compartir datos científicos internacionales de reanimación.
- d.

Producir declaraciones sobre cuestiones específicas relacionadas con la reanimación que se reflejan en el consenso internacional.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significan las siglas ILCOR?

Seleccione una:

- a. Asociación Americana del Corazón.
- b. Consejo Europeo de Resucitación.
- c. Comité Internacional de Unificación en Resucitación ILCOR.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC, encontraríamos el resumen ejecutivo?

Seleccione una:

- a. 3.
- b. 8.
- c. 7.
- d. 1.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo empezaría el soporte ventilatorio de un recién nacido a término?

Seleccione una:

- a. Con oxígeno a concentraciones medias (30-40%).
- b. Con aire ambiente.
- c. Oxígeno en concentraciones superiores a 30%.
- d. Con oxígeno a bajas concentraciones (25-30%).

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la temperatura idónea para mantener a un recién nacido sin asfixia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- a. Entre 37-38°C.
- b. Entre 36,5-37,5°C.
- c. Menos de 35°C.
- d. Entre 35-37,5°C.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción falsa respecto a las recomendaciones ILCOR 2015 sobre el pinzamiento del cordón umbilical.

Seleccione una:

- a. El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos.
- b. Está indicada la demora en el pinzamiento del cordón.
- c. Al menos se suele recomendar una demora en el pinzamiento de un minuto.
- d. No existe evidencia para recomendar un tiempo determinado de pinzamiento.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significan las siglas ILCOR?

Seleccione una:

- a. Asociación Americana del Corazón.
- b. Comité Internacional de Unificación en Resucitación ILCOR.
- c. Consejo Europeo de Resucitación.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no se considera un objetivo de ILCOR:

Seleccione una:

- a. Difundir información sobre la formación y la educación en reanimación.
- b. No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación.
- c.

Producir declaraciones sobre cuestiones específicas relacionadas con la reanimación que se reflejan en el consenso internacional.

- d. Proporcionar un mecanismo para recolectar, revisar y compartir datos científicos internacionales de reanimación.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la evaluación óptima de la frecuencia cardiaca, ILCOR recomienda:

Seleccione una:

- a. Utilización de electrocardiograma.
- b. Empleo de monitorización electroencefálica.
- c. Utilización de capnografía.
- d. No es necesaria la monitorización de la frecuencia cardiaca.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC, encontraríamos el resumen ejecutivo?

Seleccione una:

- a. 3.
- b. 1.
- c. 8.



d. 7.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:



a. 3.



b. 8.



c. 10.



d. 7.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que caracterizó la Conferencia de Consenso ILCOR 2015?

Seleccione una:



a. Asistieron 20 países.



b. El 64% de los asistentes procedían de fuera de los Estados Unidos.



c. Hubo una representación de más de 70 países.



d. Asistieron 550 participantes.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la metodología GRADE?

Seleccione una:

- a. Recommendations, Development and Evidence.
- b. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
- c. Grade Assessment, Development and Evaluation.
- d. Grade of Evidence, Development and Evaluation.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- a. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado).
- b. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).
- c. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).
- d. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debe implicarse el profesional sanitario ante la toma de decisiones y las consideraciones éticas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. De forma proactiva.
- b. Ejercer una capacidad de evaluación y juicio que conduzcan a una atención adecuada.



c. Las respuestas a) y b) son correctas.



d. No es competencia del profesional de enfermería asumir ese rol.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo no estaría indicada la reanimación neonatal de los siguientes casos?

Seleccione una:



a. Peso al nacer bajo.



b. Hipertensión pulmonar.



c. Anomalía congénita asociada con una elevada morbilidad.



d. Distrés respiratorio tipo II.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de autonomía se refiere a:

Seleccione una:



a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.



b. La RCP no debería hacerse en casos fútiles.



c. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar

decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.



d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es preciso conversar con los padres antes de un nacimiento de muy alto riesgo?

Seleccione una:

- a. Sí, siempre deben estar informados.
- b. Es necesario conversar de los posibles problemas potenciales.
- c. Se pueden tener reuniones de seguimiento si la situación clínica cambiase.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de beneficencia se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no hubiera tiempo suficiente para consultar recursos adicionales, y el médico responsable concluyera que la decisión de los padres no es lo mejor para el niño, suele ser adecuado:

Seleccione una:

- a. Reanimar sólo en los recién nacidos a término.
- b. Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.
- c. No reanimar.
- d. No reanimar bajo ningún concepto.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Quiénes son los principales responsables en la toma de decisiones del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Los padres.
- b. Los neonatólogos.
- c. Ninguno de los anteriores.
- d. Los enfermeros.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de justicia se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.



c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.



d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué semanas de edad gestacional debe de tenerse en cuenta a la hora de la reanimación neonatal para considerar un riesgo elevado de generar discapacidades en el neurodesarrollo de carácter moderado o grave?

Seleccione una:



a. 37-38 semanas de edad gestacional.



b. 30-35 semanas de edad gestacional.



c. Más de las 40 semanas de edad gestacional.



d. 22-25 semanas de edad gestacional.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el proceso de muerte o perimorten del recién nacido, deberá evitar frases como:

Seleccione una:



a. Fue lo mejor.



b. Tenía que ser así.



c. Puede tener más hijos.



d. Todas las frases anteriores deberá evitarlas.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- a. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- b. Los años ajustados por calidad de vida o AVAC.
- c. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- d. La calidad de vida que se prevé para el recién nacido con y sin tratamiento.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de los siguientes supuestos no estaría indicado iniciar reanimación?

Seleccione una:

- a. Anencefalia.
- b. Malformación mortal confirmada.
- c. En todas las situaciones anteriores no estaría indicado iniciar reanimación.
- d. Edad gestacional menor de 23 semanas y peso menor de 400 gramos.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debe implicarse el profesional sanitario ante la toma de decisiones y las consideraciones éticas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. De forma proactiva.
- b. Ejercer una capacidad de evaluación y juicio que conduzcan a una atención adecuada.
- c. Las respuestas a) y b) son correctas.
- d. No es competencia del profesional de enfermería asumir ese rol.

Pregunta 4

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no hubiera tiempo suficiente para consultar recursos adicionales, y el médico responsable concluyera que la decisión de los padres no es lo mejor para el niño, suele ser adecuado:

Seleccione una:

- a. No reanimar.
- b. No reanimar bajo ningún concepto.
- c. Reanimar sólo en los recién nacidos a término.
- d. Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. Los principios éticos comunes incluyen: Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
- b. No hay ninguna afirmación incorrecta.
- c. Los deseos de los padres en la reanimación neonatal deberán ser tenidos en cuenta siempre que sea posible.



d. Los principios éticos en la reanimación infantil son diferentes a los del adulto.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:



a. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.



b. El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.



c. Las probabilidades de éxito en la terapia.



d. Los riesgos implicados en el tratamiento y sin el mismo.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los principios éticos comunes a seguir?

Seleccione una:



a. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.



b. Autonomía, beneficencia y no maleficencia.



c. Autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia.



d. Beneficencia y no maleficencia.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de autonomía se refiere a:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. La RCP no debería hacerse en casos fútiles.
- c. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es preciso conversar con los padres antes de un nacimiento de muy alto riesgo?

Seleccione una:

- a. Sí, siempre deben estar informados.
- b. Es necesario conversar de los posibles problemas potenciales.
- c. Se pueden tener reuniones de seguimiento si la situación clínica cambiase.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una situación terminal del recién nacido, usted deberá:

Seleccione una:

- a. Asegure a los padres que la atención se concentrará en evitar o aliviar el dolor y el sufrimiento.
- b. Que la probabilidad de muerte es alta.
- c. Prestando atención a factores que respeten su sensibilidad cultural.
- d. a), b) y c) son correctas.

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para determinar la necesidad de reanimación ante cada recién nacido se debe contestar tres interrogantes fundamentales:

Seleccione una:

- a. ¿Tiene buen tono muscular?
- b. ¿Es un embarazo de término?
- c. ¿El bebé respira o llora?
- d. Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones ILCOR 2015 se propusieron los siguientes puntos a discutir, identifique el aspecto incorrecto.

Seleccione una:

- a. Utilización de oxígeno según compromiso hemodinámico neonatal.
- b. Técnicas para mantener de forma óptima la temperatura en los prematuros de bajo peso en las unidades neonatales.
- c. Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.



d. Aspiración endotraqueal de secreciones en neonatos con síndrome de aspiración meconial.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario el uso de guantes por el personal sanitario en la atención inmediata post-parto?

Seleccione una:



a. Sí, aunque si fuese algo urgente se podría prescindir de ellos.



b. Sí, en todos los casos posibles.



c. No es necesario.



d. Sólo cuando exista riesgo de transmisión infectocontagiosa.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario secar al recién nacido al nacimiento?

Seleccione una:



a. No es necesario.



b. Está totalmente contraindicado.



c. Si, para mantener la estabilidad térmica.



d. Sólo cuando el parto sea por cesárea.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- d. La respuesta a) y b) son correctas.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el equipo de succión y ventilación preparado para una posible reanimación neonatal, no encontraremos:

Seleccione una:

- a. Tubos endotraqueales de diferente numeración.
- b. Bolsas autoinflables.
- c. Cordonete.
- d. Mascarillas faciales de diferentes tamaños.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un Neopuff®?

Seleccione una:

- a. Cánula orofaríngea.
- b. Mascarilla faríngea.
- c. Adrenalina precargada inyectable.
- d. Ventilador automático/manual.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es cierto que el éxito de una reanimación neonatal dependerá de la adecuada preparación previa, antes de que se produzca el parto?

Seleccione una:

- a. Puede que influya en muy poca medida.
- b. Si de forma indiscutible.
- c. Sólo en aquellos casos de prematuros de alto riesgo.
- d. Las urgencias obstétricas no pueden preverse por lo que no implicará en la actuación de la reanimación su preparación previa.

Pregunta 9

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- a. Aumentan las resistencias pulmonares.
- b. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.
- c. Todas son correctas.
- d. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tipo de reanimación en el que se emplean el uso de fármacos?

Seleccione una:

- a. Tipo IV.
- b. Tipo V.
- c. Tipo II.
- d. Tipo I.

Dentro de las maniobras de estimulación, aquellas que se llevan a cabo de forma incorrecta pueden ocasionar:

Seleccione una:

- a. Contusiones.
- b. Hipertermia.
- c. Hipotermia.
- d. Pueden aparecer cualquiera de las anteriores.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un tipo de parto múltiple, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 1 médico, un enfermero y un técnico de cuidados en enfermería.
- b. Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.
- c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- d. Un equipo, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de neonatos que no se adapta con las medidas de secado y calor, precisará otro tipo de reanimación más avanzada?

Seleccione una:

- a. 11%.
- b. 5%.
- c. 2%.
- d. 8%.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de recién nacidos a término se estima que necesitarán reanimación en la que se precise masaje cardíaco y empleo de fármacos?

Seleccione una:

- a. 2%.
- b. 1%.
- c. 5%.
- d. 0,1%.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la clasificación para evaluar y determinar el riesgo en el embarazo, ¿cuáles de los siguientes factores a evaluar serían marcados de color rojo?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Disminución o ausencia de movimientos fetales.
- c. Enfermedad sistémica grave.
- d. Hemorragia vaginal.

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, en la que se precisara infundir medicación, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.
- b. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- c. Indiferente, no depende del número de personas.
- d. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la preparación previa a la reanimación neonatal, deberá considerarse.

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Establecer el rol en la secuencia de actuación, previamente.
- c. La presencia de un personal del equipo adiestrado en intubación neonatal.



d. Revisión de los recursos materiales y humanos disponibles.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje es correcto?

Seleccione una:



a. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.



b. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.



c. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 50 y 60 segundos.



d. Aproximadamente el 65% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Del siguiente material necesario antes del parto, ¿Cuál cree necesario tener disponible?

Seleccione una:



a. Cordones o pinza de cordón.



b. Toalla, trapo limpio y seco.



c. Material de intubación por si fuera necesario.



d. Todas las anteriores.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál del siguiente material básico en una reanimación neonatal debería estar preparado y disponible para su posible uso?

Seleccione una:

- a. Cuna de calor u otro medio de fuente de calor.
- b. Equipo de succión.
- c. Todos son correctas.
- d. Equipo de canalización.

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- b. En los primeros 60 segundos.
- c. En los primeros 90 segundos.
- d. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- d. La respuesta a) y b) son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al material necesario a disponer previo a la reanimación neonatal, la cuna térmica deberá estar:

Seleccione una:

- a. Precalentada.
- b. Encendida en el momento del parto.
- c. Es indiferente cuando encenderla.
- d. Apagada.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, ¿cuantas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 3 personas, una de ellas técnico de cuidados en enfermería.
- b. Indiferente, no depende del número de personas.
- c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- d. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de neonatos que no se adapta con las medidas de secado y calor, precisará otro tipo de reanimación más avanzada?

Seleccione una:

- a. 2%.
- b. 8%.
- c. 5%.
- d. 11%.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se produce la transición de la vida intrauterina a la extrauterina?

Seleccione una:

- a. Al iniciar la respiración aérea.
- b. Al cortar el cordón umbilical.
- c. Es un proceso que finaliza con la etapa neonatal, a los 28 días de vida.
- d. A las 2 horas del alumbramiento.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un tipo de parto múltiple, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. Un equipo, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.
- b. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- c. Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.



d. 1 médico, un enfermero y un técnico de cuidados en enfermería.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un Neopuff®?

Seleccione una:



a. Cánula orofaríngea.



b. Adrenalina precargada inyectable.



c. Ventilador automático/manual.



d. Mascarilla faríngea.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario secar al recién nacido al nacimiento?

Seleccione una:



a. No es necesario.



b. Sí, para mantener la estabilidad térmica.



c. Sólo cuando el parto sea por cesárea.



d. Está totalmente contraindicado.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje es correcto?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 65% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.
- b. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 50 y 60 segundos.
- c. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.
- d. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Aumentan las resistencias pulmonares.
- c. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.
- d. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es cierto que el éxito de una reanimación neonatal dependerá de la adecuada preparación previa, antes de que se produzca el parto?

Seleccione una:

- a. Puede que influya en muy poca medida.
- b. Sólo en aquellos casos de prematuros de alto riesgo.
- c. Las urgencias obstétricas no pueden preverse por lo que no implicará en la actuación de la reanimación su preparación previa.
- d. Sí de forma indiscutible.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones ILCOR 2015 se propusieron los siguientes puntos a discutir, identifique el aspecto incorrecto.

Seleccione una:

- a. Aspiración endotraqueal de secreciones en neonatos con síndrome de aspiración meconial.
- b. Técnicas para mantener de forma óptima la temperatura en los prematuros de bajo peso en las unidades neonatales.
- c. Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.
- d. Utilización de oxígeno según compromiso hemodinámico neonatal.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la preparación previa a la reanimación neonatal, deberá considerarse.

Seleccione una:

- a. Establecer el rol en la secuencia de actuación, previamente.
- b. Todas son correctas.
- c. La presencia de un personal del equipo adiestrado en intubación neonatal.
- d. Revisión de los recursos materiales y humanos disponibles.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tipo de reanimación en el que se emplean el uso de fármacos?

Seleccione una:

- a. Tipo IV.
- b. Tipo I.
- c. Tipo II.
- d. Tipo V.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál del siguiente material básico en una reanimación neonatal debería estar preparado y disponible para su posible uso?

Seleccione una:

- a. Todos son correctas.
- b. Equipo de canalización.
- c. Equipo de succión.
- d. Cuna de calor u otro medio de fuente de calor.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- b. En los primeros 90 segundos.
- c. En los primeros 60 segundos.
- d. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, en la que se precisara infundir medicación, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- b. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- c. 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.
- d. Indiferente, no depende del número de personas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el equipo de succión y ventilación preparado para una posible reanimación neonatal, no encontraremos:

Seleccione una:

- a. Mascarillas faciales de diferentes tamaños.
- b. Cordonete.
- c. Bolsas autoinflables.
- d. Tubos endotraqueales de diferente numeración.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la clasificación para evaluar y determinar el riesgo en el embarazo, ¿cuáles de los siguientes factores a evaluar serían marcados de color rojo?

Seleccione una:

- a. Hemorragia vaginal.
- b. Disminución o ausencia de movimientos fetales.
- c. Enfermedad sistémica grave.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la preparación previa a la reanimación neonatal, deberá considerarse.

Seleccione una:

- a. Revisión de los recursos materiales y humanos disponibles.
- b. Establecer el rol en la secuencia de actuación, previamente.
- c. La presencia de un personal del equipo adiestrado en intubación neonatal.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Aumentan las resistencias pulmonares.
- c. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.
- d. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- b. En los primeros 90 segundos.
- c. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardiaco y respiratorio.
- d. En los primeros 60 segundos.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para determinar la necesidad de reanimación ante cada recién nacido se debe contestar tres interrogantes fundamentales:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. ¿El bebé respira o llora?
- c. ¿Es un embarazo de término?

d. ¿Tiene buen tono muscular?

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- d. La respuesta a) y b) son correctas.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, en la que se precisara infundir medicación, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- b. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- c. 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.
- d. Indiferente, no depende del número de personas.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el equipo de succión y ventilación preparado para una posible reanimación neonatal, no encontraremos:

Seleccione una:

- a. Bolsas autoinflables.
- b. Cordonete.
- c. Tubos endotraqueales de diferente numeración.
- d. Mascarillas faciales de diferentes tamaños.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un tipo de parto múltiple, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 1 médico, un enfermero y un técnico de cuidados en enfermería.
- b. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- c. Un equipo, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.
- d. Un equipo adiestrado por cada neonato, dependiendo el número de personas por equipo del riesgo del parto.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al material necesario a disponer previo a la reanimación neonatal, la cuna térmica deberá estar:

Seleccione una:

- a. Es indiferente cuando encenderla.
- b. Apagada.
- c. Precalentada.
- d. Encendida en el momento del parto.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las maniobras de estimulación, aquellas que se llevan a cabo de forma incorrecta pueden ocasionar:

Seleccione una:

- a. Hipertermia.
- b. Pueden aparecer cualquiera de las anteriores.
- c. Hipotermia.
- d. Contusiones.

¿Qué saturación de oxígeno preductual es considerada como aceptable a los 2 minutos de nacimiento?

Seleccione una:

- a. 70%.
- b. 60%.
- c. 85%.
- d. 90%.

Pregunta 2

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la relación en las compresiones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. 90:10
- b. 3:1
- c. 15:2.
- d. 100:1

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En recién nacidos prematuros para evitar gran cantidad de calor estaría indicado:

Seleccione una:

- a. Disminuir la temperatura exterior de la sala de partos.
- b. Bañar al neonato y secarlo.
- c. Uso de una envoltura de plástico oclusiva.
- d. Reducir la humedad de la incubadora de transporte.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de aplicar succión de secreciones de la orofaringe, debería tener en cuenta.

Seleccione una:

- a. Limitar la succión a 5 segundos.
- b. No superar presiones del manómetro a 100 mmHg.
- c. La respuesta a) y b) son correctas.
- d. Provocar una reacción vagal para favorecer la eliminación de secreciones.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la dosis inicial de adrenalina 1:10000?

Seleccione una:

- a. 10 microgramos/Kg.
- b. 20 microgramos/Kg.
- c. 300 microgramos/Kg.
- d. 50 microgramos/Kg.

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es aconsejable la utilización del pulsioxímetro para informar de la frecuencia cardiaca?

Seleccione una:

- a. No.
- b. Si.
- c. Indiferente.
- d. Si, pero sin descuidar la clínica del neonato y la valoración del patrón respiratorio.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la reposición de líquidos, señale la respuesta correcta en cuanto a la administración inicial de sueroterapia isotónica.

Seleccione una:

- a. 20 ml por Kg.
- b. 10 ml por Kg.
- c. 30 ml por Kg.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué temperatura es idónea para mantener al neonato después del nacimiento en la fase de estabilización?

Seleccione una:

- a. 37°C.
- b. 37-37,5°C.
- c. 36,5°C-37,5°C.
- d. 35,5-36,5°C.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la estabilización neonatal en condiciones normales, ¿Cuál es la temperatura a la que debería mantener al neonato?

Seleccione una:

- a. Temperatura inferior a 36°C.
- b. Temperatura superior a 36°C.
- c. Temperatura de hipotermia pasiva.
- d. Temperatura superior a 37°C.

Pregunta 10

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto es el tiempo estándar de valoración antes de iniciar la secuencia de reanimación neonatal como consenso?

Seleccione una:

- a. 90 segundos.
- b. 60 segundos.
- c. 40 segundos.
- d. 30 segundos.

Cuándo dejaría de aplicar compresiones torácicas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Si la frecuencia cardíaca es superior a 60 latidos por minuto.
- b. Si la frecuencia cardíaca es superior a 50 latidos por minuto.
- c. 15 minutos después de haber iniciado masaje.
- d. A los 60 segundos de iniciar masaje.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardíaca en el neonato que indicaría el inicio de compresiones torácicas?

Seleccione una:

- a. Menos de 100 latidos por minuto.
- b. Más de 60 latidos por minuto.
- c. Menos de 60 latidos por minuto.
- d. Más de 100 latidos por minuto.

Pregunta 3

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 120 latido por minuto.
- b. Menos de 100 latido por minuto.
- c. Más de 120 latido por minuto.
- d. d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se considera el empleo de fármacos durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Si persiste una frecuencia cardiaca menor de 60 latidos por minuto.
- b. Independientemente del tipo de ventilación.
- c. Preferiblemente a través de catéter arterial central.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la dosis inicial de adrenalina 1:10000?

Seleccione una:

- a. 20 microgramos/Kg.
- b. 50 microgramos/Kg.
- c. 10 microgramos/Kg.
- d. 300 microgramos/Kg.

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Finnegan.
- b. Fagerström.
- c. Apgar.
- d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Polipnea.
- b. Tiraje subcostal.
- c. Frecuencia respiratoria.
- d. Frecuencia cardiaca.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para favorecer el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 30 segundos.
- b. 3 minutos.
- c. Entre 30 y 60 segundos.
- d. No se recomienda retrasar el pinzamiento de cordón umbilical.

Pregunta 9

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El soporte ventilatorio inicial en la RCP se realizará mediante:

Seleccione una:

- a. Aire con una concentración de oxígeno al 40%.
- b. Aire con una concentración de oxígeno al 30%.
- c. Aire con una concentración de oxígeno al 21%.
- d. Aire con una concentración de oxígeno al 100%.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué aspectos clínicos mejora el retraso de pinzamiento del cordón umbilical?

Seleccione una:

- a. Incrementa el gasto cardiaco.
- b. Incrementa la presión arterial sistémica.
- c. Retrasa el gasto cardiaco.
- d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respecto a la reposición de líquidos, señale la respuesta correcta en cuanto a la administración inicial de sueroterapia isotónica.

Seleccione una:

- a. 20 ml por Kg.
- b. 10 ml por Kg.
- c. 30 ml por Kg.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Es aconsejable la utilización del pulsioxímetro para informar de la frecuencia cardiaca?

Seleccione una:

- a. Si, pero sin descuidar la clínica del neonato y la valoración del patrón respiratorio.
- b. No.
- c. Indiferente.
- d. Si.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

El soporte ventilatorio inicial en la RCP se realizará mediante:

Seleccione una:

- a. Aire con una concentración de oxígeno al 40%.
- b. Aire con una concentración de oxígeno al 30%.



c. Aire con una concentración de oxígeno al 100%.



d. Aire con una concentración de oxígeno al 21%.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:



a. Frecuencia cardiaca.



b. Frecuencia respiratoria.



c. Polipnea.



d. Tiraje subcostal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:



a. Finnegan.



b. Fagerström.



c. Apgar.



d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué aspectos clínicos mejora el retraso de pinzamiento del cordón umbilical?

Seleccione una:

- a. Incrementa el gasto cardiaco.
- b. Incrementa la presión arterial sistémica.
- c. Retrasa el gasto cardiaco.
- d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la estabilización neonatal en condiciones normales, ¿Cuál es la temperatura a la que debería mantener al neonato?

Seleccione una:

- a. Temperatura de hipotermia pasiva.
- b. Temperatura superior a 37°C.
- c. Temperatura inferior a 36°C.
- d. Temperatura superior a 36°C.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué temperatura es idónea para mantener al neonato después del nacimiento en la fase de estabilización?

Seleccione una:

- a. 36,5°C-37,5°C.
- b. 35,5-36,5°C.
- c. 37°C.
- d. 37-37,5°C.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato que indicaría el inicio de compresiones torácicas?

Seleccione una:

- a. Más de 60 latidos por minuto.
- b. Menos de 60 latidos por minuto.
- c. Menos de 100 latidos por minuto.
- d. Más de 100 latidos por minuto.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de aplicar succión de secreciones de la orofaringe, debería tener en cuenta.

Seleccione una:

- a. Limitar la succión a 5 segundos.
- b. No superar presiones del manómetro a 100 mmHg.
- c. La respuesta a) y b) son correctas.
- d. Provocar una reacción vagal para favorecer la eliminación de secreciones.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué saturación de oxígeno preductual es considerada como aceptable a los 2 minutos de nacimiento?

Seleccione una:

- a. 85%.
- b. 90%.
- c. 60%.
- d. 70%.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 120 latido por minuto.
- b. Menos de 100 latido por minuto.
- c. Más de 120 latido por minuto.
- d. d) Ninguna de las anteriores.

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se considera el empleo de fármacos durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Si persiste una frecuencia cardiaca menor de 60 latidos por minuto.
- b. Independientemente del tipo de ventilación.
- c. Preferiblemente a través de catéter arterial central.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para favorecer el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Entre 30 y 60 segundos.
- b. 3 minutos.
- c. Menos de 30 segundos.
- d. No se recomienda retrasar el pinzamiento de cordón umbilical.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la relación en las compresiones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. 90:10
- b. 15:2.
- c. 3:1
- d. 100:1

Pregunta 6

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En recién nacidos prematuros para evitar gran cantidad de calor estaría indicado:

Seleccione una:

- a. Uso de una envoltura de plástico oclusiva.
- b. Reducir la humedad de la incubadora de transporte.
- c. Bañar al neonato y secarlo.
- d. Disminuir la temperatura exterior de la sala de partos.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Finnegan.
- b. Fagerström.
- c. Apgar.
- d. Ninguno de los anteriores.

Pregunta 8

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo dejaría de aplicar compresiones torácicas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. 15 minutos después de haber iniciado masaje.
- b. A los 60 segundos de iniciar masaje.
- c. Si la frecuencia cardiaca es superior a 60 latidos por minuto.
- d. Si la frecuencia cardiaca es superior a 50 latidos por minuto.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El soporte ventilatorio inicial en la RCP se realizará mediante:

Seleccione una:

- a. Aire con una concentración de oxígeno al 100%.
- b. Aire con una concentración de oxígeno al 30%.
- c. Aire con una concentración de oxígeno al 40%.
- d. Aire con una concentración de oxígeno al 21%.

Pregunta 10

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto es el tiempo estándar de valoración antes de iniciar la secuencia de reanimación neonatal como consenso?

Seleccione una:

- a. 90 segundos.
- b. 60 segundos.
- c. 40 segundos.
- d. 30 segundos.

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Polipnea.
- b. Tiraje subcostal.
- c. Frecuencia cardiaca.
- d. Frecuencia respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardiaca.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje es correcto?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente el 65% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.
- b. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.
- c. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 50 y 60 segundos.
- d. Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará la respiración espontánea entre los 10 y 30 segundos.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de beneficencia se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la estabilización neonatal en condiciones normales, ¿Cuál es la temperatura a la que debería mantener al neonato?

Seleccione una:

- a. Temperatura inferior a 36°C.
- b. Temperatura superior a 37°C.
- c. Temperatura superior a 36°C.
- d. Temperatura de hipotermia pasiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Temperatura superior a 36°C.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio ético de justicia se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Implica que las intervenciones deben beneficiar al paciente, tras la valoración del riesgo y el beneficio.
- b. Se refiere a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con los valores y creencias del mismo.
- c. Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Implica que los recursos sanitarios sean distribuidos equitativamente.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la dosis inicial de adrenalina 1:10000?

Seleccione una:

- a. 300 microgramos/Kg.
- b. 20 microgramos/Kg.
- c. 10 microgramos/Kg.
- d. 50 microgramos/Kg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 microgramos/Kg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo no estaría indicada la reanimación neonatal de los siguientes casos?

Seleccione una:

- a. Peso al nacer bajo.
- b. Distrés respiratorio tipo II.
- c. Anomalía congénita asociada con una elevada morbilidad.
- d. Hipertensión pulmonar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anomalía congénita asociada con una elevada morbilidad.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- a. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).
- b. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado).
- c. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).
- d. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo se pueden asociar a la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Diabetes materna.
- b. Actividad fetal aumentada.
- c. Madre mayor de 35 años.
- d. Infección materna.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actividad fetal aumentada.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se produce la transición de la vida intrauterina a la extrauterina?

Seleccione una:

- a. Es un proceso que finaliza con la etapa neonatal, a los 28 días de vida.
- b. Al cortar el cordón umbilical.
- c. Al iniciar la respiración aérea.
- d. A las 2 horas del alumbramiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al iniciar la respiración aérea.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es cierto que el éxito de una reanimación neonatal dependerá de la adecuada preparación previa, antes de que se produzca el parto?

Seleccione una:

- a. Las urgencias obstétricas no pueden preverse por lo que no implicará en la actuación de la reanimación su preparación previa.
- b. Sólo en aquellos casos de prematuros de alto riesgo.
- c. Puede que influya en muy poca medida.
- d. Si de forma indiscutible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si de forma indiscutible.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Del siguiente material necesario antes del parto, ¿Cuál cree necesario tener disponible?

Seleccione una:

- a. Cordones o pinza de cordón.
- b. Toalla, trapo limpio y seco.
- c. Material de intubación por si fuera necesario.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una situación terminal del recién nacido, usted deberá:

Seleccione una:

- a. Asegure a los padres que la atención se concentrará en evitar o aliviar el dolor y el sufrimiento.
- b. Que la probabilidad de muerte es alta.
- c. Prestando atención a factores que respeten su sensibilidad cultural.
- d. a), b) y c) son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a), b) y c) son correctas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué dos signos clínicos y en cuanto tiempo se debe identificar si es preciso iniciar la secuencia de maniobras de estabilización?

Seleccione una:

- a. En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardíaco y respiratorio.
- b. En los primeros 6 minutos y atendiendo al ritmo cardíaco y respiratorio.
- c. En los primeros 90 segundos.
- d. En los primeros 60 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los primeros 60 segundos y atendiendo al ritmo cardíaco y respiratorio.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la forma de confirmar la cianosis percibida en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Mediante un oxímetro.
- b. Mediante la tensión arterial.
- c. ECG.
- d. Mediante una bioquímica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mediante un oxímetro.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- b. 3 personas, una de ellas técnico de cuidados en enfermería.
- c. Indiferente, no depende del número de personas.
- d. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el cambio en el periodo de transición a la vida extrauterina más representativo?

Seleccione una:

- a. Cambio de circulación placentaria.
- b. Termogénesis.
- c. Modificación de la función endocrina.
- d. Establecimiento de la respiración espontánea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Establecimiento de la respiración espontánea.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nacimiento, ¿Qué tiempo suelen tardar los neonatos a término en alcanzar una saturación de oxígeno de 90% o superior?

Seleccione una:

- a. 30 minutos.
- b. 15 minutos.
- c. 10 minutos.
- d. 20 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 minutos.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son cambios fundamentales en el momento del nacimiento y la primera respiración espontánea?

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. El líquido en los alvéolos es absorbido por el sistema linfático pulmonar y reemplazado por aire.
- c. Los vasos sanguíneos de los tejidos pulmonares se relajan, disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo.
- d. Las arterias umbilicales se contraen y luego las arterias y las venas umbilicales se cierran cuando se aplican las pinzas al cordón umbilical.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- a. Los años ajustados por calidad de vida o AVAC.
- b. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- c. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- d. La calidad de vida que se prevé para el recién nacido con y sin tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los años ajustados por calidad de vida o AVAC.

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- d. La respuesta a) y b) son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respuesta a) y b) son correctas.

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debe implicarse el profesional sanitario ante la toma de decisiones y las consideraciones éticas en la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. De forma proactiva.
- b. Ejercer una capacidad de evaluación y juicio que conduzcan a una atención adecuada.
- c. Las respuestas a) y b) son correctas.
- d. No es competencia del profesional de enfermería asumir ese rol.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a) y b) son correctas.

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las adaptaciones neurológicas, en el recién nacido se puede observar:

Seleccione una:

- a. Reflejos primarios que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla.
- b. Puede presentar temblores transitorios.
- c. Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, al igual que los ciclos del sueño.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no hubiera tiempo suficiente para consultar recursos adicionales, y el médico responsable concluyera que la decisión de los padres no es lo mejor para el niño, suele ser adecuado:

Seleccione una:

- a. No reanimar bajo ningún concepto.
- b. Reanimar sólo en los recién nacidos a término.
- c. No reanimar.
- d. Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es un representante de ILCOR?

Seleccione una:

- a. Consejo Europeo de Resucitación.
- b. Consejo de Resucitación de Sudáfrica.
- c. Asociación Americana de cirugía cardiovascular.
- d. Consejo de Resucitación de Asia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asociación Americana de cirugía cardiovascular.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Aumentan las resistencias pulmonares.
- c. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.
- d. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan las presiones vasculares sistémicas.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una situación de compromiso fetal severo, en la que se precisara infundir medicación, ¿cuántas personas mínimo serían necesarias?

Seleccione una:

- a. 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.
- b. 1 persona adiestrada en reanimación neonatal.
- c. 2 personas capaces de realizar reanimación neonatal completa.
- d. Indiferente, no depende del número de personas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 personas, una de ellas involucrada con la preparación de la medicación.

Pregunta 28

Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Entre los factores que podrían retardar la reabsorción del líquido pulmonar está:

Seleccione una:

- a. el aumento del número y funcionalidad de las células tipo II.
- b. el nacimiento sin trabajo de parto.
- c. la presión intravascular baja.
- d. la disminución de la permeabilidad vascular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: el nacimiento sin trabajo de parto.

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la reposición de líquidos, señale la respuesta correcta en cuanto a la administración inicial de sueroterapia isotónica.

Seleccione una:

- a. 20 ml por Kg.
- b. 10 ml por Kg.
- c. 30 ml por Kg.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 ml por Kg.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto es el tiempo estándar de valoración antes de iniciar la secuencia de reanimación neonatal como consenso?

Seleccione una:

- a. 90 segundos.
- b. 60 segundos.
- c. 40 segundos.
- d. 30 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60 segundos.

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál no se considera un objetivo de ILCOR:

Seleccione una:

- a. Difundir información sobre la formación y la educación en reanimación.
- b. No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación.
- c. Proporcionar un mecanismo para recolectar, revisar y compartir datos científicos internacionales de reanimación.
- d.

Producir declaraciones sobre cuestiones específicas relacionadas con la reanimación que se reflejan en el consenso internacional.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No fomentar la investigación científica en las áreas de reanimación.

Pregunta 32

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes problemas pueden aparecer durante el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Ventilación inadecuada.
- b. Hipotensión sistémica.
- c. Baja frecuencia cardíaca.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 33

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo empezaría el soporte ventilatorio de un recién nacido a término?

Seleccione una:

- a. Con oxígeno a bajas concentraciones (25-30%).
- b. Con aire ambiente.
- c. Con oxígeno a concentraciones medias (30-40%).
- d. Oxígeno en concentraciones superiores a 30%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con aire ambiente.

Pregunta 34

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo recomiendan retrasar el pinzamiento del cordón umbilical para favorecer el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 30 segundos.
- b. Entre 30 y 60 segundos.
- c. No se recomienda retrasar el pinzamiento de cordón umbilical.
- d. 3 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 30 y 60 segundos.

Pregunta 35

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de recién nacidos a término se estima que necesitarán reanimación en la que se precise masaje cardiaco y empleo de fármacos?

Seleccione una:

- a. 0,1%.
- b. 2%.
- c. 5%.
- d. 1%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 0,1%.

Pregunta 36

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de recién nacidos precisa de algún tipo de asistencia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- a. 1-2%.
- b. 0,5-2%.
- c. 5-10%.
- d. 10-20%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5-10%.

Pregunta 37

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las 3 comunicaciones madre-feto que desaparecen después del nacimiento del recién nacido?

Seleccione una:

- a. Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso.
- b. Sólo son 2 comunicaciones: ductus arterioso y ductus venoso.
- c. Comunicación intercavital, ductus arterioso, ductus venoso.
- d. Cuerpo alba, ductus arterioso, ductus venoso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Foramen oval, ductus arterioso, ductus venoso.

Pregunta 38

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- a. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- b. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- c. Los riesgos implicados en el tratamiento y sin el mismo.
- d. El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.

Pregunta 39

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción falsa respecto a las recomendaciones ILCOR 2015 sobre el pinzamiento del cordón umbilical.

Seleccione una:

- a. Al menos se suele recomendar una demora en el pinzamiento de un minuto.
- b. No existe evidencia para recomendar un tiempo determinado de pinzamiento.
- c. Está indicada la demora en el pinzamiento del cordón.
- d. El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tiempo de pinzamiento considerado es de 5 minutos.

Pregunta 40

Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Menos de 120 latido por minuto.
- b. Menos de 100 latido por minuto.
- c. Más de 120 latido por minuto.
- d. d) Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menos de 100 latido por minuto.