


Comenzado el	sábado, 21 de marzo de 2020, 11:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 21 de marzo de 2020, 12:08
Tiempo empleado	41 minutos 15 segundos
Puntos	62,00/70,00
Calificación	8,86 de 10,00 (89%)

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

Seleccione una:


- ☒ a. Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%
- ☐ b. Es el dolor que se presenta en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos
- ☐ c. Repercute en la satisfacción del paciente
- ☐ d. Es un pilar muy importante dentro de los cuidados perioperatorios

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la falsa en relación a la afectación gastrointestinal y urinaria derivada de la aparición de DAP:

Seleccione una:

- ☒ a. Aumenta la micción
- ☐ b. Aumento del tono de los esfínteres
- ☐ c. Disminución de la motilidad gastrointestinal

- ☐ d. Hipomotilidad de uretra


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta la micción

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor postoperatorio

Seleccione una:

- ☐ a. Es un problema de los cirujanos
- ☐ b. Es de duración corta, nunca se cronifica
- ☐ c. Es normal tenerlo
- ☒ d. Potencia alteraciones en patologías asociadas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Potencia alteraciones en patologías asociadas

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los indicadores de la UDA deben cumplir una serie de criterios para ser considerados adecuados. ¿Cuál de los siguientes no es uno de estos criterios?

Seleccione una:


- ☒ a. Facilitar la explicación de las causas de los resultados obtenidos.
- ☐ b. Deben medir aspectos relevantes del proceso.
- ☐ c. Centrarse en los procesos ajenos al control de la organización.
- ☐ d. Identificar las oportunidades de mejora.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Centrarse en los procesos ajenos al control de la organización.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al concepto que los pacientes tiene sobre el dolor señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:


- ☐ a. Creen que se debe soportar el dolor
- ☐ b. Creen que los analgésicos opiáceos inevitablemente producen adicción
- ☐ c. Creen que los analgésicos se deben reservar por si el dolor empeora
- ☒ d. Creen que si no tienen dolor es porque no los han intervenido

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Creen que si no tienen dolor es porque no los han intervenido

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación falsa en relación a las técnicas anestésicas/analgésicas y su posible implicación en la recurrencia tumoral:

Seleccione una:


- ☒ a. Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer
- ☐ b. Los anestésicos locales tipo amidas han demostrado in vitro actividad citotóxica que podría resultar beneficioso para prevenir la recurrencia tumoral
- ☐ c. La anestesia/analgesia regional puede jugar un papel en la prevención de recurrencia y metástasis tumoral
- ☐ d. La técnica anestésica durante la cirugía del tumor primario podría afectar a la recurrencia o incluso metástasis tumoral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la falsa entre las localizaciones quirúrgicas que generen DAP intenso:

Seleccione una:


- ☐ a. Ortopedia
- ☒ b. Oftalmología
- ☐ c. Pared torácica
- ☐ d. Cirugía general

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oftalmología

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes corresponde a un método de evaluación de dolor agudo postoperatorio

Seleccione una:


- ☐ a. Test de Nottingham
- ☐ b. Cuestionario de dolor de McGill
- ☒ c. Escala de valoración verbal
- ☐ d. Cuestionario de dolor de Darmouth

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escala de valoración verbal

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un punto esencial en la información al paciente acerca del dolor y su tratamiento:

Seleccione una:


- ☐ a. Los objetivos del tratamiento
- ☐ b. Las técnicas analgésicas
- ☒ c. Informar relativamente poco para no asustarlo
- ☐ d. Las posibles complicaciones del tratamiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar relativamente poco para no asustarlo

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De todas las características definidas previamente cual es la mas relevante en el ámbito clínico

Seleccione una:


- ☐ a. Perfeccionismo
- ☐ b. Fiabilidad
- ☒ c. Sensibilidad
- ☐ d. Aplicabilidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensibilidad

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales de las siguientes no son características recomendables de un método de evaluación del dolor

Seleccione una:

- ☒ a. Perfeccionismo y trazabilidad
- ☐ b. Aplicabilidad y uniformidad
- ☐ c. Idoneidad y sensibilidad
- ☐ d. Fiabilidad y validez


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Perfeccionismo y trazabilidad

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente anciano en relación a la evaluación del dolor señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Se prefiere la escala numérica
- ☐ b. Los modelos multidimensional son los mas fiables
- ☐ c. Se utilizan las mismas escalas que en el paciente adulto
- ☐ d. Los métodos observacionales han mostrado utilidad


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los métodos observacionales han mostrado utilidad

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel endocrino, el DAP puede:

Seleccione una:

- ☐ a. Se genera hipoglucemia
- ☒ b. Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina
- ☐ c. Aumenta la secreción de insulina
- ☐ d. Disminuye la liberación de cortisol


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la seguridad del método de PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia
- ☐ b. La ISMP (Institute for Safe Medication Practices) recomienda que dos personas chequeen las bombas de PCA una vez programadas
- ☐ c. Según la base de datos MAUDE en relación a la utilización de bombas de PCA, los errores de programación constituyeron el 39% de todos los eventos registrados
- ☐ d. Los elastómeros también se han asociado a problemas de seguridad, por lo que se ha de realizar una monitorización exhaustiva del paciente


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes no se considera implicado en el proceso de PCA

Seleccione una:

- ☐ a. Farmacia
- ☐ b. Paciente
- ☐ c. Médico
- ☒ d. Subdirector médico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subdirector médico

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes no es una ventaja de una PCA

Seleccione una:

- ☐ a. Niveles plasmáticos uniformes de los fármacos analgésicos
- ☐ b. Reducción ansiedad del paciente
- ☐ c. Efectividad en el control del dolor
- ☒ d. Disminución de las infecciones quirúrgicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de las infecciones quirúrgicas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la administración de ketamina, señalar lo que es cierto:

Seleccione una:

- ☐ a. Su mayor eficacia se obtiene con la administración en el postoperatorio
- ☒ b. Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides
- ☐ c. En el tratamiento del dolor postoperatorio está indicada por vía endovenosa y epidural


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la utilización de sufentanilo sublingual, señalar la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. No posee metabolitos activos
- ☐ b. Sufentanilo tiene una elevada afinidad por los receptores opioides μ
- ☐ c. Tiene un rápido inicio de acción
- ☒ d. Es 5 veces más potente que la morfina


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es 5 veces más potente que la morfina

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el tipo de interacción, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Se habla de "Sinergia" cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual
- ☐ b. Se habla de "Aditividad" cuando el efecto observado es igual a la suma de los efectos esperados.
- ☐ c. Se habla de "Antagonismo" cuando el efecto observado es inferior a la suma de los efectos esperados
- ☐ d. Las respuestas "a" y "b" son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se habla de "Sinergia" cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes no es un inconveniente de una PCA

Seleccione una:


- ☐ a. Coste
- ☐ b. Precisa que el paciente y la enfermería comprendan la técnica
- ☐ c. Colaboración activa del paciente
- ☒ d. Calidad en el control del dolor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Calidad en el control del dolor

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes no es un método de evaluación del dolor

Seleccione una:


- ☐ a. Métodos observacionales
- ☒ b. Métodos psicofisiológicos
- ☐ c. Métodos fisiológicos
- ☐ d. Métodos subjetivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Métodos psicofisiológicos

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los bloqueos nerviosos periféricos:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye la estancia hospitalaria
- ☐ b. Mejora el control del dolor postoperatorio
- ☐ c. Facilita una rehabilitación postoperatoria más precoz
- ☒ d. Disminuye la cronificación del dolor post-quirúrgico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye la cronificación del dolor post-quirúrgico

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál es la afirmación falsa sobre gabapentina y pregabalina:

Seleccione una:

- ☐ a. Las guías de la APS recomiendan su administración formando parte de una analgesia multimodal
- ☐ b. Las dosis recomendadas son de 600 a 1200 mg de gabapentina y de 150 a 300 mg de pregabalina
- ☒ c. Pueden administrarse tanto antes como después de la intervención
- ☐ d. Se recomiendan especialmente en cirugía abdominal


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomiendan especialmente en cirugía abdominal

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre las interacciones farmacológicas, señalar la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Las interacciones pueden ser farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas


- ☒ b. La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son sinérgicas (F)
- ☐ c. Muchas de las asociaciones que reciben los ancianos son potencialmente peligrosas
- ☐ d. El estudio de las interacciones es útil para mejorar los efectos terapéuticos de los fármacos utilizados de forma individual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son sinérgicas (F)

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de los siguientes fármacos no está recomendado por vía epidural en el tratamiento del dolor postoperatorio:

Seleccione una:


- ☒ a. Ketamina
- ☐ b. Fentanilo
- ☐ c. Clonidina
- ☐ d. Bupivacaína

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ketamina

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor, señalar la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. La dexametasona no ha demostrado un efecto analgésico administrada antes del inicio de la cirugía laparoscópica, aunque sí una disminución de las náuseas y vómitos
- ☐ b. La dexmedetomidina tiene efecto analgésico y una elevada incidencia de hipotensión y bradicardia.


- ☐ c. La clonidina añadida a los anestésicos locales en los bloqueos nerviosos periféricos prolonga el efecto analgésico
- ☐ d. Algunos estudios han demostrado un efecto analgésico del magnesio administrado por vía endovenosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La dexametasona no ha demostrado un efecto analgésico administrada antes del inicio de la cirugía laparoscópica, aunque sí una disminución de las náuseas y vómitos

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar qué afirmación es falsa sobre la Analgesia Multimodal:

Seleccione una:


- ☐ a. Pretende obtener una analgesia eficaz
- ☐ b. Pretende disminuir la disfunción orgánica secundaria al estrés quirúrgico
- ☐ c. Pretende disminuir la incidencia y gravedad de los efectos secundarios
- ☒ d. Pretende acortar la estancia hospitalaria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pretende acortar la estancia hospitalaria

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Pertenecen al ámbito de aumento de la morbilidad de un paciente los siguientes excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparición de un síndrome de ansiedad
- ☒ b. El gasto farmacéutico
- ☐ c. La polimedicación
- ☐ d. La limitación en la realización de sus tareas diarias


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El gasto farmacéutico

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los factores psicosociales relacionados con la percepción del dolor agudo postoperatorio, señale la repuesta falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio
- ☐ b. Algunos factores psicosociales pueden ser modificables en el preoperatorio
- ☐ c. Las principales guías para manejo del dolor postoperatorio incluyen la recomendación de proporcionar información al paciente y familia del plan de cuidados para el control de dolor
- ☐ d. La ansiedad es un factor que influye en la percepción del dolor postoperatorio


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los costes directos derivados de las implicaciones económicas de un paciente con DAP, señale la verdadera:

Seleccione una:


- ☐ a. Productividad laboral perdida
- ☐ b. Ausencia en el consumo del cine por el paciente
- ☐ c. Ausencia laboral del acompañante
- ☒ d. Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta falsa en relación al DCPQ (dolor crónico postquirúrgico):

Seleccione una:


- ☐ a. Las técnicas mínimamente invasivas se relacionan con menor incidencia de DCPQ
- ☒ b. El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ
- ☐ c. El dolor moderado-severo en el postoperatorio es un factor de riesgo para presentar DCPQ
- ☐ d. Existen determinados polimorfismos genéticos que pueden influir en la sensibilidad al dolor y en la respuesta a determinados analgésicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ

Pregunta 32

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la analgesia postoperatoria en los programas de Fast - Track, ¿cuál es la afirmación falsa?

Seleccione una:


- ☐ a. Solo se ha publicado un meta-análisis sobre este tema
- ☒ b. Se ha demostrado que el tipo de analgesia postoperatoria es un factor clave en los resultados
- ☐ c. Existe mucha heterogeneidad en los estudios sobre analgesia y Fast - Track
- ☐ d. Debe adaptarse a los tiempos de inicio de deambulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ha demostrado que el tipo de analgesia postoperatoria es un factor clave en los resultados

Pregunta **33**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes intervenciones quirúrgicas, ¿cuál puede producir dolor intenso?

Seleccione una:


- ☐ a. Catarata
- ☒ b. Prótesis de rodilla
- ☐ c. Tunel Carpiano
- ☐ d. Exéresis de lipoma

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prótesis de rodilla

Pregunta **34**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al DCPQ, señale la respuesta verdadera:

Seleccione una:


- ☐ a. Su etiopatogenia es bien conocida
- ☐ b. Más del 70% de los paciente intervenidos presentan DCPQ
- ☐ c. Siempre es evitable
- ☒ d. Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía

Pregunta **35**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué intervenciones se registra dolor intenso, a pesar de no ser potencialmente muy dolorosas?

Seleccione una:


- ☐ a. Toracotomía
- ☒ b. Histerectomía y Colectectomía laparoscópica
- ☐ c. Prótesis de rodilla y de cadera
- ☐ d. Extracción de material de osteosíntesis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Histerectomía y Colectectomía laparoscópica

Pregunta 36

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la afirmación verdadera con respecto al registro del DAP en la Historia Clínica, como 5ª constante?

Seleccione una:


- ☐ a. Debe registrarse de forma horaria en las primeras horas de Reanimación
- ☐ b. Es un factor básico en un programa de tratamiento del DAP
- ☒ c. Se registra una baja adherencia a este criterio de calidad
- ☐ d. Debe registrarse de forma horaria hasta el 3º día postoperatorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se registra una baja adherencia a este criterio de calidad

Pregunta 37

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no están incluidos en el concepto de "contexto local"?

Seleccione una:


- ☐ a. Área sanitaria de población
- ☐ b. Programa de Fast - Track
- ☐ c. Hospital con Unidad de Dolor Agudo
- ☒ d. Retirada precoz de drenajes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área sanitaria de población

Pregunta 38

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes puntos no es un efecto secundario de la analgesia epidural?

Seleccione una:


- ☐ a. Bloqueo motor
- ☐ b. Hipotensión
- ☐ c. Prurito
- ☒ d. Poliuria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Poliuria

Pregunta 39

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes objetivos no pertenece a los programas de Fast - Track?

Seleccione una:

- ☐ a. Acelerar la recuperación del tránsito intestinal
- ☐ b. Disminuir las complicaciones postoperatorias
- ☐ c. Disminuir la respuesta al estrés quirúrgico
- ☒ d. Aumentar las indicaciones quirúrgicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentar las indicaciones quirúrgicas

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores que hacen más difícil un control efectivo del dolor agudo postoperatorio en las personas de edad avanzada no se incluyen:

Seleccione una:

- ☒ a. El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada.
- ☐ b. Respuesta alterada al dolor.
- ☐ c. Cambios con la edad en la fisiología, farmacodinamia y farmacocinética.
- ☐ d. Mayor incidencia de enfermedades coexistentes.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En lo referente al paciente con EPOC intenso:

Seleccione una:

- ☐ a. Se recomienda evitar el uso de opioides hidrosolubles (morfina).


- ☐ b. Se recomienda recurrir a opioides liposolubles (fentanilo o metadona) con menor riesgo de migración hacia el sistema nervioso central.
- ☐ c. Los anestésicos locales pueden desencadenar crisis asmática por predominio parasimpático.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 42

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dosis de metamizol para el tratamiento del dolor postoperatorio moderado en población pediátrica es de:

Seleccione una:


- ☐ a. 80-160 mg/Kg cada 6-8h vía oral.
- ☐ b. 20-40 mg/Kg cada 12h vía rectal.
- ☐ c. 80-160 mg/Kg cada 4h vía rectal.
- ☒ d. 20-40 mg/Kg cada 6-8h vía oral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-40 mg/Kg cada 6-8h vía oral.

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un criterio de calidad en una Unidad de Dolor Agudo?

Seleccione una:

- ☐ a. Es una medida cuantitativa de la presencia o ausencia del criterio y se expresa en forma de porcentaje.
- ☐ b. Es el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad.
- ☒ c. Es la condición que debe cumplir un proceso para ser considerado de calidad.

- ☐ d. Es una medida cualitativa de la presencia o ausencia del criterio y se expresa en forma de porcentaje.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la condición que debe cumplir un proceso para ser considerado de calidad.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un paciente no quiere analgésicos porque tiene miedo a la adicción

Seleccione una:

- ☐ a. Le preguntaremos que nos explique por que tiene esa creencia y daremos la información necesaria
- ☐ b. Si es necesario, llamaremos a la enfermera referente/clínica para dar un soporte a la información
- ☒ c. a y b son ciertas
- ☐ d. No le pondremos analgésicos y ya está.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son escalas apropiadas para la valoración del dolor postoperatorio en el paciente de edad avanzada:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las respuestas anteriores son válidas.
- ☐ b. La escala verbal numérica (VNR).
- ☐ c. La escala verbal descriptiva (VDS).
- ☐ d. La escala de caras de dolor.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son válidas.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al desarrollo de lesiones en tratamiento con AINE:

Seleccione una:

- ☐ a. Las complicaciones son más infrecuentes en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica.
- ☐ b. La edad no influye en la frecuencia de aparición de lesiones.
- ☐ c. La hemorragia digestiva es la complicación menos grave y frecuente.
- ☒ d. El desarrollo de lesiones depende del tiempo de tratamiento.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El desarrollo de lesiones depende del tiempo de tratamiento.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al ketorolaco es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un antiinflamatorio bastante potente, 30 mg de ketorolaco equivalen en potencia analgésica a 10 mg de morfina.
- ☐ b. Puede producir náuseas y dolor gástrico.
- ☒ c. Se elimina por vía hepática.
- ☐ d. Se recomienda evitar su uso en pacientes con alto riesgo de úlcera de estrés.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se elimina por vía hepática.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una recomendación en el control del dolor del paciente obeso:

Seleccione una:

- ☐ a. Una movilización lo más precoz posible y fisioterapia respiratoria.
- ☐ b. El bloqueo epidural proporciona un incremento del tono parasimpático a nivel intestinal que ocasiona una recuperación funcional digestiva más temprana.
- ☒ c. Dosificar los fármacos siempre en función del Índice de Masa Corporal (IMC).
- ☐ d. Analgesia combinada o multimodal para disminuir los requerimientos de opioides.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dosificar los fármacos siempre en función del Índice de Masa Corporal (IMC).

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación de fármacos de la FDA, ¿qué tipo de fármacos están contraindicados en la mujer embarazada para el control del dolor?:

Seleccione una:

- ☐ a. Categoría B.
- ☐ b. Categoría A.
- ☐ c. Categoría C.
- ☒ d. Categoría X.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Categoría X.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dosis de morfina en el dolor postoperatorio intenso es de:

Seleccione una:


- ☐ a. 100-400 mg/Kg/h como dosis de mantenimiento.
- ☒ b. 10-40 mg/Kg/h como dosis de mantenimiento.
- ☐ c. 0,1-0,15 mg/Kg en perfusión como dosis de mantenimiento.
- ☐ d. 10-40 mg/Kg/h en bolus.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10-40 mg/Kg/h como dosis de mantenimiento.

Pregunta 51

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es uno de los efectos secundarios de los opioides:

Seleccione una:


- ☐ a. Tolerancia.
- ☐ b. Nauseas, vómitos.
- ☒ c. Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides.
- ☐ d. Depresión respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides.

Pregunta 52

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No se ha demostrado que uno de los siguientes factores disminuya las complicaciones postoperatorias, ¿cuál es?

Seleccione una:


- ☐ a. Retirada precoz de sonda nasogástrica
- ☐ b. Analgesia Epidural
- ☐ c. Laparoscopia
- ☒ d. Drenaje abdominal hasta el 5º día postoperatorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Drenaje abdominal hasta el 5º día postoperatorio

Pregunta 53

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al paracetamol:

Seleccione una:


- ☐ a. La adición de codeína empeora su eficacia.
- ☐ b. Es el analgésico más potente para el dolor intenso.
- ☐ c. La combinación con otro AINE es más inefectiva que el uso de cada fármaco.
- ☒ d. Es el analgésico de elección en población pediátrica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el analgésico de elección en población pediátrica.

Pregunta 54

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la nefrotoxicidad inducida por AINE es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. El fracaso renal agudo tiene una incidencia del 0,5-1%.


- ☐ b. El ketorolaco tiene un bajo índice de nefrotoxicidad.
- ☒ c. La mayoría de las lesiones renales inducidas por AINE son irreversibles.
- ☐ d. La necrosis papilar es de aparición gradual pero reversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mayoría de las lesiones renales inducidas por AINE son irreversibles.

Pregunta 55

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de satisfacción y confort?

Seleccione una:


- ☒ a. Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.
- ☐ b. El tiempo medio de tratamiento necesario para conseguir el alivio del dolor.
- ☐ c. Porcentaje de eventos adversos graves por tipo de analgesia recibida.
- ☐ d. Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.

Pregunta 56

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al bloqueo intercostal en el paciente pediátrico, es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede provocar insuficiencia respiratoria grave si se asocia a neumotórax.
- ☒ b. Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria.
- ☐ c. La extensión puede afectar a varios metámeros en una sola punción.

- ☐ d. Es efectivo para la analgesia postoperatoria tras cirugía tóraco-abdominal.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes efectos no es consecuencia de la analgesia epidural, ¿cuál es?

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye la neumonía postoperatoria
- ☒ b. Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal
- ☐ c. Acelera el tránsito intestinal
- ☐ d. Disminuye la mortalidad postoperatoria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal

Pregunta 58

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes modelos de Unidad de Dolor Agudo es considerada de bajo coste?

Seleccione una:


- ☐ a. Unidades de cuidados perioperatorios o Reanimaciones ampliadas.
- ☐ b. Unidades integrales de dolor.
- ☒ c. El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anestesiólogos
- ☐ d. El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.

Pregunta **59**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la Prótesis de Rodilla, ¿cuál de las siguientes analgesias es la menos indicada?

Seleccione una:


- ☐ a. PCAE
- ☒ b. PCAIV con morfina
- ☐ c. PCA regional con catéter femoral
- ☐ d. PCA regional + bloqueo ciático

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PCAIV con morfina

Pregunta **60**

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes modelos de Unidad de Dolor Agudo es considerada de alto coste?

Seleccione una:


- ☐ a. Unidades integrales de dolor.
- ☐ b. Unidades de cuidados perioperatorios o Reanimaciones ampliadas.
- ☒ c. El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.
- ☐ d. El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anestesiólogos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anestesiólogos

Pregunta **61**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes características no se recoge en los estándares ideales que debería cumplir una Unidad de Dolor Agudo, según el Comité de Acreditación de la SED?

Seleccione una:


- ☐ a. La UDA debe establecer protocolos clínicos propios y valorar su eficacia periódicamente.
- ☐ b. Los integrantes de la UDA deben poseer los conocimientos suficientes de las ciencias básicas y experiencia clínica para manejar los pacientes con dolor agudo.
- ☐ c. Debe existir un Coordinador Médico Anestesiólogo responsable de los servicios dispensados por la Unidad, de la Docencia e Investigación.
- ☒ d. La UDA debe tener la posibilidad de prestar una atención continuada a aquellos pacientes bajo su tratamiento las 24 horas del día, de lunes a sábado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La UDA debe tener la posibilidad de prestar una atención continuada a aquellos pacientes bajo su tratamiento las 24 horas del día, de lunes a sábado.

Pregunta 62

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “El reto que supone introducir una nueva actividad y unidad en un hospital con una estructura ya definida, donde hay que hacer hueco a un nuevo proyecto”?

Seleccione una:

- ☐ a. Político.
- ☐ b. Cultural.
- ☒ c. Estructural.
- ☐ d. Educacional.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estructural.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “la motivación de los profesionales para adherirse y mantener el esfuerzo de cambio”?

Seleccione una:

- ☒ a. Emocional.
- ☐ b. Educacional.
- ☐ c. Estructural.
- ☐ d. Físico/tecnológico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Emocional.

Pregunta 64

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál los siguientes no es un objetivo prioritario de las Guías de Práctica Clínica en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio?

Seleccione una:

- ☒ a. Reducir el uso de intervenciones innecesarias, inefectivas o dañinas.
- ☐ b. Mejorar la calidad de la atención sanitaria.
- ☐ c. Disminuir el coste.
- ☐ d. Facilitar a los pacientes tratamientos con la máxima probabilidad de beneficio, con el mínimo riesgo de producir daños y con un coste aceptable.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el coste.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La base de datos informatizada de la UDA debe cumplir una serie de características entre las que se encuentran todas las siguientes, excepto:

Seleccione una:


- ☐ a. Disponer de diferentes niveles de acceso (administrador, usuario, visualización de datos).
- ☐ b. Fiable, debe existir copia de seguridad por parte del Servicio de Informática que evita la pérdida accidental de datos.
- ☐ c. Segura, requiere una clave personal para poder acceder desde cualquier terminal del hospital.
- ☒ d. De fácil acceso para todo el personal del hospital, por lo que no requiere clave de acceso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De fácil acceso para todo el personal del hospital, por lo que no requiere clave de acceso.

Pregunta 66

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los parámetros de programación de la PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:


- ☐ a. La relación entre dosis administradas y dosis solicitadas puede ser útil para valorar si la programación de parámetros realizada es adecuada
- ☒ b. La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso
- ☐ c. La perfusión basal se recomienda en niños
- ☐ d. La perfusión basal se recomienda en pacientes en tratamiento crónico con opioides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el método del isoblograma, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas
- ☐ b. El isobolo teórico se representa mediante una línea recta
- ☐ c. Los isobolos de las combinaciones que se sitúan por encima de la línea de aditividad muestran una interacción de tipo "antagonismo"
- ☐ d. Los isobolos de las combinaciones que se sitúan por debajo de la línea de aditividad muestran una interacción de tipo "sinergia"


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. La administración de sufentanilo por vía sublingual puede ser útil en el tratamiento del dolor postoperatorio
- ☐ b. Siempre que sea posible se recomienda utilizar la vía oral
- ☒ c. Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio
- ☐ d. Se ha de evitar utilizar la vía intramuscular


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio

Pregunta 69

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué terapia no farmacológica cuando se aplica sobre un tronco nervioso sensitivo ejerce una acción anestésica:

Seleccione una:

- ☐ a. El calor
- ☐ b. El masaje
- ☐ c. La electroestimulación
- ☐ d. El frío


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El masaje

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del dolor en movimiento

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesaria
- ☒ b. Se ha de hacer y registrar en todos los pacientes
- ☐ c. Se ha de hacer en la sala de rehabilitación
- ☐ d. Solo se ha de hacer en pacientes de Cirugía Mayor Ambulatoria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ha de hacer y registrar en todos los pacientes