


Comenzado el	domingo, 29 de noviembre de 2020, 08:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 29 de noviembre de 2020, 09:05
Tiempo empleado	48 minutos 38 segundos
Puntos	70,00/70,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la intensidad de dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La cirugía abdominal mayor, la cirugía torácica y la cirugía ortopédica suele asociarse a dolor postoperatorio severo
- ☐ b. La capacidad de predecir con exactitud el dolor postoperatorio en un paciente concreto es limitada
- ☐ c. La ansiedad puede influir en la percepción del dolor postoperatorio
- ☒ d. La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la satisfacción del paciente tras un proceso quirúrgico, señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida
- ☐ b. Las medidas encaminadas a optimizar la calidad de manejo en el dolor postoperatorio pueden y suelen influir positivamente en la satisfacción del paciente

- ☐ c. La satisfacción del paciente viene determinada por sus propias expectativas, la calidad de la asistencia y la manera en que el paciente percibe ésta asistencia (calidad percibida).
- ☐ d. El dolor junto con las náuseas y vómitos son factores muy importantes que repercuten en la satisfacción del paciente


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida

Pregunta 3

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La adherencia al tratamiento

Seleccione una:

- ☐ a. Se consigue usando bombas endovenosas continuas
- ☒ b. En países desarrollados el cumplimiento de los tratamientos crónicos es del 50%
- ☐ c. Es habitual en los ancianos
- ☐ d. Es un objetivo solo de Atención primaria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En países desarrollados el cumplimiento de los tratamientos crónicos es del 50%

Pregunta 4

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es una desventaja de los indicadores de la UDA?

Seleccione una:

- ☐ a. Son una medida directa de lo realizado.
- ☐ b. Son fácilmente interpretados por los clínicos.

- ☐ c. Se pueden utilizar en muestras pequeñas.
- ☒ d. Son demasiado específicos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son demasiado específicos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Refiera que advertencia no es útil para el paciente en relación al control del dolor.

Seleccione una:

- ☒ a. El dolor debe ir decreciendo gradualmente tras la cirugía
- ☐ b. Puede utilizar los fármacos habituales que tenga en casa para el tratamiento del dolor
- ☐ c. Si el dolor no está controlado debe advertirlo a su médico
- ☐ d. Lo más habitual es que para el tratamiento del dolor se utilice la vía oral


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El dolor debe ir decreciendo gradualmente tras la cirugía

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un pilar muy importante dentro de los cuidados perioperatorios
- ☒ b. Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%
- ☐ c. Repercute en la satisfacción del paciente
- ☐ d. Es el dolor que se presenta en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las principales alteraciones inmunológicas asociadas a un paciente con DAP son las siguientes, excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. Aumento en las funciones de los linfocitos T y B
- ☐ b. Aumenta la actividad fagocítica,
- ☐ c. Disminuye la quimiotaxis,
- ☐ d. Granulocitosis,


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento en las funciones de los linfocitos T y B

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De todas las características definidas previamente cual es la mas relevante en el ámbito clínico

Seleccione una:

- ☒ a. Sensibilidad
- ☐ b. Fiabilidad
- ☐ c. Aplicabilidad
- ☐ d. Perfeccionismo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensibilidad

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes no se considera un punto clave en el tratamiento del dolor:

Seleccione una:

- ☐ a. Reduce el estrés emocional
- ☐ b. El manejo del dolor debe ser multidisciplinar
- ☒ c. La incorporación de la homeopatía por las evidencias científicas recientes
- ☐ d. Reconocer que el tratamiento del dolor es un derecho de los pacientes


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La incorporación de la homeopatía por las evidencias científicas recientes

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes no se considera una vía típica de administración de fármacos mediante PCA

Seleccione una:

- ☐ a. Intravenosa
- ☐ b. Epidural
- ☐ c. Intratecal
- ☒ d. Oral


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oral

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes no es una ventaja de una PCA

Seleccione una:

- ☐ a. Reducción ansiedad del paciente
- ☐ b. Niveles plasmáticos uniformes de los fármacos analgésicos
- ☐ c. Efectividad en el control del dolor
- ☒ d. Disminución de las infecciones quirúrgicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de las infecciones quirúrgicas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes no se considera implicado en el proceso de PCA

Seleccione una:

- ☐ a. Farmacia
- ☐ b. Médico
- ☒ c. Subdirector médico
- ☐ d. Paciente


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subdirector médico

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta falsa en relación al DCPQ (dolor crónico postquirúrgico):

Seleccione una:

- ☐ a. Existen determinados polimorfismos genéticos que pueden influir en la sensibilidad al dolor y en la respuesta a determinados analgésicos
- ☐ b. Las técnicas mínimamente invasivas se relacionan con menor incidencia de DCPQ
- ☐ c. El dolor moderado-severo en el postoperatorio es un factor de riesgo para presentar DCPQ
- ☒ d. El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los parámetros de programación de la PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. La perfusión basal se recomienda en pacientes en tratamiento crónico con opioides
- ☐ b. La relación entre dosis administradas y dosis solicitadas puede ser útil para valorar si la programación de parámetros realizada es adecuada
- ☒ c. La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso
- ☐ d. La perfusión basal se recomienda en niños


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la escala numérica para evaluar el dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene 5 categorías de 0 a 5 según la intensidad
- ☐ b. Es una línea dividida en 10 puntos entre “no dolor” y “máximo dolor imaginable”.
- ☒ c. Se asigna un valor de 0 (no dolor) a 10 (dolor insoportable)
- ☐ d. Contempla 10 grados de intensidad y 5 de malestar


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se asigna un valor de 0 (no dolor) a 10 (dolor insoportable)

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes no se considera una modalidad de PCA

Seleccione una:

- ☐ a. PCA continua
- ☒ b. PCA sensible al contexto
- ☐ c. PCA a dosis demanda variable
- ☐ d. PCA con bolos a demanda


Retroalimentación

La respuesta correcta es: PCA sensible al contexto

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la seguridad del método de PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Los elastómeros también se han asociado a problemas de seguridad, por lo que se ha de realizar una monitorización exhaustiva del paciente
- ☐ b. Según la base de datos MAUDE en relación a la utilización de bombas de PCA, los errores de programación constituyeron el 39% de todos los eventos registrados
- ☒ c. Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia
- ☐ d. La ISMP (Institute for Safe Medication Practices) recomienda que dos personas chequeen las bombas de PCA una vez programadas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la analgesia espinal en dolor postoperatorio es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Está indicada en procedimientos mayores a nivel torácico y abdominal
- ☐ b. La vía intratecal tiene una utilidad limitada para un dolor postoperatorio intenso de varios días de duración
- ☐ c. La analgesia epidural disminuye la morbilidad postoperatoria
- ☒ d. La analgesia epidural aumenta el íleo postoperatorio


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La analgesia epidural aumenta el íleo postoperatorio

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. La administración de sufentanilo por vía sublingual puede ser útil en el tratamiento del dolor postoperatorio
- ☒ b. Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio
- ☐ c. Siempre que sea posible se recomienda utilizar la vía oral
- ☐ d. Se ha de evitar utilizar la vía intramuscular


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un punto esencial en la información al paciente acerca del dolor y su tratamiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Las posibles complicaciones del tratamiento
- ☐ b. Las técnicas analgésicas
- ☐ c. Los objetivos del tratamiento
- ☒ d. Informar relativamente poco para no asustarlo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar relativamente poco para no asustarlo

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la escala de caras de Wong-Baker, señale la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Consta de 8 expresiones faciales
- ☐ b. Es útil en ancianos sobre todo
- ☐ c. Está prácticamente abandonada porque es muy imprecisa
- ☒ d. Originalmente contaba de seis caras


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Originalmente contaba de seis caras

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la administración de ketamina, señalar lo que es cierto:

Seleccione una:

- ☐ a. En el tratamiento del dolor postoperatorio está indicada por vía endovenosa y epidural
- ☐ b. Su mayor eficacia se obtiene con la administración en el postoperatorio
- ☒ c. Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál es la afirmación falsa sobre gabapentina y pregabalina:

Seleccione una:

- ☐ a. Las guías de la APS recomiendan su administración formando parte de una analgesia multimodal
- ☒ b. Se recomiendan especialmente en cirugía abdominal
- ☐ c. Las dosis recomendadas son de 600 a 1200 mg de gabapentina y de 150 a 300 mg de pregabalina
- ☐ d. Pueden administrarse tanto antes como después de la intervención


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomiendan especialmente en cirugía abdominal

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el tipo de interacción, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Se habla de "Sinergia" cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual
- ☐ b. Se habla de "Aditividad" cuando el efecto observado es igual a la suma de los efectos esperados.
- ☐ c. Se habla de "Antagonismo" cuando el efecto observado es inferior a la suma de los efectos esperados
- ☐ d. Las respuestas "a" y "b" son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se habla de "Sinergia" cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el método del isoblograma, señalar cuál es la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Los isobolos de las combinaciones que se sitúan por encima de la línea de aditividad muestran una interacción de tipo “antagonismo”
- ☒ b. Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas
- ☐ c. El isobolo teórico se representa mediante una línea recta
- ☐ d. Los isobolos de las combinaciones que se sitúan por debajo de la línea de aditividad muestran una interacción de tipo “sinergia”


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de los siguientes fármacos no está recomendado por vía epidural en el tratamiento del dolor postoperatorio:

Seleccione una:

- ☐ a. Bupivacaína
- ☐ b. Clonidina
- ☐ c. Fentanilo
- ☒ d. Ketamina


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ketamina

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre las interacciones farmacológicas, señalar la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son sinérgicas (F)
- ☐ b. El estudio de las interacciones es útil para mejorar los efectos terapéuticos de los fármacos utilizados de forma individual
- ☐ c. Muchas de las asociaciones que reciben los ancianos son potencialmente peligrosas
- ☐ d. Las interacciones pueden ser farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son sinérgicas (F)

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel cardiovascular, el DAP conlleva:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión
- ☐ b. Disminución de la demanda de oxígeno por parte del miocardio
- ☐ c. Bradicardia
- ☒ d. Arritmias


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arritmias

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor postoperatorio es un pilar fundamental en el plan de cuidados postoperatorios; señale la afirmación falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. El dolor postoperatorio genera una respuesta inflamatoria, inmune, neuroendocrina y metabólica que repercute en la recuperación del paciente
- ☐ b. Es recomendable formación continuada de todo el personal implicado en el tratamiento del dolor
- ☒ c. El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente
- ☐ d. Pese a las técnicas disponibles para control del dolor postoperatorio, su incidencia sigue siendo elevada


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de éstas pautas no es eficaz para prevenir el DCPQ?

Seleccione una:

- ☐ a. Facilitar apoyo en los aspectos emocionales del paciente
- ☐ b. Valorar el uso de analgesia regional en determinadas cirugías
- ☐ c. Valorar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas
- ☒ d. Realizar una reintervención quirúrgica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una reintervención quirúrgica

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la falsa con respecto a las consecuencias del DAP con respecto a la producción de secreciones y moco, a nivel respiratorio:

Seleccione una:

- ☐ a. Se inhibe la tos de manera voluntaria para evitar aumentar el dolor
- ☒ b. Existe un aumento de la actividad mucociliar
- ☐ c. Existe una tendencia a las atelectasias, neumonías y abscesos
- ☐ d. Se limita la movilización de secreciones


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existe un aumento de la actividad mucociliar

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes efectos no es consecuencia de la analgesia epidural, ¿cuál es?

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye la mortalidad postoperatoria
- ☒ b. Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal
- ☐ c. Acelera el tránsito intestinal
- ☐ d. Disminuye la neumonía postoperatoria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al dolor al movimiento, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

Seleccione una:

- ☒ a. Es el que mejor discrimina la efectividad analgésica
- ☐ b. Es máximo al 5º día postoperatorio
- ☐ c. No varía entre pacientes
- ☐ d. Tiene el mismo valor que el dolor en reposo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el que mejor discrimina la efectividad analgésica

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos factores descarta el diagnóstico de DCPQ?

Seleccione una:

- ☐ a. Suele asociarse a daño nervioso durante la cirugía
- ☒ b. Asocia una infección crónica postcirugía
- ☐ c. Tiene una duración mínima de 2 meses tras la cirugía
- ☐ d. El dolor aparece tiempo después de una intervención quirúrgica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asocia una infección crónica postcirugía

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al impacto de los protocolos en los resultados, ¿cuál es la afirmación falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. Existe controversia sobre el impacto en los resultados
- ☒ b. Por si solos, disminuyen notablemente el DAP
- ☐ c. Deben evaluarse sus resultados
- ☐ d. Son útiles, desde un punto de vista multidisciplinar


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por si solos, disminuyen notablemente el DAP

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes objetivos no pertenece a los programas de Fast - Track?

Seleccione una:

- ☐ a. Acelerar la recuperación del tránsito intestinal
- ☐ b. Disminuir la respuesta al estrés quirúrgico
- ☐ c. Disminuir las complicaciones postoperatorias
- ☒ d. Aumentar las indicaciones quirúrgicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentar las indicaciones quirúrgicas

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores determina la duración de la analgesia epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes
- ☐ b. Fiebre
- ☒ c. Inicio de la deambulación
- ☐ d. Nutrición Parenteral


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inicio de la deambulación

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de analgesia no estaría indicada en la laparoscopia?

Seleccione una:

- ☐ a. Bloqueo TAP (Plano Transverso Abdominal)
- ☐ b. Analgesia epidural en paciente con obesidad mórbida e Insuficiencia Respiratoria
- ☐ c. PCA intravenosa con morfina
- ☒ d. Analgesia epidural en paciente sano


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgesia epidural en paciente sano

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes combinaciones no sería una analgesia multimodal?

Seleccione una:

- ☐ a. AINE + Infiltración de la Herida quirúrgica
- ☐ b. PCAIV morfina + Bloqueo TAP
- ☐ c. Paracetamol + AINE
- ☒ d. Diclofenaco + metamizol


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diclofenaco + metamizol

Pregunta **40**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con relación al bloqueo peneano en pediatría es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Debe evitarse un agente vasoconstrictor a la mezcla anestésica.
- ☒ b. El bloqueo está contraindicado en población pediátrica.
- ☐ c. Es una técnica indicada en población pediátrica.
- ☐ d. El uso de volúmenes excesivos puede provocar necrosis peneana.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El bloqueo está contraindicado en población pediátrica.

Pregunta **41**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al paracetamol:

Seleccione una:

- ☐ a. La combinación con otro AINE es más inefectiva que el uso de cada fármaco.
- ☒ b. Es el analgésico de elección en población pediátrica.
- ☐ c. Es el analgésico más potente para el dolor intenso.
- ☐ d. La adición de codeína empeora su eficacia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el analgésico de elección en población pediátrica.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El analgésico de elección para el dolor leve y moderado en pacientes con enfermedad renal crónica es:

Seleccione una:

- ☒ a. Paracetamol.
- ☐ b. Ibuprofeno.
- ☐ c. Morfina.
- ☐ d. Asociación tramadol con dextetoprofeno.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paracetamol.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el estudio de E. Soler, ¿Cuál de los siguientes Servicios presentaba mayor intensidad e incidencia de dolor, tanto al abandonar la Unidad de Recuperación Postanestésica como durante el primer día?

Seleccione una:

- ☐ a. Cirugía General y Aparato Digestivo.
- ☒ b. Ginecología.
- ☐ c. Traumatología.
- ☐ d. Urología.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ginecología.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del dolor en movimiento

Seleccione una:

- ☐ a. Solo se ha de hacer en pacientes de Cirugía Mayor Ambulatoria
- ☐ b. Se ha de hacer en la sala de rehabilitación
- ☐ c. No es necesaria
- ☒ d. Se ha de hacer y registrar en todos los pacientes


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ha de hacer y registrar en todos los pacientes

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los efectos hematológicos ocasionados por los AINE:

Seleccione una:

- ☐ a. El ácido acetil salicílico debe suspenderse 15 días antes de la intervención quirúrgica.
- ☐ b. Son irreversibles y no ceden con la suspensión de la medicación.
- ☐ c. Afectan fundamentalmente al tiempo de protrombina.
- ☒ d. Suelen producirse por exceso de dosis.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suelen producirse por exceso de dosis.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el gold estandar para la analgesia postoperatoria tras toracotomía?:

Seleccione una:

- ☐ a. Bloqueo intercostal.
- ☐ b. PCA endovenosa con opiáceos.
- ☐ c. Analgesia intramuscular con opiáceos.
- ☒ d. Analgesia epidural torácica con opiáceos liposolubles y bajas concentraciones de anestésicos locales.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgesia epidural torácica con opiáceos liposolubles y bajas concentraciones de anestésicos locales.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los pacientes con insuficiencia hepática es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Si existen alteraciones de la coagulación el paracetamol y el metamizol son los analgésicos más adecuados.
- ☐ b. En la insuficiencia hepática grave y en la cirrosis hepática avanzada deben evitarse los opioides.
- ☐ c. En la insuficiencia hepática moderada se recomienda reducir en los posible la dosis y duración del tratamiento.
- ☒ d. No existe un acúmulo de metabolitos activos especialmente en el caso de la morfina.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe un acúmulo de metabolitos activos especialmente en el caso de la morfina.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los pacientes consumidores crónicos de opioides:

Seleccione una:

- ☐ a. Deben ser identificados preoperatoriamente e informados del riesgo potencial de agravamiento del dolor y del aumento de sus necesidades de opiáceos en el postoperatorio.
- ☐ b. Deben tomar sus dosis habituales el día de la cirugía sobre todo si toman opiáceos de larga duración para evitar síndromes de privación.
- ☐ c. Se les debe informar de que deben mantener sus parches transdérmicos de fentanilo el día de la cirugía.
- ☒ d. Todas son ciertas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué respuesta es falsa con respecto al tramadol?:

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene una décima parte de la potencia analgésica de la morfina.
- ☐ b. Tiene efecto analgésico por su acción en receptores mu e inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
- ☐ c. Es un opiáceo menor.
- ☒ d. Tiene alta incidencia de depresión respiratoria y alteraciones hemodinámicas graves.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene alta incidencia de depresión respiratoria y alteraciones hemodinámicas graves.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al bloqueo intercostal en el paciente pediátrico, es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. La extensión puede afectar a varios metámeros en una sola punción.
- ☐ b. Es efectivo para la analgesia postoperatoria tras cirugía tóraco-abdominal.
- ☒ c. Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria.
- ☐ d. Puede provocar insuficiencia respiratoria grave si se asocia a neumotórax.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son posibles consecuencias cardiovasculares del dolor todas las siguientes salvo:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de la frecuencia cardiaca.
- ☒ b. Disminución del riesgo de infarto de miocardio.
- ☐ c. Aumento de la presión sanguínea.
- ☐ d. Incremento en la demanda de oxígeno.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución del riesgo de infarto de miocardio.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes elementos es clave para los programas de Fast – Track ?

Seleccione una:

- ☐ a. Carbohidratos bebidos preoperatorios
- ☐ b. Inicio precoz de la deambulaci3n al 3º d3a postoperatorio
- ☐ c. 2 horas de ayuno preoperatorio
- ☒ d. Retirada precoz de sondas y drenajes


Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: Retirada precoz de sondas y drenajes

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores que hacen más difícil un control efectivo del dolor agudo postoperatorio en las personas de edad avanzada no se incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Respuesta alterada al dolor.
- ☒ b. El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada.
- ☐ c. Cambios con la edad en la fisiología, farmacodinamia y farmacocinética.
- ☐ d. Mayor incidencia de enfermedades coexistentes.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es uno de los efectos secundarios de los opioides:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides.
- ☐ b. Depresión respiratoria.
- ☐ c. Tolerancia.
- ☐ d. Nauseas, vómitos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para un satisfactorio control del dolor postoperatorio se debe tener presente todo lo siguiente, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Adecuar el tratamiento a las características del dolor (nociceptivo, neuropático y mixto).
- ☐ b. Iniciar el tratamiento del dolor valorando la intensidad del dolor según las diferentes escalas de valoración adecuada a cada paciente.
- ☒ c. Iniciar el tratamiento analgésico tardíamente y reevaluar el alivio del dolor después de administrar la analgesia pautada.
- ☐ d. Registrar de forma protocolizada y regular el alivio del dolor, los posibles efectos indeseables.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Iniciar el tratamiento analgésico tardíamente y reevaluar el alivio del dolor después de administrar la analgesia pautada.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No modifica la farmacocinética de los opioides:

Seleccione una:

- ☐ a. Edades extremas de la vida.
- ☒ b. Variaciones en la dosis.
- ☐ c. Acidosis respiratoria.
- ☐ d. Hipoproteinemia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Variaciones en la dosis.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué intervenciones se registra dolor controlado, a pesar de ser potencialmente muy dolorosas?

Seleccione una:

- ☒ a. Hepatectomía
- ☐ b. Artroscopia
- ☐ c. Histerectomía y Colectomía laparoscópica
- ☐ d. Cirugía de columna vertebral


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hepatectomía

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de satisfacción y confort?

Seleccione una:

- ☒ a. Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.
- ☐ b. Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.
- ☐ c. Porcentaje de eventos adversos graves por tipo de analgesia recibida.
- ☐ d. El tiempo medio de tratamiento necesario para conseguir el alivio del dolor.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué factor de riesgo del paciente apoyaría el uso de analgesia epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. Cardiopatía isquémica
- ☐ b. Coagulopatía
- ☐ c. Hepatopatía
- ☒ d. Insuficiencia respiratoria crónica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia respiratoria crónica

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes modelos de Unidad de Dolor Agudo es considerada de bajo coste?

Seleccione una:

- ☒ a. El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.
- ☐ b. Unidades de cuidados perioperatorios o Reanimaciones ampliadas.
- ☐ c. Unidades integrales de dolor.
- ☐ d. El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anesthesiologists


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de impacto del tratamiento del dolor agudo postoperatorio en los resultados?

Seleccione una:

- ☒ a. Porcentaje de prevalencia de dolor crónico postoperatorio.
- ☐ b. Porcentaje de eventos adversos graves por tipo de analgesia recibida.
- ☐ c. Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.
- ☐ d. Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Porcentaje de prevalencia de dolor crónico postoperatorio .

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de actividad o casuística?

Seleccione una:

- ☐ a. Porcentaje de pacientes que recibieron analgesia de rescate.
- ☒ b. Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.
- ☐ c. Número de pacientes con dolor moderado en reposo del total de pacientes registrados.
- ☐ d. Porcentaje de prevalencia de dolor crónico postoperatorio.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “la dificultad en las negociaciones para conseguir el cambio deseado y la adopción de acuerdos que permitan alcanzar los objetivos comunes”?

Seleccione una:

- ☒ a. Político.
- ☐ b. Educacional.
- ☐ c. Cultural.
- ☐ d. Estructural.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Político.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no pertenece al Mapa de Competencias de la Enfermera de UDA del Hospital Universitario Puerto Real?

Seleccione una:

- ☐ a. Conocer las vías de administración de analgésicos y sus rescates.
- ☐ b. Conocer el procedimiento aplicado a los cuidados necesarios para un catéter epidural, periférico y conocer los protocolos de retirada.
- ☒ c. Establecer el tratamiento del dolor postoperatorio de los pacientes.
- ☐ d. Comprobar y actualizar la Hoja de Recogida de Datos propia de la UDA y de Valoración Enfermera.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Establecer el tratamiento del dolor postoperatorio de los pacientes.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “las dificultades para la disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos que posibiliten la mejora del servicio.”?

Seleccione una:

- ☐ a. Emocional.
- ☐ b. Estructural.
- ☐ c. Educacional
- ☒ d. Físico/tecnológico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Físico/tecnológico.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar qué afirmación es falsa sobre la Analgesia Multimodal:

Seleccione una:


- ☒ a. Pretende acortar la estancia hospitalaria
- ☐ b. Pretende disminuir la incidencia y gravedad de los efectos secundarios
- ☐ c. Pretende obtener una analgesia eficaz
- ☐ d. Pretende disminuir la disfunción orgánica secundaria al estrés quirúrgico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pretende acortar la estancia hospitalaria

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la utilización de fármacos adyuvantes en la PCA, señalar cuál es la afirmación correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. La adición de ondansetrón a la morfina no disminuye la incidencia de náuseas y vómitos
- ☐ b. La adición de ketamina a morfina no presenta ninguna ventaja e incrementa los efectos secundarios
- ☐ c. La lidocaína a dosis de 10-20 mg por 1 mg de morfina disminuye la incidencia de náuseas y vómitos
- ☒ d. Droperidol disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en dosis de 0.017 a 0.17 mg por 1 mg de morfina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Droperidol disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en dosis de 0.017 a 0.17 mg por 1 mg de morfina

Pregunta 68

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con los bloqueos nerviosos periféricos, señalar qué afirmación es cierta

Seleccione una:

- ☐ a. La aparición de bloqueo motor intenso no es una limitación para su uso en cirugía ambulatoria
- ☐ b. Siempre que sea posible se han de utilizar técnicas continuas
- ☐ c. El riesgo de complicaciones neurológicas o de toxicidad por anestésicos locales es irrelevante para utilizar esta técnica
- ☒ d. Los bloqueos continuos con catéter en domicilio están contraindicados si el paciente no acepta la responsabilidad de su control


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los bloqueos continuos con catéter en domicilio están contraindicados si el paciente no acepta la responsabilidad de su control

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el abordaje del dolor

Seleccione una:

- ☐ a. La relación con la familia no es importante
- ☐ b. No es necesaria la formación continuada
- ☐ c. La terapia farmacológica es la única alternativa
- ☒ d. Todos los profesionales de la salud tienen su rol


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los profesionales de la salud tienen su rol

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un paciente no quiere analgésicos porque tiene miedo a la adicción

Seleccione una:

- ☐ a. Le preguntaremos que nos explique por que tiene esa creencia y daremos la información necesaria
- ☐ b. Si es necesario, llamaremos a la enfermera referente/clínica para dar un soporte a la información
- ☒ c. a y b son ciertas
- ☐ d. No le pondremos analgésicos y ya está.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

