

2019

Cuidados de práctica avanzada en urgencias y emergencias

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si tras las maniobras de estabilización inicial el niño tiene un llanto vigoroso, la frecuencia cardíaca es >100 lpm y tiene buen color, señalar la opción de actuación más adecuada:

Seleccione una:

- ☒ a. Cuidados de rutina
- ☐ b. Esperar para realizar el test de Apgar a los 5 minutos para entregarlo a la madre
- ☐ c. Darle durante unos minutos O₂ indirecto a baja concentración
- ☐ d. Aspirar de orofaringe y fosas nasales.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿El lugar de elección para realizar el masaje cardíaco en un recién nacido es?

Seleccione una:

- ☐ a. Tercio medio del esternón a nivel de la línea intermamilar
- ☐ b. Apéndice xifoides
- ☒ c. Tercio inferior del esternón entre el apéndice xifoides y línea imaginaria que une las dos mamilas.
- ☐ d. Tercio medio del esternón a nivel de la línea intermamilar

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Una mascarilla es de tamaño adecuado cuando cubre:

Seleccione una:

- ☒ a. Boca y nariz
- ☐ b. La boca
- ☐ c. Boca, nariz y parte interna de los ojos
- ☐ d. La nariz.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Tras la estabilización inicial, el recién nacido presenta apnea y frecuencia cardiaca de 80 lpm. Señala la opción más adecuada de actuación:

Seleccione una:

- ☒ a. Ventilar con presión positiva
- ☐ b. Administrar oxígeno indirecto a 15 l/min
- ☐ c. Estimular con golpes suaves en los talones
- ☐ d. Dar masaje cardiaco

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En el masaje cardiaco del recién nacido la relación compresión/ventilación es:

Seleccione una:

- ☒ a. Tres compresiones/una ventilación
- ☐ b. Cinco compresiones/una ventilación
- ☐ c. Una compresion/una ventilación
- ☐ d. Dos compresiones/cinco ventilaciones

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si un recién nacido tras 30 segundos de ventilación con presión positiva y masaje cardiaco presenta una frecuencia cardiaca de 80 lpm se debe:

Seleccione una:

- ☒ a. Suspender el masaje cardiaco y seguir ventilando
- ☐ b. Seguir masaje cardiaco hasta que la frecuencia cardiaca sea >100 lpm
- ☐ c. Administrar oxígeno libre
- ☐ d. Administrar una dosis de adrenalina

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En un RN con intubación endotraqueal, que en la auscultación presenta disminución del murmullo vesicular izquierdo y aumentado en el derecho. La situación más probable es:

Seleccione una:

- ☒ a. Intubación selectiva de pulmón derecho
- ☐ b. Neumotórax izquierdo
- ☐ c. Colocación del tubo en el esófago.
- ☐ d. Perforación de tráquea

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si un recién nacido a los 30 segundos de vida presenta una frecuencia cardiaca de 50 lpm se debe:

Seleccione una:

- ☐ a. Intubar, ventilar e iniciar masaje
- ☐ b. Administrar oxígeno libre
- ☐ c. Administrar adrenalina
- ☒ d. Ventilar con presión positiva

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida, la administración de naloxona:

Seleccione una:

- ☐ a. Está indicada en caso de drogadicción materna
- ☐ b. La vía de elección para su administración en el RN intubado es la endotraqueal
- ☒ c. Puede administrarse sin diluir a 0,25 mL/kg por vía intramuscular
- ☐ d. Si sospechamos depresión respiratoria por narcóticos administrados 4 horas antes del parto, en un recién nacido la primera medida a tomar es su administración subcutánea.

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa adrenalina:

Seleccione una:

- ☐ a. La primera dosis se utiliza al 1:1.000
- ☐ b. Siempre debe corregirse el pH sanguíneo para que haga efecto
- ☐ c. Se puede administrar una dosis por minuto durante 30 minutos.
- ☒ d. La dosis intravenosa y endotraqueal es distinta pero la dilución es la misma (1:10.000)

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las palas del laringoscopio recomendadas en la reanimación de un neonato a término son:

Seleccione una:

- ☐ a. Curvas y del nº «0»
- ☐ b. Rectas y del nº «2»
- ☒ c. Rectas y el nº 1
- ☐ d. Curvas del nº «00»

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para volver a valorar la frecuencia cardiaca del recién nacido después de iniciar el masaje cardiaco?

Seleccione una:

- ☐ a. 60 segundos
- ☐ b. 10 segundos
- ☐ c. 3 minutos
- ☒ d. 30 segundos

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para la reanimación neonatal es recomendable disponer de :

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter umbilical nº 5 y 8 FR
- ☐ b. Catéter umbilical nº 8 y 10 Fr
- ☒ c. Catéter umbilical nº3,5 y 5 Fr
- ☐ d. Catéter umbilical de 10 y 15 Fr

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa expansores de volumen:

Seleccione una:

- ☐ a. La vía de elección para su administración, mientras se canaliza la vena umbilical, es la vía oral.
- ☒ b. La dosis habitual es de 10 mL/kg en 5-10 minutos.
- ☐ c. Si se sospecha de anemia aguda se transfunde sangre del grupo 0 y Rh(+)
- ☐ d. Los más utilizados son los sueros glucosados.

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El tiempo máximo recomendable de un intento de intubación endotraqueal es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 segundos
- ☐ b. 90 segundos
- ☒ c. 30 segundos
- ☐ d. El necesario para conseguir la intubación

Pregunta 16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de estos factores consideras que es de riesgo intraparto?

Seleccione una:

- ☐ a. Oligoamnios
- ☐ b. Muerte fetal previa
- ☐ c. Actividad fetal disminuida
- ☒ d. Prolapso de cordón

Pregunta 17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si se utiliza guía o fiador en la intubación del recién nacido, hay que tener en cuenta lo siguiente, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario utilizarla en todas las intubaciones
- ☐ b. La punta de la guía debe quedar al menos 0,5 cm del final del TET
- ☒ c. Se precisan TET especiales
- ☐ d. Se debe tener especial cuidado al retirar la guía para evitar la extubación

Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Con respecto a la vía intraósea:

Seleccione una:

- ☒ a. El lugar de punción está localizado en la cara interna de la pierna (1-2 cm debajo de la meseta tibial)
- ☐ b. Es de uso frecuente en la reanimación del recién nacido en paritorio.
- ☐ c. Es la vía de elección para la administración de adrenalina
- ☐ d. No permite la administración de bicarbonato

Pregunta 19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si ventilamos a un recién nacido con bolsa y mascarilla debemos:

Seleccione una:

- ☒ a. Aplicar 30-60 insuflaciones por minuto
- ☐ b. Colocar la cabeza en hiperextensión forzada
- ☐ c. Usar mascarilla opaca que selle solo la boca del recién nacido
- ☐ d. Colocar un tubo de Guedel antes de comenzar

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Una bolsa autoinflable:

Seleccione una:

- ☐ a. Necesita estar conectada a una fuente de gas para funcionar
- ☐ b. Tiene una entrada única de oxígeno
- ☐ c. Tiene una entrada de aire y otra de oxígeno
- ☒ d. Tiene dos entradas una para el aire ambiente y otra para el flujo de oxígeno.

[Volver a: Módulo 2: Reani... ➔](#)