

Módulo 3: Soporte Vital Avanzado al paciente con Trauma grave

Evaluación final Módulo 3: Autoevaluación asignatura 5

Cuidados de práctica avanzada en urgencias y emergencias

Comenzado el martes, 10 de diciembre de 2019, 19:33

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 10 de diciembre de 2019, 19:48

Tiempo empleado 14 minutos 49 segundos

Puntos 16,00/20,00

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)


Comentario - Apto

Principio del formulario

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un signo diferencial del neumotórax a tensión con respecto a otras patologías del traumatismo torácico es:

Seleccione una:

- ☐ a. Silencio auscultatorio del lado afecto
- ☒ b. Timpanismo a la percusión en el lado afecto

- ☐ c. Compromiso hemodinámico y respiratorio intenso y agudo
- ☐ d. Ingurgitación yugular


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Timpanismo a la percusión en el lado afecto

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué entidades sospecharemos ante un paciente con ingurgitación yugular, herida abierta en vértice derecho y silencio auscultatorio en hemitorax derecho?:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemotórax masivo y/o neumotórax a tensión
- ☐ b. Volet costal y neumotórax a tensión
- ☒ c. Neumotórax abierto, neumotórax a tensión y/o hemotórax masivo
- ☐ d. Neumotórax abierto por herida en tórax


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neumotórax abierto, neumotórax a tensión y/o hemotórax masivo

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En que secuencia se valora un abdomen politraumatizado:

Seleccione una:

- ☐ a. Auscultar, percutir, palpar e inspeccionar
- ☐ b. Percutir, palpar y auscultar
- ☒ c. Inspeccionar, auscultar, palpar y percutir
- ☐ d. Inspeccionar, palpar, auscultar y percutir


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inspeccionar, auscultar, palpar y percutir

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera medida a tomar con un paciente empalado en el abdomen con un hierro largo y hemodinámicamente estable?

Seleccione una:

- ☐ a. Retirar el hierro si el paciente está lúcido y shock, previa analgesia.
- ☐ b. Retirar sólo si está a la altura del hígado o los riñones.

- ☒ c. Cortar objeto cercano a la superficie corporal y fijarlo.
- ☐ d. Retirar controlando las posibles pérdidas sanguíneas, previa analgesia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cortar objeto cercano a la superficie corporal y fijarlo.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para un paciente de 70 Kg debemos realizarle una intubación orotraqueal por tener un compromiso de la vía aérea ¿Qué fármacos utilizarías para atenderlo adecuadamente?

Seleccione una:

- ☐ a. Midazolam 7 mg y Vencuronio 7 mg
- ☐ b. Midazolam 14 mg y Fentanest 150 µg
- ☒ c. Fentanest 150 µg, Midazolam entre 14-24mg, anectine 70mg y posteriormente

Vencuronio 7mg.

- ☐ d. Fentanest 150 µg, Midazolam 15mg y Vencuronio 7mg para la IOT


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fentanest 150 µg, Midazolam entre 14-24mg, anectine 70mg y posteriormente Vencuronio 7mg.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes maniobras es prioritaria respecto al resto un paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- ☒ a. Colocar cánula orofaríngea
- ☐ b. Estabilizar fracturas.
- ☐ c. Detener hemorragias.
- ☐ d. Evaluar las pupilas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar cánula orofaríngea

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al shock hipovolémico, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Debe sospecharse ante toda paciente frío más taquicardia

- ☐ b. La frecuencia cardiaca elevada es un signo inespecífico y debe descartarse la existencia de dolor para aplicarla al shock
- ☒ c. Frecuencia mayor de 120 se consideran clase II que corresponde a una perdida del 30-40% del volumen sanguíneo
- ☐ d. Los signos precoces son difíciles de identificar y es necesario valorarlos en su conjunto


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia mayor de 120 se consideran clase II que corresponde a una perdida del 30-40% del volumen sanguíneo

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al TCE grave ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

Seleccione una:

- ☐ a. Los corticoides no deben emplearse en el manejo inicial
- ☒ b. La fluidoterapia se realiza con Suero Glucosado 5%
- ☐ c. En la Escala de Glasgow siempre se utiliza la mejor respuesta motora
- ☐ d. Debe considerarse que la lesión cerebral NO es la causante de hipotensión


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fluidoterapia se realiza con Suero Glucosado 5%

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la sospecha de neumotórax a tensión, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizaremos drenaje ante la sola sospecha clínica
- ☐ b. Si sospechamos neumotórax a tensión realizaremos radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico antes de realizar la punción
- ☒ c. Si sospechamos neumotórax a tensión oxigenaremos al paciente con mascarilla

reservorio a 15 litros hasta que estemos seguros

- ☐ d. Siempre realizaremos punción en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular por debajo de la segunda costilla.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos drenaje ante la sola sospecha clínica

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al manejo del TCE, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realizará IOT en Glasgow < 8 puntos
- ☒ b. Se administrará manitol 1g/Kg ante la sospecha de todo TCE, en la práctica un frasco de 250 ml al 20%
- ☐ c. La herniación cerebral o Hipertensión Intracerebral (HIC) cursa con el síndrome de cushing: HTA, bradicardia y alteración respiración.
- ☐ d. La alteración de la consciencia se atribuirá al TCE tras descartar hipoxia y shock


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se administrará manitol 1g/Kg ante la sospecha de todo TCE, en la práctica un frasco de 250 ml al 20%

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con traumatismo torácico en el que identificamos Ingurgitación yugular al colocarle un collarín cervical deberemos sospechar varias patologías que comprometan la vida de forma inmediata en la revisión inicial, menos una de las siguientes:

Seleccione una:

- ☐ a. Taponamiento Cardíaco
- ☐ b. Neumotórax a tensión
- ☒ c. Tórax inestable o volet costal
- ☐ d. Hemotórax masivo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tórax inestable o volet costal

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿La primera medida a tomar con un politraumatizado durante la valoración primaria práctica, que se ha precipitado desde la segunda planta de un edificio será?

Seleccione una:

- ☒ a. Apertura de la vía aérea y control cervical.
- ☐ b. Reanimar a la víctima puesto que posiblemente este en PCR
- ☐ c. Palpar pulso el carotídeo para diagnosticar una actividad eléctrica sin pulso
- ☐ d. Evaluar estado de conciencia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apertura de la vía aérea y control cervical.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes signos no indica la sospecha de una fractura de base de craneo:

Seleccione una:

- ☐ a. Signo de Battle o hematoma retro mastoideo
- ☒ b. Sangre en cavidad oral con piezas dentaria móviles
- ☐ c. Ojos de mapache o hematoma periauricular
- ☐ d. Otorrea o licuorrea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sangre en cavidad oral con piezas dentaria móviles

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la fractura de pelvis, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede perder hasta 3L de volumen circulante siendo su tratamiento definitivo quirúrgico
- ☐ b. Para inmovilizarlo se puede utilizar un body espinal al revés, una correa de inmovilización ajustada y principalmente un colchón de vacío.
- ☒ c. Su presencia debe hacernos sospechar que el paciente no utilizaba cinturón de seguridad
- ☐ d. Ante una pelvis rota se debe sospecha la existencia de lesión en órganos pélvicos (genitourinarios)


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su presencia debe hacernos sospechar que el paciente no utilizaba cinturón de seguridad

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la medida con paciente herido agredido por arma blanca que sufre evisceración abdominal y está hemodinámicamente estable?

Seleccione una:

- ☐ a. Recoloco las vísceras, si no están a tensión, previa analgesia.
- ☐ b. Recoloco las vísceras, sólo si hay shock y/o dolor.
- ☒ c. Cubro las vísceras con gasas o paños estériles y traslado urgente
- ☐ d. Reposición agresiva de líquidos por lesión abdominal


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cubro las vísceras con gasas o paños estériles y traslado urgente

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente agitado primero sospecharemos que es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoxia
- ☐ b. Shock hipovolémico
- ☐ c. TCE
- ☒ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipoxia

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Paciente que sufre una fractura abierta de miembros inferiores, con sangrado profuso, hipotensión, alteración del nivel de consciencia y estridor laríngeo: ¿Cuál es la prioridad?

Seleccione una:

- ☒ a. Estridor laríngeo.
- ☐ b. Fractura abierta
- ☐ c. Sangrado profuso e hipotensión.
- ☐ d. Alteración del nivel de consciencia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estridor laríngeo.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente con shock hipovolémico, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La reposición de líquidos se realizará agresivamente ante cualquier signo precoz de hipovolemia
- ☒ b. Administraremos sueroterapia agresiva a razón de 30ml/Kg
- ☐ c. La proporción será de 3 partes de cristaloides (Fisiológico o Ringer) por cada parte de sangre perdida, es decir, 300 ml de cristaloides por cada 100 ml de sangre perdida.
- ☐ d. La frecuencia cardiaca monitorizará la respuesta a la administración de líquido y su repercusión hemodinámica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La reposición de líquidos se realizará agresivamente ante cualquier signo precoz de hipovolemia

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Usted es el enfermero de un equipo de emergencias. Cuando valora el nivel de conciencia de un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico determina que abre los ojos al hablarle, está irritable y realiza una flexión anormal de decorticación. ¿Qué puntuación resulta en la escala de coma de Glasgow?:

Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 10
- ☒ c. 9
- ☐ d. 8


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00




Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente con respuesta verbal inapropiada que moviliza al dolor con retirada en flexión y abre los ojos a estímulos dolorosos, su puntuación en la escala de Glasgow será:

Seleccione una:

- ☐ a. 11
- ☒ b. 9
- ☐ c. 10

 d. 8

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8

Final del formulario

Finalizar revisión

©2019 CODEM Colegio Oficial de Enfermería de Madrid

[CODEM](#) | [Aviso legal](#) | [Seguridad](#) | [Cookies](#) | [Protección Datos Personales](#) | [Ayuda](#)