

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un accidentado con pérdida de la consciencia y ausencia de respiración

Seleccione una:

- a. 30 Ventilaciones en 5 minutos
- b. Colocación al accidentado en PLS, reevaluación hasta llegada del equipo de emergencias
- c. Llamada al 112 e inicio RCP
- d. Ninguna son correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Llamada al 112 e inicio RCP

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

De las afirmaciones que se exponen a continuación, señala la incorrecta

Seleccione una:

- a. El 112 es el número de emergencias utilizado en Europa
- b. Implica la activación del sistema integral de emergencias
- c. El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España
- d. El 112 es el gratuito

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las pautas generales de actuación (P-A-S), proteger tiene el objetivo de

Seleccione una:

- a. Evitar agravar las lesiones de los accidentados
- b. Ninguna son correctas
- c. Todas son correctas
- d. Reducir el riesgo de nuevos accidentes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actividad prioritaria del primer interviniente ante un accidente es

Seleccione una:

- a. Ninguna es correcta
- b. RCP
- c. Valoración secundaria
- d. Evaluación de la escena

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evaluación de la escena

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evaluación neurológica del paciente traumatizado puede realizarse mediante la escala de Glasgow. Ante un accidentado que presenta sonido incomprensibles, localiza el dolor cuando se le estimula y abre los ojos al realizarle estímulos dolorosos, tiene una puntuación de

Seleccione una:

- a. 15
- b. 9
- c. 13
- d. 10

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La palpación de pulso femoral nos permite determinar que el paciente tiene una PAS aproximada de

Seleccione una:

- a. 60 mmHg
- b. 80 mmHg
- c. 90 mmHg
- d. 70 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

La regla nemotécnica para valorar la consciencia de un accidentado se conoce como

Seleccione una:

- a. AVDN
- b. Ninguna es correcta
- c. OPUMA
- d. VOS

Retroalimentación

La respuesta correcta es: AVDN

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las ventilaciones en la RCPb, señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- a. Se administrará el volumen necesario que permita la elevación del tórax
- b. La no elevación del tórax durante la insuflación puede relacionarse a una apertura de la vía aérea incorrecta
- c. Todas son correctas
- d. La duración de la insuflación es de alrededor 1 segundo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta en relación a la RCP

Seleccione una:

- a. Los tiempos de compresión y expansión torácicas deberían ser aproximadamente iguales
- b. La equivalencia entre la RCP sólo con compresiones torácicas y la RCP estándar, es suficiente para cambiar la práctica actual.
- c. La RCP realizada a un paciente que respira puede provocarle daños irreversibles
- d. Se hace hincapié en minimizar las interrupciones en las compresiones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La equivalencia entre la RCP sólo con compresiones torácicas y la RCP estándar, es suficiente para cambiar la práctica actual.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta en relación al patrón respiratorio de Cheyne Stokes

Seleccione una:

- a. Se producen apneas de segundos de duración hasta repetir el ciclo
- b. Presente en pacientes con acidosis metabólica
- c. Se conoce como respiración en escalera
- d. Presenta períodos de respiración lenta que crecen de amplitud progresivamente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presente en pacientes con acidosis metabólica

