

MODULO 1.

Comenzado el	martes, 19 de septiembre de 2017, 10:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 19 de septiembre de 2017, 11:42
Tiempo empleado	46 minutos 11 segundos
Puntos	19,90/20,00
Calificación	9,95 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con qué término se corresponde la definición número de embarazos que presentarían 100 mujeres que utilizan un método anticonceptivo durante un año

Seleccione una:

- ☐ a. Prevalencia de embarazos
- ☐ b. Eficiencia.
- ☒ c. Índice de Pearl.
- ☐ d. Satisfacción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Índice de Pearl.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes se corresponde con un derecho fruto de la Declaración de los Derechos Sexuales promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual

Seleccione una:

- ☐ a. Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo sin ser necesario el respeto a los derechos de los demás
- ☒ b. Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.
- ☐ c. Derecho a información incomprensible.
- ☐ d. Derecho a la igualdad y a la discriminación por razones de raza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el orden de las fases de la oogenesis

Seleccione una:

- ☐ a. Crecimiento, maduración y multiplicación
- ☐ b. Multiplicación, maduración y crecimiento.
- ☐ c. Crecimiento, multiplicación y maduración.
- ☒ d. Multiplicación, crecimiento y maduración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Multiplicación, crecimiento y maduración.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la eficacia real de un método anticonceptivo

Seleccione una:

- ☐ a. La eficacia real es igual a la teórica en todos los métodos anticonceptivos.
- ☐ b. La eficacia que presenta un método anticonceptivo utilizado en condiciones óptimas.
- ☒ c. Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios.
- ☐ d. La eficacia real se mide en situaciones de laboratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es en la que se tienen en cuenta los posibles errores de los usuarios.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es función de las células sertoli

Seleccione una:

- ☐ a. Secretan inhibina
- ☐ b. Controlar los movimientos de las células espermatogénicas.
- ☒ c. Fagocitación de los espermatozoides.
- ☐ d. Secretan el líquido de transporte para los espermatozoides.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fagocitación de los espermatozoides.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las fases del ciclo menstrual a nivel de los ovaries

Seleccione una:

- ☐ a. Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora.
- ☐ b. Fase luteínica y fase menstrual.
- ☐ c. No existen fases a nivel de los ovarios, solo se a nivel del endometrio.
- ☒ d. Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las glándulas sexuales accesorias del aparato reproductor masculine

Seleccione una:

- ☒ a. Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper.
- ☐ b. Dos vesículas seminales, epidídimo, próstata.
- ☐ c. Vesícula seminal, próstata, conducto deferente
- ☐ d. Glándula prostática, dos vesículas seminales, gónadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dos vesículas seminales, próstata, glándulas de Cowper.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dónde se encuentras las glándulas de Bartholino

Seleccione una:

- ☐ a. En el orificio uretral del varón.
- ☐ b. En el orificio uretral de la mujer.
- ☐ c. En el epidídimo.
- ☒ d. A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los beneficios contraceptivos y no contraceptivos de los métodos anticonceptivos, señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Ningún método previene enfermedades de transmisión sexual
- ☐ b. Las tasas de mortalidad en lactantes menores de un año aumentar debido a los intervalos intergenésicos amplios.
- ☒ c. Evitan embarazos no deseados.
- ☐ d. Promueven el número de interrupciones voluntarias de embarazo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitan embarazos no deseados.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué año se publica la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Seleccione una:

- ☐ a. 2013
- ☒ b. 2011
- ☐ c. 2010
- ☐ d. 2012

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2011

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La planificación familiar

Seleccione una:

- ☐ a. Se fundamenta en prácticas que ayudan a individuos o parejas a alcanzar determinados objetivos como pueden ser evitar nacimientos no deseados o regular los intervalos entre los embarazos.
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas
- ☐ c. Actualmente la definición de planificación familiar queda integrada en el concepto de salud sexual y reproductiva.
- ☐ d. Un Comité de Expertos de la OMS definió el término planificación familiar por primera vez en el año 1970.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es la capacitación espermática

Seleccione una:

- ☐ a. Produce una reconfiguración celular
- ☒ b. Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino.
- ☐ c. Es el proceso de liberación del espermatozoide de las células sertoli.
- ☐ d. Es el primer proceso que sufre el espermatozoide, ocurre previo a la eyaculación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el último proceso que sufre el espermatozoide, ocurre tras la eyaculación, en el tracto genital femenino.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué incluye la sexualidad

Seleccione una:

- ☐ a. Vinculación afectiva.
- ☐ b. Género
- ☐ c. Identidad sexual.
- ☒ d. La sexualidad abarca todo lo anterior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sexualidad abarca todo lo anterior

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué temas no se deben abordar durante el consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☐ a. Variedad de métodos disponibles.
- ☒ b. Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo
- ☐ c. Ventajas y desventajas de cada método.
- ☐ d. Como usar el método elegido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de métodos anticonceptivos promueven el desarrollo de una sexualidad más libre, plena, satisfactoria y segura al no asociarse obligatoriamente relación sexual a reproducción.
- ☐ b. Algunos anticonceptivos ayudan a la prevención de VIH/SIDA disminuyéndose así el contagio entre parejas serodiscordantes
- ☐ c. El uso de anticoncepción promueve la libre elección de maternidad/paternidad.
- ☒ d. El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo

prácticamente nulo a partir del cuarto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta respecto a la definición de Salud Sexual propuesta por la Asociación Mundial para la Salud Sexual

Seleccione una:

- ☐ a. Incluye la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras
- ☐ b. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social.
- ☒ c. Para lograr y mantener la salud sexual no es necesario respetar y proteger los derechos sexuales de todas las personas.
- ☐ d. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para lograr y mantener la salud sexual no es necesario respetar y proteger los derechos sexuales de todas las personas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en referencia al consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 2 y 3 son correctas
- ☐ b. Opción 1: Es una herramienta, internet, mediante el cual los usuarios toman sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar.
- ☐ c. Opción 2: Es una herramienta mediante la cual el clínico ayuda a los usuarios a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar
- ☐ d. Opción 3: Debe ser un diálogo entre el clínico y el usuario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 2 y 3 son correctas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta respecto a los pasos durante el consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☒ a. Generalmente consta de 6 pasos.
- ☐ b. Todas son falsas
- ☐ c. El consejo anticonceptivo es un proceso, que costa de 6 pasos, y debe ser rígido para poder profundizar en la vida personal del usuario.
- ☐ d. Uno de los pasos es atender al usuario, prestándole atención solo en aquellos aspectos que sean de relevancia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Generalmente consta de 6 pasos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación con las fases del ciclo menstrual a nivel del endometrio

Seleccione una:

- ☒ a. La fase menstrual surge como consecuencia de la disminución de la secreción hormonal ovárica.
- ☐ b. La fase proliferativa coincide con la fase luteínica del ovario.
- ☐ c. Son dos fases: proliferativa y secretora
- ☐ d. La fase secretora coincide con la fase folicular del ovario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fase menstrual surge como consecuencia de la disminución de la secreción hormonal ovárica.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según las últimas publicaciones, Cuál es el método anticonceptivo con el índice de Pearl más bajo y por tanto el método más eficaz

Seleccione una:

- ☐ a. Essure.
- ☒ b. Implante subdérmico.
- ☐ c. Esterilización tubárica.
- ☐ d. DIU medicado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Implante subdérmico.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

MODULO II

Comenzado el	martes, 10 de octubre de 2017, 18:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 10 de octubre de 2017, 19:02
Tiempo empleado	40 minutos 47 segundos
Puntos	19,60/20,00
Calificación	9,80 de 10,00 (98%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo define la anticoncepción natural la Organización Mundial de la Salud

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones a y c son correctas.
- ☐ b. Opción c: Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase fértil del ciclo.
- ☐ c. Opción b: Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase infértil del ciclo.
- ☐ d. Opción a: Es la técnica para evitar el embarazo o planificar su instauración a través de la observación de los síntomas y signos que se producen de forma natural en las fases fértil y estéril del ciclo menstrual.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo podemos encontrarnos el cérvix al hacernos una palpación en la fase preovulatoria

Seleccione una:

- ☒ a. Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado.
- ☐ b. Duro, bajo, inclinado y abierto
- ☐ c. Cérvix blando, alto, en eje con la vagina y abierto.
- ☐ d. Blando, bajo, cerrado e inclinado.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es un efecto adverso mayor que puede suceder al tomar anticonceptivos hormonales combinados

Seleccione una:

- ☒ a. Tromboembolismo venoso.
- ☐ b. Depresión.
- ☐ c. Spotting
- ☐ d. Colelitiasis

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el nivel de evidencia del control de la tensión arterial previa a la utilización de métodos anticonceptivos hormonales

Seleccione una:

- ☒ a. Nivel de evidencia A
- ☐ b. Nivel de evidencia B
- ☐ c. Nivel de evidencia D
- ☐ d. Nivel de evidencia C

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el pilar en el que se asienta la recomendación de anticoncepción

Seleccione una:

- ☐ a. Citología
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☒ c. La historia clínica.
- ☐ d. Analítica previa.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los tres requisitos para que el método lactancia amenorrea alcance el 98% de eficacia

Seleccione una:

- ☒ a. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebé menor de 6 meses.
- ☐ b. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 6 meses.
- ☐ c. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebe menor de 9 meses.
- ☐ d. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 9 meses

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes es una contraindicación del DIU

Seleccione una:

- ☐ a. Cáncer de cérvix

- ☒ b. Todas las anteriores
- ☐ c. Enfermedad pélvica inflamatoria actual.
- ☐ d. Cervicitis purulenta o infección actual de clamidia o gonorrea.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el uso del diafragma, Cómo se debe aplicar el espermicida

Seleccione una:

- ☐ a. Opción b: Es necesario repetir la aplicación de espermicida con cada relación sexual, independientemente del tiempo que haya transcurrido tras la última relación sexual.
- ☐ b. Opción a: Con el diafragma siempre debe emplearse espermicida
- ☐ c. Opción c: Con el diafragma no es necesario el uso de espermicidas.
- ☒ d. Son correctas las opciones a y b.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El preservativo masculino previene la transmisión de ITS

Seleccione una:

- ☒ a. Sí, pero solo si se utiliza en todas las relaciones, durante todo el acto sexual.
- ☐ b. No.

- ☐ c. Sí, solo si se coloca al final de la relación sexual
- ☐ d. Sí, siempre.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al parche transdérmico

Seleccione una:

- ☒ a. Se absorbe a través de la piel.
- ☐ b. Se debe poner uno nuevo cada tres semanas.
- ☐ c. Garantiza 5 días adicionales de protección frente al olvido
- ☐ d. Existen 3 zonas en las que se puede colocar el parche: nalgas, parte superior externa del brazo y el abdomen.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué situaciones se debe contraindicar el uso de anticonceptivos hormonales orales combinados según la OMS

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Mujeres puérperas (de menos de 21 d
- ☐ c. Mujeres diabéticas cuya enfermedad tenga más de 20 a



d. Mujer que esté con lactancia materna exclusiva y el recién nacido tenga menos de 6 semanas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mujer de 27 años de edad, nulípara, que ha observado su ciclo menstrual durante 12 meses. Si ciclo más largo ha durado 33 días y el más corto han sido 28. Aplicando el método del calendario, Cuándo no debería mantener relaciones sexuales con penetración y eyaculación intravaginal

Seleccione una:



a. Entre los días 11 y 20.



b. Entre los días 11 y 21.



c. Entre los días 10 y 22.



d. Entre los días 10 y 21

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué no se debe preguntar en la anamnesis

Seleccione una:



a. Se debe preguntar por todo lo anterior



b. Antecedentes obstétricos y ginecológicos.



c. Hábitos tóxicos.

☐ d. Debemos preguntar por las preferencias en cuanto al tipo de anticoncepción.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de lubricante NO se debe usar junto con el preservativo

Seleccione una:

- ☐ a. Agua
- ☒ b. Lubricantes de base oleosa
- ☐ c. Lubricantes de base acuosa.
- ☐ d. Lubricación vaginal natural.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la efectividad del capuchón cervical, es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. En mujeres que no han tenido hijos el IP real es de 16.
- ☐ b. Es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos.
- ☐ c. Su efectividad se ve reducida en mujeres que han tenido hijos
- ☒ d. Todas son verdaderas

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al anillo vaginal

Seleccione una:

- ☐ a. Se introduce en la vagina donde debe cambiarse cada semana.
- ☐ b. Se introduce en la vagina donde puede permanecer hasta 5 semanas manteniendo su eficacia
- ☒ c. Se introduce en la vagina donde debe permanecer durante 3 semanas.
- ☐ d. El anillo es de látex.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. El óvulo pierde su potencial de ser fecundado a las 24 horas tras la ovulación.
- ☒ b. La mujer siempre ovula una vez por ciclo menstrual.
- ☐ c. La temperatura se eleva durante la ovulación
- ☐ d. Los espermatozoides mantiene su capacidad fecundante al menos 24 horas en el tracto genital femenino.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale en que mujeres estaría contraindicado la anticoncepción de emergencia

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres mayores de 35 años
- ☐ b. Mujeres que estén con lactancia materna
- ☒ c. Es segura para cualquier mujer, incluso para en las que las hormonas están contraindicadas, ya que es un método de uso puntual
- ☐ d. Mujeres con enfermedad hepática grave

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta respecto a los anticonceptivos hormonales de solo gestágeno

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden usarse durante la lactancia.
- ☒ b. Todas las anteriores son ciertas
- ☐ c. Pueden usarlo las mujeres en las que los estrógenos están contraindicados.
- ☐ d. No regulan el ciclo menstrual.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción FALSA en relación al essure

Seleccione una:

- ☐ a. El IP teórico y real del essure es de 0,5
- ☐ b. Anticoncepción irreversible.
- ☐ c. No requiere intervención quirúrgica ni ingreso.
- ☒ d. Efectivo inmediatamente tras la intervención.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

MODULO III

Comenzado el	martes, 10 de octubre de 2017, 21:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 10 de octubre de 2017, 22:31
Tiempo empleado	49 minutos 13 segundos
Puntos	19,70/20,00
Calificación	9,85 de 10,00 (99%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es el método ideal para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en el adolescente

Seleccione una:

- ☐ a. Anticoncepción hormonal sola
- ☒ b. Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal
- ☐ c. Marcha atrás
- ☐ d. Preservativo solo

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta en una mujer mayor de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. Los posibles riesgos ante un embarazo.
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. La sintomatología en la perimenopausia.

☐ d. La fertilidad y las necesidades anticonceptivas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo puede iniciar la anticoncepción con DIU con levonorgestrel una madre que está dando lactancia maternal

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 48 horas.
- ☐ b. Entre las 48 horas y las 4 semanas posparto es el momento más propicio.
- ☒ c. A partir de la cuarta semana.
- ☐ d. Está contraindicado el uso de DIU con levonorgestrel en una madre lactante

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuánto tiempo debe esperar una mujer que da lactancia materna para poder usar anticonceptivos compuestos por estrógenos y progestágenos

Seleccione una:

- ☐ a. Estas mujeres no pueden usar este tipo de anticonceptivos
- ☐ b. No se establece ningún periodo de espera.
- ☒ c. 6 meses.
- ☐ d. 6 semanas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo fundamental de la educación sexual en el adolescente es

Seleccione una:

- ☐ a. Fomentar la experimentación sexual si medidas de protección.
- ☐ b. Fomentar la intolerancia hacia toda relación distinta a la heterosexual.
- ☐ c. Todas son correctas
- ☒ d. Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los metodos hormonales combinados en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. Opción B: Aunque no existen estudios que diferencien el índice de Pearl por grupos de edad, se cree que la eficacia de este tipo de anticoncepción es menor en mujeres perimenopáusicas.
- ☐ b. Opción C: No existen estudios que indiquen que vía de administración es mejor para esta franja de edad.
- ☐ c. Opción A: : La vía de administración más común es la oral.
- ☒ d. La opción A y C son correctas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 0,80 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al cese de anticonceptivos en las mujeres mayores de 50 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Si la usuaria consume anticonceptivos hormonales combinados o el inyectable compuesto solo por gestágenos, se recomienda su cese a los 50 años.
- ☐ b. Las respuestas A y C son correctas
- ☒ c. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer debe de menstruar y lleve un año de amenorrea si tiene más de 50 años.
- ☐ d. De manera general, se recomienda usar anticoncepción hasta que la mujer deje de menstruar y lleve dos años de amenorrea si tiene más de 50 años.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,80/1,00**.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 0,90 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia a la anticoncepción en mujeres mayores de 40 años, señale la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Los anticonceptivos de barrera no interfieren en la sintomatología propia de la perimenopausia
- ☒ b. Los métodos más utilizados en esta etapa son los de barrera.
- ☐ c. El método más utilizado en esta etapa es el coitus interruptus.
- ☐ d. Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad son los más aconsejados para esta etapa.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **9**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conducta sexual del adolescente, por cuál de los siguientes factores está influenciada
Seleccione una:

- ☐ a. La discrepancia entre la madurez física y cognoscitiva
- ☐ b. La percepción de invulnerabilidad
- ☐ c. La necesidad de dejar atrás su identidad de niño
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué aspecto debería tener el anticonceptivo ideal? Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. No debe estar relacionado con el coito

- ☒ b. No debe mejorar los síntomas propios de la menopausia.
- ☐ c. Debe tener elevada eficacia anticonceptiva.
- ☐ d. Debe carecer de efectos no deseados.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué métodos no se aconsejan iniciar en el posparto inmediato por la irregularidad de los ciclos menstruales

Seleccione una:

- ☐ a. El diafragma.
- ☐ b. El capuchón cervical
- ☒ c. Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.
- ☐ d. Los preservativos.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe cumplir un anticonceptivo en una mujer que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☒ a. A y C son correctas
- ☐ b. Debe mantener su eficacia anticonceptiva.
- ☐ c. Puede tener algún efecto secundario en el recién nacido, pero debe ser leve.
- ☐ d. No debe alterar la cantidad ni la calidad de la leche materna.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debes cumplir la anticoncepción en la adolescencia

Seleccione una:

- ☐ a. Debe ser un método eficaz en la prevención de embarazos.
- ☐ b. Debe ser un método seguro, es decir, que no represente un perjuicio para su salud
- ☒ c. Todas las anteriores



d. Debe ser reversible, el adolescente debe recuperar su fertilidad al suspender su uso.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que beneficios no anticonceptivos presenta la anticoncepción hormonal para el adolescente

Seleccione una:



a. Todas las anteriores



b. Disminuye la dismenorrea.



c. Mejora del acné y del hirsutismo.



d. Mejor control del ciclo.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la anticoncepción hormonal compuesta solo de gestágenos y a su uso en mujeres mayores de 40 años, señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.
- ☐ b. Este tipo de anticoncepción se puede utilizar en mujeres con riesgo cardiovascular.
- ☐ c. El DIU de levonorgestrel se puede usar para evitar cirugía mayor en mujeres con sangrados excesivos
- ☐ d. El DIU de levonorgestrel está indicado en aquellos casos en los que la mujer presenta disfunciones menstruales.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Se han descrito casos de ovulación desde el día 25 tras el parto.
- ☐ c. La primera ovulación tras el parto se suele producir entre los 45 y 94 días.
- ☐ d. En la mayoría de las mujeres reaparece la menstruación entre los 45 y 64 días tras el parto.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en cuanto al uso de anticoncepción en mujeres mayores de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. Si la menopausia se produce después de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras dos años de sangrado
- ☐ b. La eficacia de los DIU inertes disminuye a partir de los 40 años por el aumento del riesgo de expulsión.
- ☐ c. Si la menopausia se produce antes de los 50 años, el dispositivo debe retirarse tras un año de sangrado.
- ☒ d. Una mujer que decide utilizar un DIU inerte a partir de los 40 años no es necesario que se lo retire hasta la menopausia.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta en cuanto al uso de la píldora postcoital por una mujer que está dando lactancia materna

Seleccione una:

- ☐ a. No lo puede usar.
- ☐ b. Es el método anticonceptivo de elección.
- ☒ c. La Organización Mundial de la Salud la clasifica en categoría 1.
- ☐ d. La Organización Mundial de la salud la clasifica en categoría 2

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Los DIU-CU se pueden insertar en las primeras 48 horas tras el parto sin importar el tipo de alimentación del recién nacido.
- ☐ b. Los espermicidas se pueden usar en cualquier momento tras el parto.
- ☒ c. Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia materna
- ☐ d. La ligadura de trompas se puede realizar a partir del séptimo día tras el parto.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS entre que años está delimitada la PREADOLESCENCIA

Seleccione una:

- ☒ a. De 10 a 14 años
- ☐ b. De 18 a 22 años
- ☐ c. De 25 a 30 años
- ☐ d. De 7 a 9 años

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

MODULO IV

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2017, 20:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2017, 20:42
Tiempo empleado	7 minutos 56 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué categoría clasifica la OMS a los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad

Seleccione una:

- ☐ a. Categoría 4
- ☐ b. Categoría 3
- ☒ c. Categoría 1
- ☐ d. Categoría 2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Categoría 1

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con cáncer de cérvix el uso del DIU de cobre en qué categoría se clasifica según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2

☒ c. 4

☐ d. 3

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con una enfermedad grave del hígado, cual de los siguientes anticonceptivos se recomendaría en primer lugar

Seleccione una:

☐ a. Parche transdérmico.

☒ b. DIU de Cobre

☐ c. Anticoncepción hormonal oral de solo progestágenos.

☐ d. Anillo vaginal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: DIU de Cobre

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una Mujer mayor de 35 años, fumadora de más de 15 cigarros al día, cual de los siguientes métodos anticonceptivos NO estaría indicado

Seleccione una:

- ☐ a. Anticoncepción de solo progesterona
- ☐ b. DIU de cobre
- ☐ c. Preservativo
- ☒ d. Anticoncepción hormonal combinada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticoncepción hormonal combinada.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer nulípara, el uso de cualquier tipo de DIU en que categoría de recomendación se incluiría según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 3



c. 2



d. 1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer que padece migrañas con aura, cual de los siguientes anticonceptivos estaría contraindicado su uso

Seleccione una:



a. DIU de Levonogestrel



b. Anillo vaginal



c. DIU de cobre



d. Implante subcutáneo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anillo vaginal

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique en categoría 1 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ b. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ c. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento
- ☐ d. Se contraindica por completo su uso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 2 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento
- ☐ b. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ c. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ d. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 3 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ b. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ c. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento
- ☐ d. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 4 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☐ a. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ b. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento
- ☐ c. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☒ d. Se contraindica por completo su uso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se contraindica por completo su uso.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

MODULO V

Comenzado el miércoles, 22 de noviembre de 2017, 20:43

Estado Finalizado


Finalizado en miércoles, 22 de noviembre de 2017, 21:22

Tiempo empleado	38 minutos 48 segundos
Puntos	19,40/20,00
Calificación	9,70 de 10,00 (97%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Contraindicaciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación

Seleccione una:

- ☐ a. Patología tumorales del útero
- ☐ b. Conización del cérvix
- ☒ c. Todas las anteriores
- ☐ d. Alteraciones anatómicas del útero.

Retroalimentación


Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes es una complicación mayor de una interrupción del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. Desgarro cervical
- ☐ b. Perforación uterina no complicada
- ☒ c. Enfermedad Inflamatoria pélvica
- ☐ d. Adherencias cérvico-uterinas

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

cuál de los siguientes supuestos el aborto queda despenalizado según la Ley orgánica 9/1985 de reforma del aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas (hasta la semana 22 de gestación).
- ☐ b. Que exista un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin límite de tiempo en la gestación.
- ☐ c. Que el embarazo sea como consecuencia de un delito de violación, hasta las 12 semanas de gestación y debe existir denuncia.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el método farmacológico más ampliamente utilizado en todo el mundo para la interrupción del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. Metrotrexate + misoprostol
- ☐ b. Mifepristona + misoprostol
- ☐ c. Estrógenos
- ☒ d. Misoprostol solo

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál se considera el texto más antiguo en el que se habla de aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Papiro de Ebers.

- ☐ b. Antiguo testamento.
- ☒ c. Código Hammurabi.
- ☐ d. Nuevo testament

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo delimita la Organización Mundial de la Salud la viabilidad del embrión

Seleccione una:

- ☐ a. Todas falsas.
- ☒ b. Todas correctas
- ☐ c. Embrión o feto cuyo peso sea igual o menor a 500 gramos.
- ☐ d. Gestación inferior a 20 semanas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de los siguientes es un método para realizar una interrupción del embarazo

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores son correctas
- ☐ b. Métodos farmacológicos
- ☐ c. Métodos quirúrgicos
- ☐ d. Métodos instrumentales

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es el método farmacológico más cómodo para la mujer en la interrupción del embarazo en el primer trimestre

Seleccione una:

- ☐ a. Metrotrexate + misoprostol
- ☐ b. Misoprostol solo
- ☐ c. Oxitocina



d. Mifepristona + misoprostol

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son las complicaciones más frecuentes de un aborto

Seleccione una:



a. Opción a: Hemorragia



b. Las opciones a y c son correctas



c. Opción b: Esterilidad



d. Opción c: Infecciones

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de interrupción farmacológica de las gestación nos referimos a

Seleccione una:

- ☐ a. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea.
- ☐ b. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino.
- ☒ c. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino.
- ☐ d. Todos los anteriores son correctos

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 0,80 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de métodos instrumentales en la realización de un IVE nos referimos a

Seleccione una:

- ☐ a. Los que se llevan a cabo a través de la pared abdominal mediante incisión quirúrgica, como son la histerotomía o microcesárea.
- ☒ b. La utilización de distintos instrumentos aplicados a través de la vagina y cuello uterino para provocar la evacuación del contenido uterino.
- ☐ c. Todos los anteriores son correctos



d. La administración de fármacos por diferentes vías (intravenosa, oral, vaginal etc.) para provocar contracciones uterinas, dilatación cervical y como consecuencia de esto conseguir la expulsión del contenido uterino.

Retroalimentación


Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,80/1,00**.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 0,60 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El límite para la viabilidad de un feto o embrión que establece la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) es la misma que la que establece la Organización Mundial de la Salud

Seleccione una:



a. La SEGO establece como límite la semana 22.



b. La SEGO establece como límite la semana 25



c. La SEGO establece como límite la semana 24



d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,60/1,00**.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la interrupción farmacológica del embarazo del segundo trimestre, cuál de las siguientes es la dosis correcta de Misoprostol solo

Seleccione una:

- ☐ a. 800
- ☐ b. 600
- ☒ c. Todas las anteriores son correctas
- ☐ d. 400

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hasta que edad gestacional se podría practicar un aborto si existe riesgo para la salud de la embarazada, según la ley orgánica 2/2010 de SSR y de la interrupción voluntaria del embarazo

Seleccione una:

- ☐ a. 14
- ☐ b. 10

☒ c. 22

☐ d. 5

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La elección del método para la realización de la interrupción del embarazo se basa en

Seleccione una:

☐ a. Características del embarazo

☐ b. Las semanas de gestación

☐ c. Características de la mujer

☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Precauciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación

Seleccione una:

- ☒ a. Precaución en el segundo trimestres si existe una cirugía previa uterina.
- ☐ b. Conización del cérvix.
- ☐ c. Edad mayor de 35 años
- ☐ d. Existencia de IVE previo

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué complicaciones menores puedes aparecer tras la realización de un aborto

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Reintervención no urgente
- ☐ c. Adherencias cérvico-uterinas.
- ☐ d. Perforación uterina no complicada.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se entiende por ley de supuestos

Seleccione una:

- ☒ a. Leyes que consideran que el aborto provocado es un delito, salvo en algunos supuestos recogidos en la Ley en los que estaría despenalizado.
- ☐ b. las cuales se rigen por el principio de que el aborto es un delito, y el Estado debe garantizar la libertad de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva
- ☐ c. Leyes que consideran que el aborto provocado es un derecho de la mujer, salvo en algunos supuestos recogidos en la Ley en los que estaría despenalizado.
- ☐ d. Leyes las cuales se rigen por el principio de que el aborto es un derecho de la mujer, y el Estado debe garantizar la libertad de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta

Seleccione una:

- ☒ a. La respuesta A y C son correctas
- ☐ b. Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística el grupo de edad que más frecuentemente se somete a IVE son las mujeres de 20 a 24 años.
- ☐ c. La interrupción voluntaria de embarazo (IVE) se define como la terminación de la gestación sin esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto o aborto.
- ☐ d. Las técnicas que se utilizan para la práctica del IVE siempre son las mismas.

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la ley orgánica 2/2010 de SSR y de la interrupción voluntaria del embarazo, hasta que edad gestacional una mujer puede abortar libremente

Seleccione una:

- ☐ a. 28
- ☐ b. 30
- ☒ c. 14
- ☐ d. 10

Retroalimentación

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Comenzado el miércoles, 22 de noviembre de 2017, 21:26

EXAMEN FINAL

Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2017, 21:33
Tiempo empleado	6 minutos 57 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo podemos encontrarnos el cérvix al hacernos una palpación en la fase preovulatoria

Seleccione una:

- ☒ a. Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado.
- ☐ b. Cérvix blando, alto, en eje con la vagina y abierto.
- ☐ c. Blando, bajo, cerrado e inclinado.
- ☐ d. Duro, bajo, inclinado y abierto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Contraindicaciones para la realización de interrupciones instrumentales de la gestación

Seleccione una:

- ☐ a. Alteraciones anatómicas del útero.
- ☐ b. Conización del cérvix
- ☐ c. Patología tumorales del útero
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **3**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es el método ideal para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en el adolescente

Seleccione una:

- ☐ a. Preservativo solo
- ☐ b. Anticoncepción hormonal sola
- ☐ c. Marcha atrás
- ☒ d. Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combinación de preservativo y anticoncepción hormonal (DOBLE M

Pregunta **4**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

cuál de los siguientes supuestos el aborto queda despenalizado según la Ley orgánica 9/1985 de reforma del aborto

Seleccione una:

- ☐ a. Que exista un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin límite de tiempo en la gestación.
- ☐ b. Que el embarazo sea como consecuencia de un delito de violación, hasta las 12 semanas de gestación y debe existir denuncia.
- ☐ c. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas (hasta la semana 22 de gestación).
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **5**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el orden de las fases de la oogenesis

Seleccione una:

- ☒ a. Multiplicación, crecimiento y maduración.
- ☐ b. Crecimiento, multiplicación y maduración.
- ☐ c. Multiplicación, maduración y crecimiento.
- ☐ d. Crecimiento, maduración y multiplicación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Multiplicación, crecimiento y maduración.

Pregunta **6**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es función de las células sertoli

Seleccione una:

- ☒ a. Fagocitación de los espermatozoides.
- ☐ b. Controlar los movimientos de las células espermatogénicas.
- ☐ c. Secretan el líquido de transporte para los espermatozoides.
- ☐ d. Secretan inhibina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fagocitación de los espermatozoides.

Pregunta **7**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las fases del ciclo menstrual a nivel de los ovaries

Seleccione una:

- ☐ a. Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora.
- ☐ b. No existen fases a nivel de los ovarios, solo se a nivel del endometrio.
- ☐ c. Fase luteínica y fase menstrual.
- ☒ d. Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase folicular, ovulación y fase luteínica

Pregunta **8**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta en una mujer mayor de 40 años

Seleccione una:

- ☐ a. La fertilidad y las necesidades anticonceptivas.
- ☐ b. Los posibles riesgos ante un embarazo.
- ☐ c. La sintomatología en la perimenopausia.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **9**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo delimita la Organización Mundial de la Salud la viabilidad del embrión

Seleccione una:

- ☐ a. Embrión o feto cuyo peso sea igual o menor a 500 gramos.
- ☐ b. Gestación inferior a 20 semanas.
- ☐ c. Todas falsas.
- ☒ d. Todas correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas correctas

Pregunta **10**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuánto tiempo debe esperar una mujer que da lactancia materna para poder usar anticonceptivos compuestos por estrógenos y progestágenos

Seleccione una:

- ☒ a. 6 meses.
- ☐ b. 6 semanas.
- ☐ c. No se establece ningún periodo de espera.
- ☐ d. Estas mujeres no pueden usar este tipo de anticonceptivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6 meses.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es el método farmacológico más cómodo para la mujer en la interrupción del embarazo en el primer trimestre

Seleccione una:

- ☐ a. Metrotrexate + misoprostol
- ☒ b. Mifepristona + misoprostol
- ☐ c. Misoprostol solo
- ☐ d. Oxitocina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mifepristona + misoprostol

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dónde se encuentran las glándulas de Bartholino

Seleccione una:

- ☐ a. En el epidídimo.
- ☐ b. En el orificio uretral del varón.
- ☐ c. En el orificio uretral de la mujer.
- ☒ d. A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ambos lados del orificio vaginal, dentro de los labios menores

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo fundamental de la educación sexual en el adolescente es

Seleccione una:

- ☐ a. Fomentar la experimentación sexual si medidas de protección.
- ☐ b. Fomentar la intolerancia hacia toda relación distinta a la heterosexual.
- ☒ c. Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fomentar una sexualidad responsable, fomentar la tolerancia y concienciar sobre la violencia en la relaciones de pareja.

Pregunta **14**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al parche transdérmico

Seleccione una:

- ☒ a. Se absorbe a través de la piel.
- ☐ b. Se debe poner uno nuevo cada tres semanas.
- ☐ c. Existen 3 zonas en las que se puede colocar el parche: nalgas, parte superior externa del brazo y el abdomen.
- ☐ d. Garantiza 5 días adicionales de protección frente al olvido

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se absorbe a través de la piel.

Pregunta **15**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué categoría clasifica la OMS a los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad

Seleccione una:


- ☒ a. Categoría 1
- ☐ b. Categoría 2
- ☐ c. Categoría 3
- ☐ d. Categoría 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Categoría 1

Pregunta **16**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con cáncer de cérvix el uso del DIU de cobre en qué categoría se clasifica según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☒ d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

Pregunta **17**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una Mujer mayor de 35 años, fumadora de más de 15 cigarros al día, cual de los siguientes métodos anticonceptivos NO estaría indicado

Seleccione una:

- ☐ a. DIU de cobre
- ☐ b. Anticoncepción de solo progesterona
- ☒ c. Anticoncepción hormonal combinada.
- ☐ d. Preservativo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticoncepción hormonal combinada.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La elección del método para la realización de la interrupción del embarazo se basa en

Seleccione una:

- ☐ a. Las semanas de gestación
- ☐ b. Características de la mujer
- ☐ c. Características del embarazo
- ☒ d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mujer de 27 años de edad, nulípara, que ha observado su ciclo menstrual durante 12 meses. Si ciclo más largo ha durado 33 días y el más corto han sido 28. Aplicando el método del calendario, Cuándo no debería mantener relaciones sexuales con penetración y eyaculación intravaginal

Seleccione una:

- ☐ a. Entre los días 11 y 21.
- ☒ b. Entre los días 10 y 22.
- ☐ c. Entre los días 11 y 20.
- ☐ d. Entre los días 10 y 21

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre los días 10 y 22.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué métodos no se aconsejan iniciar en el posparto inmediato por la irregularidad de los ciclos menstruales

Seleccione una:

- ☐ a. Los preservativos.
- ☒ b. Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.
- ☐ c. El diafragma.
- ☐ d. El capuchón cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los métodos basados en el conocimiento de la fisiología.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique en categoría 1 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☐ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☒ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☐ c. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué significa que la OMS clasifique la categoría 4 un contraceptivo según la guía de Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

Seleccione una:

- ☐ a. No se recomienda a menos que no haya otra alternativa. En este caso los riesgos superan a los beneficios.
- ☐ b. No existe contraindicación para el uso de este anticonceptivo.
- ☒ c. Se contraindica por completo su uso.
- ☐ d. El método puede usarse, los beneficios superan a los riesgos, pero debe haber seguimiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se contraindica por completo su uso.

Pregunta **23**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué temas no se deben abordar durante el consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☐ a. Variedad de métodos disponibles.
- ☐ b. Como usar el método elegido.
- ☐ c. Ventajas y desventajas de cada método.



d. Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son temas que se deben tratar durante el consejo anticonceptivo

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la anticoncepción hormonal compuesta solo de gestágenos y a su uso en mujeres mayores de 40 años, señale la incorrecta

Seleccione una:



a. Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.



b. El DIU de levonorgestrel está indicado en aquellos casos en los que la mujer presenta disfunciones menstruales.



c. Este tipo de anticoncepción se puede utilizar en mujeres con riesgo cardiovascular.



d. El DIU de levonorgestrel se puede usar para evitar cirugía mayor en mujeres con sangrados excesivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Este tipo de anticonceptivos aumentan la cantidad de sangrado, la dismenorrea y el dolor pélvico.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de métodos anticonceptivos promueven el desarrollo de una sexualidad más libre, plena, satisfactoria y segura al no asociarse obligatoriamente relación sexual a reproducción.
- ☐ b. El uso de anticoncepción promueve la libre elección de maternidad/paternidad.
- ☒ c. El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto.
- ☐ d. Algunos anticonceptivos ayudan a la prevención de VIH/SIDA disminuyéndose así el contagio entre parejas serodiscordantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo de muerte materna en multíparas se reduce con cada parto, siendo prácticamente nulo a partir del cuarto.

Pregunta **26**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale en que mujeres estaría contraindicado la anticoncepción de emergencia

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres mayores de 35 años
- ☐ b. Mujeres con enfermedad hepática grave

- ☐ c. Mujeres que estén con lactancia materna
- ☒ d. Es segura para cualquier mujer, incluso para en las que las hormonas están contraindicadas, ya que es un método de uso puntual

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es segura para cualquier mujer, incluso para en las que las hormonas están contraindicadas, ya que es un método de uso puntual

Pregunta **27**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en referencia al consejo anticonceptivo

Seleccione una:

- ☐ a. Es una herramienta, internet, mediante el cual lo usuarios toman sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar.
- ☐ b. Es una herramienta mediante la cual el clínico ayuda a los usuarios a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva y planificación familiar
- ☐ c. Debe ser un diálogo entre el clínico y el usuario
- ☒ d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta **28**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta respecto a los anticonceptivos hormonales de solo gestágeno

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden usarlo las mujeres en las que los estrógenos están contraindicados.
- ☐ b. Pueden usarse durante la lactancia.
- ☐ c. No regulan el ciclo menstrual.
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Los DIU-CU se pueden insertar en las primeras 48 horas tras el parto sin importar el tipo de alimentación del recién nacido.
- ☐ b. Los espermicidas se pueden usar en cualquier momento tras el parto.
- ☐ c. La ligadura de trompas se puede realizar a partir del séptimo día tras el parto.
- ☒ d. Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia maternal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los DIU-levonorgestrel sólo los pueden utilizar madres que den lactancia maternal

Pregunta **30**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según las últimas publicaciones, Cuál es el método anticonceptivo con el índice de Pearl más bajo y por tanto el método más eficaz

Seleccione una:

- ☒ a. Implante subdérmico.
- ☐ b. Esterilización tubárica.
- ☐ c. Essure.
- ☐ d. DIU medicado