

Comenzado el	miércoles, 28 de noviembre de 2018, 11:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 28 de noviembre de 2018, 12:07
Tiempo empleado	55 minutos 14 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continue con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al aumento de la frecuencia respiratoria superficial se llama

Seleccione una:

- a. Polipnea.
- b. Ninguna de las opciones son correctas.
- c. Bradipnea.
- d. Taquipnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Polipnea.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente pediátrico con un traumatismo genitourinario. Indica que actuación de enfermería es correcta

Seleccione una:

- a. Dejar el niño en la sala de espera hasta que tengamos una muestra de orina.

- b. Si se considera oportuna canalizar una vía venosa de calibre normal.
- c. Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.
- d. Ninguna de las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una valoración y recogida de muestras de orina y descartar hematuria micro y macroscópica, vigilar si realiza micción espontánea o se le realiza un sondaje vesical en caso de retención o control de la diuresis del niño.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, cuál es la principal patología a descartar

Seleccione una:

- a. Mastoiditis
- b. Otitis media aguda
- c. Faringoamigdalitis
- d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda

Seleccione una:

- a. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica
- b. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. Cuál de estos cuidados no debemos realizar

Seleccione una:

- a. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.
- b. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.
- c. Es importante mantener la Temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.
- d. Todas las opciones son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Edad del paciente
- c. Picor intenso
- d. Deshidratación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el rango de edad en el que hay mayor incidencia de convulsión febril

Seleccione una:

- a. Entre 0 - 6 meses
- b. Entre 5 - 6 meses
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Entre 18 - 24 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 18 - 24 meses

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de cojera en la infancia

Seleccione una:

- a. Infecciosa.
- b. Traumática.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Inflamatoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Traumática.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de convulsión en la infancia

Seleccione una:

- a. Tumor cerebral
- b. Fiebre
- c. Epilepsia
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de dysuria

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. ITU
- c. Síndrome nefrótico
- d. Síndrome nefrítico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ITU

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lipotimia, dentro de qué categoría de síncope la podemos englobar

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Síncope cardiogénico.
- c. Síncope no cardiogénico.
- d. Síncope neurocardiogénico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síncope neurocardiogénico.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería en una bronquiolitis van encaminados fundamentalmente a

Seleccione una:

- a. Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.
- b. Que curemos la causa de la patología.
- c. Todas las opciones son correctas
- d. Aumentar la fluidez de las secreciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conseguir una disminución de la demanda de oxígeno.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos más utilizados en pediatría para la fiebre son

Seleccione una:

- a. Paracetamol e ibuprofeno
- b. Salbutamol
- c. Metamizol
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paracetamol e ibuprofeno

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué signos no nos indicarían gravedad al valorar a un niño en triaje que acude a urgencias por cefalea

Seleccione una:

- a. Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor
- b. Vómitos en escopeta
- c. Somnolencia
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de laringitis tiene su inicio de forma brusca y de predominio nocturno

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Laringitis aguda viral.
- c. Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.
- d. Epiglotitis aguda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño llega a urgencias con diarrea, qué signo de riesgo debemos tener en cuenta durante la valoración en triaje

Seleccione una:

- a. Compromiso de la vía respiratoria
- b. Deshidratación
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Alteraciones neurológicas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deshidratación

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un lactante llega a urgencia con un TCE tras una caída del cambiador, presenta una puntuación de 15 en la escala de Glasgow, cuál sería nuestra actuación Señale la falsa.

Seleccione una:

- a. Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante
- b. Observación durante 6 - 12 horas
- c. Comenzar tolerancia oral
- d. Control de las constantes vitales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años acude a urgencias con otalgia, qué signos debemos valorar
Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Otorrea
- b. Cefalea
- c. Fiebre
- d. Vértigos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cefalea

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño de 5 años llega a urgencias con un dolor abdominal intenso, qué actuaciones realizaríamos

Seleccione una:

- a. Valorar la frecuencia respiratoria
- b. Iniciar tolerancia oral de forma progresiva
- c. Control de la coloración de la piel
- d. Control hemodinámico y valoración del dolor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control hemodinámico y valoración del dolor

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente de 2 años acude a urgencias y sus padres nos cuentan que ha convulsionado en casa durante un minuto, cuál de las siguientes actuaciones no es prioritaria

Seleccione una:

- a. Valoración del nivel de conciencia
- b. Valoración de la vía aérea
- c. Colaborar en la realización de una punción lumbar
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colaborar en la realización de una punción lumbar