

Conceptos generales en la infección por SARS-COV-2 para el personal de Enfermería

Comenzado el viernes, 16 de octubre de 2020, 20:20

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 16 de octubre de 2020, 20:33

Tiempo empleado 12 minutos 49 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - ¡Excelente!, ha obtenido la máxima calificación posible.

Muchas felicidades

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál es la principal medida de prevención y control de infección?

Seleccione una:

- a. Higiene de manos ✓
- b. Uso de mascarillas FFP3
- c. Uso de guantes desechables
- d. Todas son medidas ineficaces para la prevención y control de la infección.

La respuesta correcta es: Higiene de manos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Las muestras biológicas procedentes de pacientes infectados o con sospecha de infección por coronavirus tendrán la consideración de sustancias infecciosas de categoría A.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Señale la respuesta correcta en relación al Covid-19.

Seleccione una:

- a. Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos, exclusivamente.
- b. Causan enfermedades compatibles con síndromes complejos respiratorios ✓
- c. No se han datado situaciones compatibles con pandemia en relación al coronavirus.
- d. La fuente principal de contagio probable es de origen humano.

La respuesta correcta es: Causan enfermedades compatibles con síndromes complejos respiratorios

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El aislamiento en los casos de Covid-19, son de tipo:

Seleccione una:

- a. Aislamiento respiratorio
- b. Aislamiento de contacto y por gotas ✓
- c. Aislamiento inverso
- d. Aislamiento protector

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto y por gotas

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

En atención primaria, en la situación actual, como norma general no se recomienda la toma de muestras de los casos posibles con sintomatología leve.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✗

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Con respecto a los resultados de los test rápidos de anticuerpos frente al Covid-19, selecciona la respuesta correcta si aparecen tanto la línea de control de calidad (C) como la línea de detección G, entonces se ha detectado el nuevo anticuerpo IgG de coronavirus y el resultado es positivo para el anticuerpo IgG.

Seleccione una:

- a. Resultado positivo, solo IgG ✓
- b. Resultado positivo, solo IgM
- c. Resultado positivo IgG y IgM
- d. Resultado negativo, solo IgG

La respuesta correcta es: Resultado positivo, solo IgG

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La mayor parte de los casos de infección por Covid-19 cursan con cuadros clínicos.

Seleccione una:

- a. Graves
- b. Leves ✓
- c. Letales
- d. Anodinos

La respuesta correcta es: Leves

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La vía de transmisión entre humanos es a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 10 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Con respecto a la sintomatología en relación al Covid-19, marque la correcta:

Seleccione una:

- a. Fiebre
- b. Tos
- c. Disnea
- d. Todos son síntomas del Covid-19 ✓

La respuesta correcta es: Todos son síntomas del Covid-19

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

De las siguientes situaciones, son indicativo de aislamiento domiciliario en la atención del paciente pediátrico:

Seleccione una:

- a. Pacientes dados de alta de un servicio hospitalario
- b. Ninguna es correcta ✗
- c. Contactos estrechos de los casos confirmados durante los 30 días siguientes
- d. Casos sospechosos o confirmados con cuadros que no pueden ser manejados de forma ambulatoria

La respuesta correcta es: Pacientes dados de alta de un servicio hospitalario

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

En base a las nuevas recomendaciones para la realización de las técnicas de SVB, se recomienda la puesta en práctica de la maniobra frente mentón en los casos sospechosos o confirmados de Covid-19.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✗
- b. Falso

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Con respecto al tabaco, según estudios se relaciona con un mayor riesgo de infección por Covid-19.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Con respecto a la higiene de manos, se realizará en los siguientes momentos:

Seleccione una:

- a. Antes del contacto con el paciente.
- b. Después del contacto con fluidos biológicos
- c. Antes de realizar una técnica aséptica
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En el abordaje de urgencias, el equipo individual de protección para atender una sospecha o caso confirmado de Covid-19 que debe usar el equipo profesional está formado por:

Seleccione una:

- a. Mascarilla FFP1
- b. Mascarilla FFP2
- c. Mascarilla FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad ✓
- d. Si es sospecha, no hay que usar mascarilla

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Con respecto a la atención a la población pediátrica en atención primaria, señale de las siguientes cuales son dificultades que presentan en su abordaje:

Seleccione una:

- a. Mayor capacidad para adoptar medidas de higiene personal
- b. Menor dificultad para contener sus desplazamientos
- c. Dificultad para mantener mascarilla sobre la nariz ✓
- d. Todas son dificultades asociadas a la atención del paciente pediátrico.

La respuesta correcta es: Dificultad para mantener mascarilla sobre la nariz

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

De los siguientes son datos a monitorizar en el seguimiento de pacientes en la atención del paciente pediátrico:

Seleccione una:

- a. B y D son correctas ✓
- b. Orina bien
- c. Profesión de riesgo
- d. Alimentación

La respuesta correcta es: B y D son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

De las siguientes, son patologías de riesgo para la población en edad pediátrica en relación al contagio por Covid-19:

Seleccione una:

- a. Trasplante hepático
- b. Inmunosupresión
- c. Cardiopatía
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La ropa de cama, cortinas, etc. deben lavarse con un ciclo de agua caliente (60° C) y agregar detergente para la ropa. Si no se puede utilizar agua caliente se deben agregar productos químicos específicos al lavar los textiles (por ejemplo, lejía)

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En atención primaria, señale cuál de las siguientes respuestas es una recomendación general de actuación frente al covid-19.

Seleccione una:

- a. Colocación de información visual en lugares estratégicos
- b. Se ofrecerá una mascarilla quirúrgica a aquellos pacientes que acudan al centro sanitario con síntomas de infección respiratoria aguda.
- c. Se debe disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

[Volver a: Evaluación fina... ➔](#)