



EVALUACIÓN

Módulo 1

1 — Los trastornos de ansiedad —y, en especial, el trastorno de ansiedad generalizada— son muy comunes en atención primaria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Presentan mayor predominio en personas de 30-40 años.
- b) Son más frecuentes en el sexo femenino (3:1).
- c) Tienen una prevalencia anual entre el 3 y el 8 % de la población.
- d) Se diagnostican y tratan de manera adecuada en más de un tercio de los pacientes.
- e) Las respuestas c y d son correctas.

2 — En los sujetos consumidores de alcohol y que realizan una tentativa de suicidio, si tenemos en cuenta la variable género, en los hombres predominan las edades comprendidas entre ¿Qué años de edad?

- a) 20 y 25 años de edad
- b) 30 y 39 años de edad
- c) 28 y 32 años de edad
- d) 35 y 45 años de edad
- e) ≥ 59 años de edad

3 — ¿Cuántas sesiones semanales tiene cada grupo en la intervención grupal?

- a) 5 sesiones.
- b) 10 sesiones.
- c) 15 sesiones.
- d) 20 sesiones.
- e) 25 sesiones.

4 — ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo y/o desencadenante del trastorno de ansiedad generalizada?

- a) Nivel socioeconómico alto.
- b) Factores genéticos.
- c) Experiencias vividas de carácter traumático.
- d) Tendencia a percibir los peligros.
- e) Intolerancia a la incertidumbre.

5 — Respecto a la hora de la tentativa suicida en pacientes alcohólicos, la mayoría de los sujetos eligieron hacerlo ¿en qué horario?

- a) Por las mañanas
- b) En horario postprandial
- c) Por las tardes
- d) Por las noches
- e) No hay diferencias

6 — La adicción alcohólica, hace que un individuo tenga como promedio de riesgo de suicidio mayor que la población general en torno al:

- a) 6 veces más
- b) 10 veces más
- c) 15 veces más
- d) 20 veces más
- e) 25 veces más

7 — ¿Cuál es la escala utilizada para medir el craving de tabaco?

- a) Escala de Glover-Nilsson.
- b) Escala URICA.
- c) Test de Richmond.
- d) Questionnaire on Smoking Urges-Brief (QSU).
- e) Escala MNWS.

8 — ¿Qué diagnóstico psiquiátrico presenta mayor dificultad para conseguir y/o mantener la abstinencia nicotínica?

- a) Esquizofrenia.
- b) Ansiedad.
- c) Trastornos de la personalidad.
- d) Trastorno bipolar.
- e) Las respuestas a y d son correctas.

9 — ¿Qué nombre recibe el cuestionario que valora el craving a la nicotina?

- a) Test de Fagerström.
- b) Escala de Glover-Nilsson.
- c) Escala URICA.
- d) Questionnaire on Smoking Urges-Brief (QSU).
- e) Escala MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale).

10 — ¿Cuál es la duración aproximada de cada sesión en la intervención grupal?

- a) 30 minutos.
- b) 45 minutos.
- c) 60 minutos.
- d) 75 minutos.
- e) 90 minutos.

DONDE ESTAMOS
Avinguda de la Meridiana, 358, 10.ª planta 08027
Barcelona

CONTACTAR
secretaria@enfermeriaysaludmental.com

REDES SOCIALES

[Quiénes somos](#) [Política de privacidad](#) [Política de cookies](#) [Aviso legal](#) [Condiciones de contratación](#)