

Epidemiología y prevención de los cánceres de cabeza y cuello asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH)

Comenzado el	jueves, 21 de enero de 2021, 07:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de enero de 2021, 08:05
Tiempo empleado	11 minutos 24 segundos
Puntos	15,00/20,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cánceres de cabeza y cuello, los que están más fuertemente asociados al VPH son los de:

Seleccione una:

- ☒ a. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 30%
- ☐ b. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 80%
- ☐ c. Las respuestas A y B son correctas
- ☐ d. Cavidad oral

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evidencia de la eficacia y efectividad de la vacuna contra el VPH para prevenir la infección oral por VPH

Seleccione una:

- ☐ a. Es limitada, con solo un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3%
- ☐ b. Es limitada, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- ☒ c. Es robusta, con un estudio publicado que mostró una eficacia del 93,3% y otros tres estudios evaluando efectividad que mostraron una reducción de la infección oral en los individuos vacunados versus no vacunados
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué posición ocupa el cáncer cabeza y cuello en cuanto a incidencia de nuevos casos de cáncer a nivel mundial?

Seleccione una:

- ☐ a. La décima
- ☒ b. La cuarta
- ☐ c. La sexta
- ☐ d. La segunda

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se puede alguien contagiar por VPH a nivel oral?

Seleccione una:

- ☐ a. Practicando sexo oral
- ☐ b. Besando en la mejilla o compartiendo bebidas con una persona infectada
- ☒ c. Practicando sexo oral y también es posible que el virus pueda llegar a la boca por otras vías como un beso profundo
- ☐ d. Compartiendo jeringuillas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las afirmaciones es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Se está utilizando la detección de VPH-ADN en enjuague-gárgaras orales para la detección precoz del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☐ b. Se recomienda la detección de anticuerpos E6 frente al VPH16 para la monitorización de pacientes diagnosticados de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☐ c. Se recomienda la detección de anticuerpos L1 o E6 frente al VPH16 para la detección precoz de carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH
- ☒ d. No existe en la actualidad ningún biomarcador viral (VPH) para el que se recomiende su uso como prevención secundaria y/o terciaria del carcinoma escamoso de orofaringe asociado al VPH

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tipo de VPH que se haya con mayor frecuencia en la infección oral por VPH es

Seleccione una:

- ☐ a. VPH 6
- ☐ b. VPHs 6 o 11
- ☒ c. VPH16
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hay un porcentaje de pacientes de COF asociado al VPH que tienen mal pronóstico

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero, alrededor de un 40% y aún no están bien caracterizados
- ☒ b. Verdadero, alrededor de un 27% y aún no están bien caracterizados
- ☐ c. Falso, todos tienen buen pronóstico
- ☐ d. Verdadero, alrededor de un 27% y están muy bien caracterizados

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos casos nuevos de carcinoma de cabeza y cuello debidos al VPH se estima que cada año se producen en el mundo?

Seleccione una:

- ☐ a. Cerca de 500000
- ☐ b. Cerca de 20000
- ☐ c. Cerca de 5000
- ☒ d. Cerca de 50000

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los COFs causados por el VPH

Seleccione una:

- ☒ a. Tienen mejor supervivencia global y libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ b. Tienen peor supervivencia global que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ c. Tienen peor supervivencia libre de enfermedad que los causados por el tabaco y el alcohol.
- ☐ d. Tienen supervivencia libre de enfermedad similar a los causados por tabaco y alcohol.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los COFs asociados al VPH o al consumo de tabaco y alcohol...

Seleccione una:

- ☐ a. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico pero no clínico y molecular
- ☒ b. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico, clínico y molecular
- ☐ c. Son tumores que se comportan de manera equivalente
- ☐ d. Representan tumores distintos a nivel clínico y molecular pero no epidemiológico

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La incidencia (casos nuevos diagnosticados por 100,000 habitantes-año) de COFs asociados al VPH

Seleccione una:

- ☐ a. Se mantienen estables
- ☒ b. Están en aumento en algunos países del mundo
- ☐ c. Están en descenso
- ☐ d. Están en aumento en todo el mundo

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La estrategia de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH se basa en

Seleccione una:

- ☐ a. Actualmente aún no se dispone de ninguna estrategia efectiva de prevención primaria de los carcinomas de cabeza y cuello asociados al VPH
- ☒ b. La vacunación contra el VPH
- ☐ c. El uso del preservativo
- ☐ d. Las respuestas B y C son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que se debe tener en cuenta para plantear un programa de detección precoz de un cáncer

Seleccione una:

- ☐ a. La incidencia de la enfermedad.
- ☐ b. Disponer de biomarcadores con sensibilidad y especificidad adecuada
- ☐ c. Que el programa reduzca la mortalidad y/o morbilidad
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Si soy hombre o mujer que no se vacunó contra el VPH a la edad de vacunación sistemática, me puedo vacunar?

Seleccione una:

- ☐ a. Las mujeres sí pero los hombres no
- ☐ b. No, la vacuna sólo está indicada en niñas de 9 a 14 años
- ☐ c. Las mujeres no pero los hombres sí
- ☒ d. Sí, la vacuna está indicada tanto en hombres como mujeres

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El rol del VPH en las lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral y en las displasias epiteliales orales

Seleccione una:

- ☐ a. El VPH no juega ningún papel en las LPMO y DEO
- ☐ b. Todas las LPMO y DEO son causadas por el VPH
- ☐ c. Es controvertido, con prevalencias reportadas en la literatura en dichas lesiones entre el 0 y el 100%
- ☒ d. Aproximadamente la mitad de las LPMO y DEO son causadas por el VPH

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los factores que se asocian a la infección oral por VPH son

Seleccione una:

- ☐ a. Tabaco
- ☒ b. Edad
- ☐ c. Comportamiento sexual
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje de la población general está infectada por VPH a nivel oral y qué porcentaje aclara/elimina la infección?

Seleccione una:

- ☐ a. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☐ b. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☐ c. Alrededor de un 10% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. Aproximadamente la mitad de las infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones
- ☒ d. Alrededor de un 5% de la población adulta tiene una infección oral por VPH. La gran mayoría de infecciones por VPH orales se eliminan en uno o dos años sin presentar síntomas ni lesiones

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Si tengo un cáncer de orofaringe causado por el VPH, implica que mi pareja también está infectada y tiene que realizar una visita extra al ginecólogo?

Seleccione una:

- ☐ a. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga, pero sí debe realizar inmediatamente una visita con el ginecólogo para descartar
- ☐ b. Sí, seguramente su pareja esté infectada y debe pedir visita con el ginecólogo
- ☒ c. Tener una infección oral por VPH no implica necesariamente que tu pareja la tenga ni que te haya sido infiel. No hay necesidad de realizar una visita extra al ginecólogo, pero es importante que realice las visitas regulares establecidas según el programa de cribado del cáncer de cuello uterino.

- ☐ d. Sí, seguramente su pareja esté infectada y probablemente te haya sido infiel

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede saber con certeza el momento exacto de la infección inicial por VPH oral?

Seleccione una:

- ☒ a. En algunos casos sí, en otros no
- ☐ b. Sí, unos diez años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- ☐ c. No
- ☐ d. Sí, unos dos años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral macroscópicamente reconocibles?

Seleccione una:

- ☐ a. Las leucoplaquias orales
- ☐ b. Las displasias orales epiteliales
- ☐ c. Los liquen planos orales
- ☒ d. Las leucoplaquias orales y los liquen planos orales