

Cuidados de enfermería en urgencias - Edición 2

| | |
|------------------------|--|
| Comenzado el | lunes, 16 de diciembre de 2019, 18:50 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | martes, 17 de diciembre de 2019, 18:14 |
| Tiempo empleado | 23 horas 23 minutos |
| Puntos | 20,00/20,00 |
| Calificación | 10,00 de 10,00 (100%) |
| Comentario - | Apto |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dosis habitual de atropina en pediatría

Seleccione una:

- a. 1mg/kg
- b. 0,02 mg/kg ✓
- c. 0,1 mg/kg
- d. 0,01 mg/kg

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La fase del parto del alumbramiento es

Seleccione una:

- a. Cuando sale el feto
- b. Cuando se realizan las maniobras de Leopold
- c. Cuando se hace la episiotomía
- d. Cuando sale la placenta ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La relación de compresiones:ventilaciones torácicas para una RCP básica realizada por personal sanitario de un paciente pediátrico será

Seleccione una:

- a. .30:2
- b. 100-120 min
- c. 15:2 ✓
- d. .15:15

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La presencia de multiples fracturas o alguna fractura abierta, en el trauma score pediatrico implica

Seleccione una:

- a. Restar 2 puntos (-2)
- b. Restar 1 punto (-1) ✓
- c. Sumar 1 punto (+1)
- d. Sumar 2 puntos (+2)

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Limite de edad que marca la diferencia en los item de respuesta motora y apertura ocular, en al escala de glasgow modificada para pacientes pediatricos

Seleccione una:

- a. 5 años
- b. 10 años
- c. 1 año ✓
- d. 3 años

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos de rotura uterina son

Seleccione una:

- a. Completa y parcial o incompleta ✓
- b. Total y No total
- c. Primaria y Secundaria
- d. Alta y Baja

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un grado de preeclampsia

Seleccione una:

- a. Eclampsia
- b. Leve
- c. Grave
- d. Subclampsia ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las soluciones quirurgicas a la atonia uterina postparto, son todas menos una de las siguientes, señala cual

Seleccione una:

- a. Abdominoplastia ✓
- b. Legrado
- c. Ligadura de vasos
- d. Embolización de vasos uterinos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El utero es normal, sólo ante una

Seleccione una:

- a. Vasa previa ✓
- b. Rotura Uterina
- c. Desprendimiento de placenta
- d. Placenta previa

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El test de APGAR valora

Seleccione una:

- a. Color (apariciencia) - Respuesta a estímulos - Tono muscular - Respiración ✓
- b. Apariencia - Respiración - Circulación
- c. Apertura de ojos - Respuesta verbal (llanto) - Respuesta motora
- d. Nivel de bilirrubina

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una medida para liberar presión sobre el cordón umbilical, en caso de prolapso

Seleccione una:

- a. Posición de trendelenburg
- b. Lateralización opuesta a la posición del cordón
- c. Empujar el cordón ✓
- d. Deplazar la presentación en sentido cefalico

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El babeo en el niño enfermo no está presente por norma general

Seleccione una:

- a. Laringitis viral ✓
- b. Epiglotitis aguda
- c. Traqueitis bacteriana
- d. Absceso retrofaringeo

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis pediátrica para nebulización de adrenalina es

Seleccione una:

- a. 1mg/kg
- b. 1,5 mg/kg
- c. 0,5 mg/kg ✓
- d. 0,75 mg/kg

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si aplicamos la tabla de "altura uterina en gestación", a que altura estará el borde superior del utero a las 36 semanas

Seleccione una:

- a. Sinfisis del pubis
- b. A la altura del ombligo
- c. Reborde costal ✓
- d. A 1/3 por debajo del ombligo, pero a la mitad de la distancia de ese tercio hasta la sinfisis del pubis

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es una abrupcio placentae lo mismo que un desprendimiento de placenta

Seleccione una:

- a. No
- b. Sólo en mujeres que hablen latin
- c. Si ✓
- d. Varia si es anterior o posterior

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Puede una preeclampsia hacer necesaria una extracción fetal

Seleccione una:

- a. No, nunca
- b. Si, sólo en preeclampsias leves
- c. Si, con signos de severidad ✓
- d. No, mientras la TAS mayor que 100 y TAD mayor que 80 en 2 tomas separadas separadas 24h

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual es genalmente la más optima posición de una gestante ante cualquier tipo de urgencia

Seleccione una:

- a. Decubito lateral derecho
- b. Decubito prono
- c. Decubito lateral izquierdo ✓
- d. Bipedestación

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La puntuación a partir de la cual se determina gravedad en la escala de trauma pediatria es

Seleccione una:

- a. 8 ✓
- b. .6
- c. .5
- d. .10

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las medidas físicas para reducir la fiebre de un niño, los baños templados deberán estar a

Seleccione una:

- a. 1°C por debajo de la temperatura del niño ✓
- b. 2° por debajo
- c. A la misma temperatura que el niño
- d. 1° por encima para conseguir la transferencia transversa de temperatura inversa

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La referencia para el ajuste de medicación pediátrica se hace por

Seleccione una:

- a. Peso
- b. Edad
- c. Edad y peso ✓
- d. Altura en cm