


## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son criterios médicos de ingreso hospitalario en la anorexia:

Seleccione una:

- a. Un IMC menor que 14 o descenso rápido de peso corporal (superior al 20% de pérdida en 6 meses).
- b. Aparición de síncope.
- c. Hipoglucemia.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

Todos son criterios médicos de ingreso hospitalario en la anorexia.

## Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El pronóstico de la anorexia, en general, NO es:

Seleccione una:

- a. Bueno.
- b. Malo.
- c. No existen datos sobre el pronóstico.
- d. Ninguna respuesta es correcta.


### Retroalimentación

El curso de la anorexia nerviosa varía ampliamente, pero en general el pronóstico no es bueno.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Respecto al curso y pronóstico de la bulimia, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Tiene mejor pronóstico que la anorexia.
- b. Experimentan una mejoría del 50% en los atracones y en las purgas.
- c. Entre los pacientes ambulatorios, las mejorías parecen mantenerse más de cinco años.
- d. Todas son correctas.


#### Retroalimentación

Todas las afirmaciones son correctas.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Respecto a la anorexia nerviosa señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Es una enfermedad conocida desde hace apenas 20 años.
- b. Casi el 80% de los pacientes usan también otro tipo de conductas para perder el peso como ejercicio físico extenuante, vómitos autoinducidos o abuso de laxantes y/o diuréticos.

- c. Alteraciones que produce la anorexia son un aumento de la hormona del crecimiento y del cortisol, alteraciones en el metabolismo periférico de las hormonas del tiroides y anomalías en la secreción de insulina.
- d. Puede existir enfermedad médica que justifique la pérdida de peso.


### **Retroalimentación**

Otras alteraciones relacionadas con la anorexia nerviosa son: aumento de la hormona del crecimiento y del cortisol, alteraciones en el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas y anomalías en la secreción de insulina

### **Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

En la conducta de la ingesta es importante:  
Seleccione una:

- a. Conocer el patrón alimenticio que presenta el paciente.
- b. El grado de distorsión que existe en la percepción de la imagen corporal.
- c. El grado de satisfacción con el propio cuerpo.
- d. Ninguna respuesta es correcta.


### **Retroalimentación**

Conducta de ingesta: es importante conocer el patrón alimenticio que presenta el paciente tanto en lo que se refiere a contenido y cantidad de comida ingerida habitualmente, como respecto a la pauta de ingesta seguida, las conductas restrictivas que presenta el paciente, la presencia de atracones o de sentimiento de pérdida de control respecto a la comida, (si existen, las características de estos), los conocimientos nutricionales y las actitudes hacia la comida.

### **Pregunta 6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El incremento de las patologías asociadas a la conducta alimentaria a lo largo de la última década radica en diversas razones. Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. La existencia de modelos estéticos en los países orientales.
- b. Sociedad opulenta.
- c. Sociedad muy preocupada por el ejercicio físico.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

El incremento de las patologías asociadas a la conducta alimentaria a lo largo de la última década responde a diversas razones, entre las cuales cabe destacar la existencia de ciertos modelos estéticos en los países occidentales. Asimismo, se está potenciando una sociedad opulenta, consumista entre otros aspectos en la alimentación, altamente automatizada y extremadamente sedentaria, responsable en gran medida del aumento de la obesidad, la anorexia y la bulimia.

### Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a la vigorexia, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Es reconocida por la sociedad médica.
- b. La persona con vigorexia se obsesiona por verse musculosa.
- c. La persona abandona sus actividades sociales.
- d. Los regímenes alimentarios de una persona con vigorexia son ricos en proteínas.


## Retroalimentación

La vigorexia todavía no está reconocida como enfermedad por la comunidad médica internacional.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La anorexia de tipo restrictivo se define como:

Seleccione una:

- a. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones.
- b. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo recurre regularmente a atracones o purgas.
- c. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a purgas.
- d. Las opciones a y c son correctas.


## Retroalimentación

En la anorexia de tipo restrictivo, durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones o a purgas (por ejemplo provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas).

### Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La obtención de datos objetivos:

Seleccione una:

- a. Es muy fácil.
- b. Es más sencilla en la bulimia.
- c. El BEACHES permite observar el comportamiento alimentario de los niños durante una comida formal y la influencia de su entorno familiar en la ingesta.
- d. Ninguna es correcta.


### Retroalimentación

La obtención de datos objetivos por medio de familiares del sujeto resulta muy difícil o incluso, en casos de bulimia, prácticamente imposible. Algunos sistemas de observación directa son: BATMAN, que permite observar el comportamiento alimentario de los niños durante una comida formal y la influencia de su entorno familiar en la ingesta, o BEACHES, que permite evaluar simultáneamente la conducta alimentaria y la actividad física del niño, además de los eventos que ocurren en el ambiente.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Se estima que en España la prevalencia de TCA se sitúa (señale la correcta):  
Seleccione una:

- a. Entre el 0,3-0,8%.
- b. Entre el 4,1 y el 4,5%.
- c. En torno al 1%.
- d. Ninguna respuesta es correcta.


### Retroalimentación

En España la prevalencia de TCA en población adolescente se sitúa entre el 4,1 y el 4,5%. En concreto, la anorexia tiene una prevalencia del 0,3%, y la bulimia del 0,8%, siendo la del TCA no especificado en torno al 3,1% de la población femenina de entre 12 y 21 años.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la evaluación de los T.C.A:

Seleccione una:

- a. Es fundamental la intervención del psiquiatra.
- b. Solo se necesita a la paciente para confirmar el diagnóstico.
- c. El peso no es un aspecto a evaluar.
- d. El índice de Masa Corporal de Quetelet es el más utilizado para el control de

peso.


### Retroalimentación

El Índice de Masa corporal de Quetelet, junto al índice de Peso Relativo son los dos más utilizados para valorar el peso corporal.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La definición “alteración de la alimentación manifestada por una dificultad persistente para comer adecuadamente, con incapacidad significativa para aumentar de peso o con pérdidas significativas de peso durante por lo menos 1 mes”, corresponde al trastorno de:

Seleccione una:

- a. Trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez.
- b. Pica.
- c. Síndrome de Prader-Willi.
- d. Síndrome del comedor nocturno.


## Retroalimentación

La definición corresponde al trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el síndrome del comedor nocturno o Night Eating Syndrome:

Seleccione una:

- a. Es reconocido por la sociedad médica.
- b. El paciente ingiere más del 10% de la ingesta calórica por la noche.
- c. La presencia de hipofagia nocturna es un síntoma muy característico.
- d. Debe distinguirse este síndrome de otro trastorno conocido como sleep-related

eating disorder, SRED.


## Retroalimentación

Lo que aparece es hiperfagia nocturna, no es un síndrome reconocido por la sociedad médica, y el paciente ingiere más del 50% de la ingesta energética diaria.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El objetivo enfermero que plantea que la persona, previa información detallada de los peligros de su comportamiento alimentario, interiorizará los riesgos que sus hábitos conllevan para la salud, sería factible para solucionar el diagnóstico de enfermería:

Seleccione una:

- a. Negación ineficaz.
- b. Alteración de la nutrición por defecto.
- c. Estreñimiento subjetivo.
- d. Trastorno de la imagen corporal.


### **Retroalimentación**

El objetivo que se plantea en el diagnóstico de negación ineficaz es que la persona interiorizará los riesgos que sus hábitos conllevan para la salud.

### **Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

En la clasificación de Garrow, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Un IMC entre 25 y 29,9 equivaldría a una obesidad de grado I o leve.
- b. Un IMC de entre 30 y 40 equivaldría a una obesidad de grado II o moderada.
- c. Un IMC superior a 40 supondría en la clasificación un grado de obesidad III o grave.
- d. Todas son correctas.


### **Retroalimentación**

La clasificación de Garrow diferencia los tipos de obesidad como se indica en la pregunta.

### **Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En los tratamientos psicológicos de la anorexia, los tratamientos conductuales:  
Seleccione una:

- a. Los procedimientos operantes de manejo de contingencias han sido las técnicas de intervención más utilizadas.
- b. Al no tratarse de un trastorno fóbico no se puede utilizar la desensibilización sistemática.
- c. Los procedimientos suele consistir en facilitar al paciente ciertos privilegios o ventajas.
- d. Ninguna es correcta.


### Retroalimentación

Los procedimientos operantes de manejo de contingencias han sido las técnicas de intervención más utilizadas en el tratamiento de la anorexia nerviosa. El procedimiento, suele consistir en privar (no facilitar) al paciente de ciertos privilegios o ventajas.

### Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el trastorno por atracón, señale la correcta:  
Seleccione una:

- a. Implica una ingesta de alimento en un amplio espacio de tiempo (por ejemplo, en un periodo de 6 horas).
- b. La cantidad de ingesta es igual a la que la mayoría de las personas ingerirían.
- c. Existe una sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento.
- d. No tiene ninguna relación con la bulimia.


### Retroalimentación

En el trastorno por atracón hay sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo, sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo).

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a la anorexia, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. No hay errores dietéticos.
- b. Existe una realización continua de dieta autoimpuesta.
- c. Refiere ausencia de apetito.
- d. Niega la sensación de hambre.


### Retroalimentación

Es frecuente observar errores dietéticos en los pacientes con TCA.

## Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el trastorno por rumiación señale la alternativa correcta:

Seleccione una:

- a. Suele iniciarse después de los 3 meses de edad.
- b. Es muy común en niños y adolescentes.
- c. La persona experimenta un malestar con la conducta.
- d. Es muy común la presencia de náuseas y desgarros por las regurgitaciones.


### Retroalimentación

En esta patología, no parece haber perturbación, náuseas ni desagrado asociado con la regurgitación y puede aparentar incluso causar placer. Este trastorno generalmente se inicia después de los 3 meses de edad, después de un período establecido de digestión normal. Se presenta en bebés y es raro en niños y adolescentes.

## Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la bulimia:

Seleccione una:

- a. El individuo tiene sensación de no poder controlar su conducta.
- b. Existen intensos sentimientos de autorrepulsa y culpa.
- c. Restricción alimentaria como forma de compensar el atracón.
- d. Todas son correctas


### Retroalimentación

Todos los expuestos son sentimientos y conductas que ocurren en la bulimia.

## Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de pacientes con TCA son varones?

Seleccione una:

- a. Entre el 10 y el 20%.
- b. Entre el 5 y el 10%.
- c. El 25%

- d. Ninguna es correcta.


### Retroalimentación

La prevalencia de TCA entre hombres continúa siendo menor, siendo solo entre el 5 y el 10% de los enfermos varones.

### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La prevención de los T.C.A. :

Seleccione una:

- a. Solo puede ser primaria y secundaria.
- b. La prevención primaria implica la detección e intervención temprana que inhiba la cronificación del trastorno.
- c. La prevención secundaria implica disponer de instrumentos de screening que sean sencillos, sensibles y fiables a la hora de identificar signos y síntomas tempranos, y

por otro, identifica a las personas de alto riesgo.

- d. Ninguna es correcta.


### Retroalimentación

Dentro del campo de la prevención, podemos distinguir entre prevención primaria, dirigida a prevenir la aparición del trastorno; prevención secundaria, que va encaminada a la detección e intervención temprana, de manera que se prevenga su cronificación; y la prevención terciaria cuyo objetivo es reducir el deterioro producido una vez que el trastorno se ha cronificado.

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La entrevista como instrumento de evaluación:

Seleccione una:

- a. La entrevista es el procedimiento básico para recoger información sobre los trastornos del comportamiento alimentario.
- b. El Interview for Diagnosis Disorder Clinic (IDED) contiene algunos ítems dirigidos a recoger información sobre los episodios de voracidad, conductas purgativas y grado de satisfacción con el cuerpo.
- c. El Eating Disorder Examination (EDE): contiene algunos ítems dirigidos a recoger información sobre la existencia de patología secundaria.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

La Interview for Diagnosis Disorder Clinic (IDED) pretende explorar la sintomatología propia de los diferentes trastornos, mientras que la EDE o Eating Disorder Examination (EDE) permite obtener medidas de restricción alimentaria, sobreingesta, preocupación y culpabilidad sobre la conducta de ingesta, preocupación por la silueta y preocupación por el peso.

### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a la anorexia, en el patrón sexualidad-reproducción, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. La percepción deteriorada de su propio cuerpo lleva aparejada la disminución del interés sexual.
- b. Suelen relatar inactividad sexual.
- c. Puede haber amenorrea.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

Todo lo expuesto suele aparecer al valorar el patrón sexualidad-reproducción de una persona con anorexia.

## Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En cuanto a la obesidad androide, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Es más típica de la mujer, a nivel de las caderas.
- b. De inicio en la infancia o en la adolescencia, que se asocia a un peor pronóstico ya que se produce un aumento de los adipocitos.
- c. De inicio en la edad adulta, en cuyo caso los adipocitos contienen más cantidad de grasa.
- d. La grasa tiende a acumularse a nivel visceral, por lo que el índice cintura/cadera

es más elevado.


### Retroalimentación

En la obesidad androide, la grasa tiende a acumularse a nivel visceral, por lo que el índice cintura/cadera es más elevado. La obesidad típica de la mujer es la ginoide; es en la obesidad hiperplásica en la que se produce un aumento de los adipocitos, y en la hipertrófica en la que los adipocitos contienen más cantidad de grasa.

## Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La obesidad que suele conllevar problemas de tipo mecánico o deambulatorias es conocida como:

Seleccione una:

- a. Obesidad androide.
- b. Obesidad pigmentoide.
- c. Obesidad ginoide.
- d. Obesidad geniculada.


### **Retroalimentación**

La obesidad ginoide suele conllevar problemas de tipo mecánico o deambulatorias (artrosis de rodilla o columna, varices...).

### **Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

En la clínica de la anorexia y bulimia:

Seleccione una:

- a. Las pequeñas rupturas vasculares en la cara o bajo los ojos es característico de la anorexia.
- b. La irritación crónica de la garganta es característico de la anorexia.
- c. Las oscilaciones de peso (5 o 10 Kg, arriba o abajo) son características de ambas patologías.
- d. Todas las opciones son incorrectas.


### **Retroalimentación**

Las pequeñas rupturas vasculares, la irritación crónica de garganta, y las oscilaciones de peso son propias de la bulimia.

### **Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La falta de menstruación o retraso en su aparición sin causa fisiológica conocida es un signo fisiológico que aparece en personas que padecen:

Seleccione una:

- a. Anorexia.
- b. Bulimia.
- c. Depresión ansiosa.
- d. Las opciones a y b son correctas.


### Retroalimentación

La falta de menstruación o retraso en su aparición sin causa fisiológica conocida es un signo fisiológico es un signo propio de la anorexia.

### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Es un cuestionario de evaluación:

Seleccione una:

- a. Eating Attitudes Test (EAT) de Garner y Garfinkel,
- b. Eating Disorder Inventory (EDI) de Garner, Olmsted y Polvy.
- c. Bringe Eating and Cognitive Factors Scale de Gormally, Black, Daston y Rardin.
- d. Todas son correctas.


### Retroalimentación

Todos los expuestos son cuestionarios que miden trastornos de la conducta alimentaria.

### **Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Los criterios diagnósticos del pica según el DSM-IV son:

Seleccione una:

- a. Ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un periodo de por lo menos 1 mes.
- b. La ingestión de sustancias no nutritivas es inapropiada para el nivel de desarrollo.
- c. La conducta ingestiva no forma parte de prácticas sancionadas culturalmente.
- d. Todas son correctas.

#### **Retroalimentación**

Todos son criterios diagnósticos del pica según el DSM-IV.