

Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el viernes, 22 de mayo de 2020, 12:32

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 22 de mayo de 2020, 13:00

Tiempo empleado 28 minutos 19 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Un paciente que tras un TCE abre los ojos a la presión, retira miembros y emite sonidos, es valorado con un GCS de:

Seleccione una:

- a. 9
- b. 10
- c. 8 ✓
- d. 7

O=2, M=4, V=2

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El tálamo es:

Seleccione una:

- a. Centro de transmisión de información sensorial ✓
- b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- c. Regula el hambre y la saciedad
- d. Regula el control del SNS y SNP

las otras respuestas corresponden a funciones del hipotálamo

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

^

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El cerebelo...

Seleccione una:

- a. Está compuesto por sustancia gris
- b. Está compuesto por sustancia blanca
- c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular
- d. Todas son correctas ✓

está compuesta por sustancia gris y regula equilibrio, postura y tono muscular

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El espacio subaracnoideo se encuentra entre:

Seleccione una:

- a. Duramadre y aracnoides
- b. Aracnoides y piamadre ✓
- c. Duramadre y periostio
- d. Piamadre y encéfalo

entre aracnoides y piamadre

La respuesta correcta es: Aracnoides y piamadre

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- a. Rx cráneo
- b. Resonancia magnética
- c. TAC craneal ✓
- d. Ecografía

el Tac craneal es la prueba diagnóstica gold standard

La respuesta correcta es: TAC craneal

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- a. Suele haber sangrado arterial
- b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- c. Es común en personas mayores ✓
- d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

suele ser sangrado venoso, produce efecto masa y común en ancianos

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El propofol en pacientes con TCE grave:

Seleccione una:

- a. Es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica
- b. Es aconsejable en caso de Hipertensión intracraneal
- c. No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica ✓
- d. A y b son correctas

el propofol puede agravar la inestabilidad hemodinámica

La respuesta correcta es: No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La hemorragia subaracnoidea:

Seleccione una:

- a. El paciente la describe como el peor dolor de cabeza de su vida
- b. Suele ser asociado a mareo, náuseas y vómitos
- c. Se asocia a ruptura de aneurismas cerebrales
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La sangre venosa cerebral desemboca en:

Seleccione una:

- a. Sistema carotídeo
- b. Sistema cervical
- c. Sistema yugular ✓
- d. Sifón subclavicular

sistema yugular es la respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistema yugular

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de la permeabilidad de la vía aérea del TCE debemos inmovilizar el cuello del paciente si...

Seleccione una:

- a. GCS=16
- b. Ausencia de dolor
- c. Focalidad neurológica ✓
- d. Todas son falsas

se debe inmovilizar si GCS=14, presencia de dolor, focalidad neurológica, alteración de la sensibilidad de los MMII, traumatismo de alta energía...

La respuesta correcta es: Focalidad neurológica

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

El uso de manitol 20% en caso de TCE grave como terapia hiperosmolar...

Seleccione una:

- a. Provoca vasodilatación cerebral
- b. Aumenta la producción de LCR+
- c. Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral
- d. Todas son falsas ✗

el manitol produce expansión de volumen sanguíneo, con aumento del FSC, vasoconstricción refleja, reducción de la producción de LCR

La respuesta correcta es: Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Si la PIC aumenta, que pasará con la PPC, según la fórmula de $PPC = TAm - PIC$:

Seleccione una:

- a. Aumentará la TAm
- b. Disminuirá
- c. Puede mantenerse igual ✖
- d. Todas son correctas

al principio compensará con aumento de TAm, pero si no compensa disminuirá la PPC y puede producir isquemia cerebral

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- a. Suero salino fisiológico
- b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- c. Suero hipotónico
- d. A y b son correctos ✔

el suero hipotónico no está indicado

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de la ventilación del TCE:

Seleccione una:

- a. Debemos tender a la normoventilación
- b. Debemos evitar la hipoxia e hipercapnia
- c. Debemos intentar mantener $SpO_2 > 90\%$
- d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El tronco del encéfalo se compone de:

Seleccione una:

- a. Tálamo e hipotálamo
- b. Cuerpo estriado, amigdalino y el claustro
- c. Capas meníngeas y LCR
- d. Bulbo, protuberancia y puente ✓

La respuesta correcta es: Bulbo, protuberancia y puente

Pregunta 16

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En el TCE grave, intentaremos mantener una TAM mayor que 90 mm Hg, qué utilizaremos para intentar conseguirlo:

Seleccione una:

- a. Líquidos isotónicos
- b. Manitol
- c. Suero salino hipertónico
- d. Atropina

utilizaremos líquidos isotónicos y si necesaria noradrenalina y/o fenilefrina

La respuesta correcta es: Líquidos isotónicos

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué medidas generales tomaremos ante un TCE moderado?

Seleccione una:

- a. Decúbito supino con cabecero elevado 15-30°
- b. Antitrendelemburg si sospechamos lesión en espalda
- c. Conseguir TAM menor que 90 mm Hg
- d. A y b son correctas ✓

hay que conseguir mantener cabeza alineada y en posición neutra, correcta ventilación y perfusión (TAM mayor que 90 mmHg)

La respuesta correcta es: A y b son correctas

^

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- a. Menos de 6 horas
- b. 6-12 horas
- c. 6-24 horas ✓
- d. 24-48 horas

se recomienda ese tiempo

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál de estas membranas cerebrales corresponde a la que “de consistencia blanda y esponjosa sin vasos sanguíneos situada debajo de la duramadre”?

Seleccione una:

- a. Piamadre
- b. Periestio
- c. Aracnoides ✓
- d. Espacio subaracnoideo

es la aracnoides

La respuesta correcta es: Aracnoides

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- a. 14 ✓
- b. 15
- c. 9
- d. 12

O= 4, M=5, V= 5

La respuesta correcta es: 14

[Volver a: Módulo 3: Actua... ➔](#)