

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a los cuidados básicos del recién nacido sano:

Seleccione una:

- a. Es recomendable, tras el nacimiento, la administración de una dosis única de 1 mg de Vitamina K intramuscular.
- b. El contacto piel con piel del neonato con su madre se recomienda iniciarlo inmediatamente después del parto en RN sanos, manteniéndolo, al menos, 50-60 minutos de manera ininterrumpida.
- c. La asociación española de Pediatría (AEP) recomienda la vacunación universal frente al virus de la hepatitis B, habitualmente con una primera dosis dentro de las primeras 48 horas de vida. ✓
- d. La identificación del RN se realizará inmediatamente tras el nacimiento.

Retroalimentación

La asociación española de Pediatría (AEP) recomienda la vacunación universal frente al virus de la hepatitis B, habitualmente con una primera dosis dentro de las primeras 24 horas de vida.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes situaciones se considera de riesgo infeccioso para el neonato tras el parto?

Seleccione una:

- a. Rotura de membranas de 24 horas.
- b. Estreptococo del grupo B positivo sin antibióticos.
- c. Fiebre materna de mayor que 38°C.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Los factores que implican riesgo de infección son aquellos microorganismos presentes en el canal vaginal materno con capacidad patógena para la madre, feto y/o recién nacido: madre portadora de estreptococo del grupo B (EGB) con profilaxis antibiótica incompleta, hermano afectado de sepsis por EGB, amenaza de parto prematuro (menor que 35 semanas), rotura de membranas

ovulares de más de 18 horas de evolución, sospecha clínica de corioamnionitis (fiebre materna, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda) y fiebre materna intraparto de más de 38°C.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos cambios fisiológicos en el neonato es incorrecto con respecto a la etapa de transición a la vida extrauterina?

Seleccione una:

- a. Aumento de la perfusión pulmonar producido por la entrada de aire a los alvéolos (llenos de líquido en la etapa fetal), y por consiguiente, vasodilatación arterial.
- b. Cierre del ductus arterioso.
- c. Cierre del foramen oval.
- d. Aumento de las resistencias pulmonares debido a la vasodilatación alveolar. ✓

Retroalimentación

Se produce un descenso de las resistencias pulmonares debido a la expansión del alveolo y la vasodilatación alveolar.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Según las últimas recomendaciones, ¿cómo se debería medir la frecuencia cardíaca fetal en paritario?

Seleccione una:

- a. Directamente palpando el pulso en la base del cordón umbilical.
- b. Directamente palpando el pulso en carótida.
- c. Mediante encefalograma.
- d. Mediante estetoscopio colocado en ápex cardíaco. ✓

Retroalimentación

Según las últimas recomendaciones el método más fiable es mediante un fonendoscopio, algo menos preciso y desaconsejado sería realizarlo por la palpación de la base del cordón umbilical.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Coincidiendo con qué suceso podría presentar clínica un neonato afectado por una coartación de aorta que no dispone de diagnóstico prenatal?

Seleccione una:

- a. Cierre del foramen oval.
- b. Cierre del ductus venoso.
- c. Cierre del ductus arterial. ✓
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

En caso de no tener diagnóstico prenatal, puede presentar un debut clínico brusco con shock y acidosis metabólica en las primeras 72h, coincidiendo con el cierre espontáneo del ductus.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un neonato con un peso al nacimiento de 1250 gr, ¿Cómo lo clasificaríamos en relación al peso?

Seleccione una:

- a. Bajo peso al nacimiento.
- b. Muy bajo peso al nacimiento. ✓
- c. Extremadamente bajo peso al nacimiento.
- d. Macrosómico.

Retroalimentación

Podemos clasificar al neonato como "bajo peso al nacimiento" con peso inferior a 2.500 gr. y los subgrupos de "muy bajo peso al nacimiento" a los de peso inferior a 1500 gr. y de "extremado bajo peso" al inferior a 1000 gr.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no representa un factor de riesgo prenatal?

Seleccione una:

- a. Malformaciones fetales.
- b. Gestación postérmino. **X**
- c. Disminución de los movimientos fetales.
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

Ver tabla 1 del módulo 3.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué edad gestacional podemos considerar a un neonato como pretérmino?

Seleccione una:

- a. menor que 37 semanas de gestación. **✓**
- b. menor que 35 semanas de gestación.
- c. menor que 40 semanas de gestación.
- d. menor que 32 semanas de gestación.

Retroalimentación

Consideramos un nacimiento pretérmino a aquel que se produce antes de completar la semana 37.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), es cierto que:

Seleccione una:

- a. Exige la presencia de temperatura rectal $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ o inferior a 36°C .
- b. Es una respuesta del organismo frente a un agente agresor.
- c. A y B son falsas.
- d. A y B son ciertas. ✓

Retroalimentación

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS): respuesta del organismo frente a un agente agresor. Exige la presencia de temperatura rectal $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ o inferior a 36°C , página 19 del temario.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En cuál de las siguientes situaciones se debería valorar la intubación traqueal de inicio durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Recién nacido con líquido teñido de meconio no vigoroso.
- b. Recién nacido con gastrosquisis no vigoroso. ✓
- c. Recién nacido pretérmino no vigoroso.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Recién nacido con gastrosquisis no vigoroso. Si el recién nacido con gastrosquisis requiere algún tipo de soporte respiratorio se procederá a la intubación oro-traqueal, evitando la administración de VPPI, para evitar la distensión del paquete intestinal.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a las características anatomofisiológicas del recién nacido sano:

Seleccione una:

- a. Peso (2.500-4.000grs), talla (45-53 cm) y perímetro craneal (33-38 cm).
- b. El cordón umbilical debe tener dos venas y una arteria, rodeadas de gelatina de Wharton. ✓
- c. Presenta flexión de las cuatro extremidades con resistencia a su extensión pasiva y ligera abducción de caderas.
- d. Puede presentar acabalgamiento de suturas.

Retroalimentación

El cordón umbilical debe tener dos arterias y una vena, rodeadas de gelatina de Wharton.

Pregunta 12

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué otro término podemos definir la restricción del crecimiento intrauterino tipo II? Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Simétrico.
- b. Asimétrico.
- c. Armónico.
- d. A y C son correctas. ✗

Retroalimentación

Podemos clasificar el CIR en dos tipos; Tipo I, simétrico o armónico, y tipo II., asimétrico disarmónico.

Pregunta 13

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes cardiopatías congénitas, ¿cuál de ellas podría cursar con una cianosis severa?

Seleccione una:

- a. Coartación de aorta.
- b. Estenosis pulmonar.



c. Ductus arterioso persistente.



d. Todas son correctas. **X**

Retroalimentación

Las cardiopatías que afectan al circuito pulmonar pueden cursar con cianosis marcada. La respuesta correcta es: estenosis pulmonar.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un signo característico de la piel de un recién nacido?

Seleccione una:



a. Púrpura trombocitopénica.



b. Mancha mongólica o de Baltz.



c. Millium facial.



d. Todos son signos característicos de la piel de un RN. **X**

Retroalimentación

La púrpura trombocitopénica es debida a un déficit de plaquetas.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si durante la reanimación de recién nacido a término al tercer minuto de vida, valoramos que presenta respiración espontánea con ligera dificultad y la FC inferior a 100 lpm, ¿Cuál de las siguientes acciones sería la correcta?

Seleccione una:



a. Realizar contacto piel con piel y realizar cuidados de rutina.



b. Administrar oxígeno indirecto.



c. Colocar pulsioxímetro y valorar colocar CPAP.



d. Colocar pulsioxímetro y realizar ventilaciones con presión positiva intermitente. **X**

Retroalimentación

Colocar pulsioxímetro para valorar la oxigenación y valoraremos colocar cpap. Ver figura 8

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala de los siguientes signos cuál es considerado una característica anatomafisiológicas del recién nacido sano:

Seleccione una:

- a. Caput succedaneum.
- b. Eritema tóxico.
- c. Signo del Arlequín.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Ver tema 7, características anatomofisiológicas del RN sano.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es el principal mecanismo de producción de calor en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Termogénesis de la grasa magra.
- b. Termogénesis de la grasa parda. ✓
- c. Termogénesis tiritante.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

A diferencia del adulto, en el neonato la capacidad de producción de calor mediante el escalofrío no está presente. El mecanismo más eficaz de producción de calor al nacimiento es la termogénesis mediada por la oxidación de adipocitos de grasa parda.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de estímulo que favorece el inicio de la primera respiración?

Seleccione una:

- a. Estímulos físicos.
- b. Estímulos térmicos. **X**
- c. Estímulos mecánicos.
- d. Estímulos sensoriales.

Retroalimentación

Cuatro categorías de estímulos influyen en el desarrollo de la primera respiración: estímulos químicos, sensoriales, térmicos y mecánicos.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. En la valoración inicial evaluaremos el estado del bebé por medio de dos preguntas clave.
- b. En la evaluación inicial de la reanimación valoraremos dos parámetros que son la frecuencia cardíaca y la respiración. **✓**
- c. Tomaremos el pulso en la base del cordón umbilical.
- d. Colocaremos el pulsioxímetro en la mano izquierda (preductal)

Retroalimentación

En la valoración inicial se realizan tres preguntas, tomar el pulso en la base del cordón umbilical esta desaconsejado y el pulsioxímetro se coloca en la mano derecha (preductal). Por lo que la única respuesta correcta es: en la valoración inicial de la reanimación valoraremos dos parámetros que son la frecuencia cardíaca y la respiración.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes premisas es incorrecta con respecto al líquido amniótico teñido de meconio?

Seleccione una:

- a. El estrés hipóxico fetal estimula la expulsión de meconio y los movimientos de gasping producen su aspiración intraútero.
- b. No se conocen exactamente las causas por las cuales el meconio pasa al líquido amniótico.
- c. La presencia de líquido amniótico teñido de meconio indica que se ha producido un síndrome de aspiración meconial. ✓
- d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

La presencia de líquido teñido no indica necesariamente que se haya producido un SAM, ya que sólo lo desarrollarán un 5% de los recién nacidos con líquido teñido.

¿En cuál de las siguientes situaciones se debería valorar la intubación traqueal de inicio durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- a. Recién nacido con líquido teñido de meconio no vigoroso.
- b. Recién nacido con hernia diafragmática no vigoroso. ✓
- c. Recién nacido pretérmino no vigoroso.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Ante la sospecha o diagnóstico prenatal de hernia diafragmática se debe intubar al paciente para su correcta ventilación, evitando la administración de ventilación con mascarilla que podría empeorar la clínica.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de neonato con sospecha de hernia diafragmática, de las siguientes acciones, señala la que estaría indicada:

Seleccione una:

- a. Colocación de sonda orogástrica.
- b. Intubación orotraqueal.
- c. Colocación pulsioximetría en mano derecha (preductal)
- d. Todas las anteriores estarían indicadas. ✓

Retroalimentación

Ver tema 5, apartado hiena diafragmática congénita.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes premisas es incorrecta con respecto al líquido amniótico teñido de meconio?

Seleccione una:

- a. El estrés hipóxico fetal estimula la expulsión de meconio y los movimientos de gasping producen su aspiración intraútero.
- b. No se conocen exactamente las causas por las cuales el meconio pasa al líquido amniótico.
- c. La presencia de líquido amniótico teñido de meconio indica que se ha producido un síndrome de aspiración meconial. ✓
- d. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

La presencia de líquido teñido no indica necesariamente que se haya producido un SAM, ya que sólo lo desarrollarán un 5% de los recién nacidos con líquido teñido.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un signo característico de la piel de un recién nacido?

Seleccione una:

- a. Púrpura trombocitopénica. ✓
- b. Mancha mongólica o de Baltz.

- c. Millium facial.
- d. Todos son signos característicos de la piel de un RN.

Retroalimentación

La púrpura trombocitopénica es debida a un déficit de plaquetas.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de estímulo que favorece el inicio de la primera respiración?

Seleccione una:

- a. Estímulos físicos. ✓
- b. Estímulos térmicos.
- c. Estímulos mecánicos.
- d. Estímulos sensoriales.

Retroalimentación

Cuatro categorías de estímulos influyen en el desarrollo de la primera respiración: estímulos químicos, sensoriales, térmicos y mecánicos.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es el principal mecanismo de producción de calor en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. Termogénesis de la grasa magra.
- b. Termogénesis de la grasa parda. ✓
- c. Termogénesis tiritante.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

A diferencia del adulto, en el neonato la capacidad de producción de calor mediante el escalofrío no está presente. El mecanismo más eficaz de producción de calor al nacimiento es la termogénesis mediada por la oxidación de adipocitos de grasa parda.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes signos vitales estaría alterado en el caso de este recién nacido a término?

Seleccione una:

- a. Frecuencia cardíaca de 102 lpm.
- b. Frecuencia respiratoria de 55 rpm.
- c. Temperatura de 36°C. ✓
- d. Tensión arterial media de 42 mmHg.

Retroalimentación

La frecuencia cardíaca (FC) oscila, generalmente, entre 100 y 160 latidos por minuto (lpm), la frecuencia respiratoria (FR) entre 40/60 respiraciones por minuto (rpm) y la temperatura entre 36'5 y 37'5°C. Con respecto a la tensión arterial media se considera como óptima, la medición sea igual o superior a las semanas de gestación.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos cambios fisiológicos en el neonato es incorrecto con respecto a la etapa de transición a la vida extrauterina?

Seleccione una:

- a. Aumento de la perfusión pulmonar producido por la entrada de aire a los alvéolos (llenos de líquido en la etapa fetal), y por consiguiente, vasodilatación arterial.
- b. Cierre del ductus arterioso.
- c. Cierre del foramen oval.
- d. Aumento de las resistencias pulmonares debido a la vasodilatación alveolar. ✓

Retroalimentación

Se produce un descenso de las resistencias pulmonares debido a la expansión del alveolo y la vasodilatación alveolar.

Pregunta 9

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Valorando una correcta medición de la saturación preductal al minuto de vida, ¿Qué rango de saturación consideramos como correcta al minuto del nacimiento?

Seleccione una:

- a. 60-80%
- b. 85-90% **X**
- c. 75-90%
- d. 90-97%

Retroalimentación

Los niveles de saturación de oxígeno al minuto de vida es de 60-80%.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué otro término podemos definir la restricción del crecimiento intrauterino tipo I? Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Simétrico.
- b. Asimétrico.
- c. Armónico.
- d. A y C son correctas. **✓**

Retroalimentación

Podemos clasificar el CIR en dos tipos: simétrico, armónico o de tipo I.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un signo característico de la piel de un RN?

Seleccione una:

- a. Presencia de vérnix caseosa.
- b. Mancha mongólica o de Baltz.
- c. Millium facial.
- d. Todos son signos característicos de la piel de un RN. ✓

Retroalimentación

Ver tema 7, características anatomofisiológicas del RN sano.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes cardiopatías congénitas, ¿cuál de ellas podría cursar con una cianosis severa?

Seleccione una:

- a. Coartación de aorta.
- b. Estenosis pulmonar. ✓
- c. Ductus arterioso persistente.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Las cardiopatías que afectan al circuito pulmonar pueden cursar con cianosis marcada. La respuesta correcta es: estenosis pulmonar.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala de los siguientes signos cuál es considerado una característica anatomafisiológicas del recién nacido sano:

Seleccione una:

- a. Caput succedaneum.
- b. Eritema tóxico.
- c. Signo del Arlequín. **X**
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Ver tema 7, características anatomofisiológicas del RN sano.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta en lo que refiere a las medidas para la prevención de las infecciones nosocomiales.

Seleccione una:

- a. Vacunación del personal sanitario.
- b. La lactancia materna no influye en la prevención de la infección nosocomial. **✓**
- c. Lavado de manos con soluciones alcohólicas.
- d. Proyecto Bacteriemia 0.

Retroalimentación

La lactancia materna se ha asociado a una disminución del riesgo de infección y de enterocolitis necrosante en prematuros.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. Se debe reevaluar al neonato cada 30 segundos.



b. Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36 y 37°C. ✓



c. En recién nacidos a término se recomienda comenzar las maniobras de reanimación con una FiO₂ del 21%.



d. La aspiración de secreciones se realizará solamente si es estrictamente necesario.

Retroalimentación

Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36.5 y 37.5°C.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta. Durante la etapa fetal, la sangre procedente de la placenta regresa al cuerpo fetal a través de:

Seleccione una:



a. La arteria umbilical conectada a la vena cava inferior.



b. Las arterias umbilicales conectadas a las arterias femorales.



c. Las venas umbilicales conectadas a las arterias femorales.



d. La vena umbilical conectada a la vena cava inferior. ✓

Retroalimentación

La sangre oxigenada regresa al cuerpo fetal a través de la vena umbilical procedente de la placenta conectadas a la vena cava inferior a través del ductus venoso.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para realizar una correcta ventilación con mascarillas debemos abrir la vía aérea. ¿Cuál de las siguientes acciones es correcta?

Seleccione una:



a. Realizar un sellado boca-nariz ✓



b. Colocaremos la cabeza en posición neutra o hiperextensión.



c. Mantendremos la boca cerrada ya que los neonatos son respiradores nasales.



d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Para una correcta ventilación se debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea, se colocará la cabeza en posición neutra o ligera hiperextensión, se abrirá la boca y, sellando boca-nariz, comenzaremos la ventilación.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto al test de Apgar:

Seleccione una:

- a. Se realiza al minuto y a los cinco minutos de vida del recién nacido.
- b. Posteriormente, se puede realizar cada cinco minutos hasta los quince minutos de vida. ✓
- c. Lo puede realizar un médico.
- d. Lo puede realizar una enfermera.

Retroalimentación

El test de Apgar se realiza al minuto y a los cinco minutos, pudiendo repetirse a los diez minutos.

Pregunta 19

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Coincidiendo con qué suceso podría presentar clínica un neonato afectado por una coartación de aorta que no dispone de diagnóstico prenatal?

Seleccione una:

- a. Cierre del foramen oval. ✗
- b. Cierre del ductus venoso.
- c. Cierre del ductus arterial.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

En caso de no tener diagnóstico prenatal, puede presentar un debut clínico brusco con shock y acidosis metabólica en las primeras 72h, coincidiendo con el cierre espontáneo del ductus.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué material NO es necesario tener preparado para un parto pretérmino?

Seleccione una:

- a. Cuna de calor radiante precalentada previamente. **X**
- b. Laringoscopio con pala del número 1 y tubo endotraqueal del número 4.0.
- c. Toma de aspiración de secreciones que funciona correctamente.
- d. Bolsa autoinflable o sistema de ventilación que permita dar una presión soporte entre 20-25 cm H2O y PEEP de 5 cm H2O.

Retroalimentación

En caso de pretérminos se ha de preparar laringoscopio con pala del nº0 y 00 y TOT del número del 2 al 3.5.

CASO CLINICO

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Recién nacido de 27 semanas de edad gestacional, parto producido por rotura prematura de membranas, madurado con dos dosis de corticoides intraútero. Al minuto de nacimiento presenta: cianosis generalizada, frecuencia cardíaca aproximada de 80 latidos por minuto, respiración lenta e irregular, hipotonía generalizada y hace alguna mueca.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál será la puntuación en el test de Apgar al minuto de vida en el caso anterior?

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3 ✓
- c. 4
- d. 5

Retroalimentación

Ver tabla del test de Apgar. (Figura 7)

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. En "el minuto de oro", evaluaremos el estado del bebé por medio de tres preguntas clave.
- b. Colocar pulsioxímetro en miembro superior izquierdo: preductal. ✓
- c. En neonatos que requieran reanimación no hay suficiente evidencia para recomendar retrasar el pinzamiento del cordón.
- d. El ordeño o "milking" está contraindicado en menos de 28 semanas de gestación.

Retroalimentación

El pulsioxímetro preductal debe colocarse en el miembro superior derecho.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- a. Se debe reevaluar al neonato cada 30 segundos.
- b. Se reevaluará mediante la valoración de la respiración y la frecuencia cardíaca.



c. La aspiración de secreciones se realizará solamente si es estrictamente necesario.



d. Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36 y 37°C. ✓

Retroalimentación

Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36.5 y 37.5°C.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta con respecto a los cuidados de la piel del gran prematuro:

Seleccione una:



a. Realizar cambios posturales frecuentes.



b. Usar colchones de gel.



c. Usar clorhexidina acuosa para la desinfección de la piel en vez de soluciones alcohólicas.



d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

Ver tema 8 paciente prematuro, apartado "manejo inicial del gran prematuro".

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto al manejo inicial del gran prematuro?

Seleccione una:



a. Se debe limitar la exposición a un exceso de oxígeno siguiendo los rangos recomendados de saturación de oxígeno (92-98%).



b. Se aconseja el inicio de nutrición parenteral en las primeras 2 horas de vida, y de la nutrición enteral (leche materna siempre que se disponga de ella) en las primeras 48 horas. ✓



c. Se recomienda administrar surfactante en aquellos prematuros que presenten sintomatología en sala de partos.



d. Siempre que se pueda se realizará el transporte postnatal, ya que esto ha demostrado reducir la morbimortalidad.

Retroalimentación

Ver tema 8 paciente prematuro.

[Finalizar revisión](#)