

EXAMEN FINAL: Generalidades en urgencias pediátricas para TCAE

¿Cuál es el objetivo del triaje pediátrico?

Seleccione una:

- ☒ a. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☒ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ c. Diagnosticar la enfermedad del niño.
- ☒ d. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☒ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las razones para realizar un traslado intrahospitalario pueden ser todas excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. Para llevarlo a quirófano para la realización de una intervención urgente.
- ☒ b. Para la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentran dentro de la unidad de urgencias, (RNM, Rx, TAC...).
- ☒ c. Para su ingreso en una planta de hospitalización
- ☒ d. Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para su ingreso en otro hospital de referencia de nivel superior

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☒ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- ☐ a. El procedimiento a realizar.
- ☐ b. La identificación del paciente.
- ☐ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.
- ☐ b. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.
- ☐ c. Informar a admisión de su traslado.
- ☐ d. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado:

Seleccione una:

- ☐ a. Comunicación y coordinación previa.

- ☐ b. El personal adecuado para el acompañamiento.
- ☐ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. El material adecuado para el traslado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- ☐ a. MAT.
- ☐ b. ESI.
- ☐ c. PETAS.
- ☐ d. CTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la velocidad de las compresiones torácicas en un niño?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ b. 70 - 90 lpm.
- ☐ c. 90 - 100 lpm.
- ☐ d. 110-120 lpm.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-120 lpm.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño está inconsciente, ¿qué es lo primero que debemos verificar?:

Seleccione una:



a. La presencia de pulso.



b. La permeabilidad de la vía aérea.



c. La ausencia de respiración.



d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La permeabilidad de la vía aérea.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo no se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo?

Seleccione una:



a. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido.



b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.



c. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación.



d. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada?

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones son correctas.



b. Vía venosa central.



c. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.



d. Vía intraósea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos?

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. Son completamente distintas.



c. No hay diferencias fundamentales entre ambas.



d. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. 4 J/kg.
- ☐ b. 9 J/Kg.
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. 5 J/Kg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/kg.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Bradipnea.
- ☐ b. Polipnea.
- ☐ c. Todas las opciones son incorrectas.
- ☐ d. Taquipnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño no respira cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Sintamos su respiración al acercar la mejilla a su cara.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Oigamos su respiración.
- ☐ d. Su tórax se expande con regularidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una otalgia, ¿cuál es la principal patología a descartar?

Seleccione una:

- ☐ a. Mastoiditis.
- ☐ b. Otitis media aguda.
- ☐ c. Faringoamigdalitis.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mastoiditis.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

☐ c. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

☐ d. Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con un niño con sospecha de neumonía, dentro de la sala de observación. ¿Cuál de estos cuidados no debemos realizar?

Seleccione una:

☐ a. Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

☐ b. Es importante mantener la temperatura en valores normales, ya que por cada grado que se aumenta la misma, se incrementa la FR en 4-6rpm.

☐ c. Todas las opciones son correctas.

☐ d. Realizar lavados nasales o aspiración de secreciones en caso de ser necesario para favorecer la expectoración de secreciones y mantener las vías aéreas libres, y siempre antes de las tomas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocaremos al niño en posición decúbito supino.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria?

Seleccione una:

- ☐ a. Picor intenso.
- ☐ b. Deshidratación.
- ☐ c. Edad del paciente.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad del paciente.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para elegir el adecuado tamaño de la cánula orofaríngea mediremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.
- ☐ b. Desde la comisura del labio al parte posterior de la oreja.
- ☐ c. El calibre va en función de la edad.
- ☐ d. No hace falta medir nada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué se utiliza para abrir la vía aérea?

Seleccione una:

- ☐ a. Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.
- ☐ b. Siempre tracción mandibular.
- ☐ c. Siempre subluxación de mandíbula.

- ☐ d. Siempre la maniobra frente-mentón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una maniobra u otra en función de la sospecha del origen de la inconsciencia.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?
Seleccione una:

- ☐ a. Intoxicación por anticonvulsivos
- ☐ b. Intoxicación por antitérmicos.
- ☐ c. Intoxicación por AAS
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas, ¿cuáles no aparecen en una intoxicación etílica?
Seleccione una:

- ☐ a. Depresión del SNC.
- ☐ b. Gastritis aguda.
- ☐ c. Hiperglucemia.
- ☐ d. Hipotermia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica?

Seleccione una:



a. Accidentes de tráfico.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Heridas.



d. Ahogamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, ¿cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada?

Seleccione una:



a. Lund y Browder.



b. Ninguna de las opciones es correcta.



c. Glasgow.



d. PIPP.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica?

Seleccione una:

- ☐ a. Intoxicaciones por productos del hogar.
- ☐ b. Intoxicaciones por antitérmicos.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Intoxicaciones por monóxido de carbono.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicaciones por antitérmicos.

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cada cuánto tiempo comprobaremos la eficacia de las maniobras en una RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Cada minuto.
- ☐ b. No hace falta comprobar nada.
- ☐ c. Cada 10 minutos.
- ☐ d. Cada 5 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada minuto.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- ☐ d. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno, indique la correcta:
Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ b. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- ☐ b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☐ c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- ☐ b. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- ☐ c. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.