

CUIDADOS AL NIÑO EN LOS ACCIDENT...

Página Principal / AV.P011_1 / Evaluación Octubre / Prueba de conocimi...

Comenzado el	viernes, 14 de octubre de 2022, 10:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 14 de octubre de 2022, 10:20
Tiempo empleado	12 minutos 27 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

PREGUNTA 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué tipo de analgésico sistémico emplearemos ante un paciente con dolor intenso?

Seleccione una:

- a. Metamizol.
- b. Opioides. ✓
- c. Ibuprofeno



- c. Isopropileno.
- d. Midazolam.

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



En un TCE el daño cerebral secundario y terciario, puede producirse:

Seleccione una:

- a. Como consecuencia de alteraciones intracerebrales, como la presencia de crisis convulsivas precoces, o edema intracerebral. ✓
- b. Por complicaciones sistémicas como aumento de la oxigenación, o descenso de la temperatura, entre otros.
- c. a y b son incorrectas.
- d. Todas son correctas.

El daño cerebral secundario y terciario, puede producirse: Como consecuencia del efecto de lesiones externas al parénquima cerebral, como las hemorragias subdurales y epidurales que provocan un aumento de la presión intracraneal. Como consecuencia de alteraciones intracerebrales como la presencia de crisis epilépticas precoces, o edema intracerebral. O por complicaciones sistémicas que pueden ocurrir en el TCE, como el descenso de la tensión arterial (hipotensión arterial), el descenso de la oxigenación (hipoxemia), o el aumento de la temperatura (hipertermia) entre otros.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



Durante la colocación del tablero espinal ¿quién coordinará la maniobra?

Seleccione una:

- a. El rescatador que se encuentra a los pies del paciente.
- b. El rescatador que se encuentra a la cabeza del paciente. ✓

- a. El resucitador, que se enciende a la cabeza del paciente.
- b. El resucitador, que se enciende a la boca del paciente.
- c. Cualquiera puede hacerlo.
- d. Ninguna es correcta.

PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué factores determinan la gravedad de un paciente electrocutado?

Seleccione una:

- a. La magnitud de la energía recibida.
- b. El voltaje.
- c. El tiempo de contacto con la fuente de energía.
- d. Todas son correctas. ✓

PREGUNTA 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Nos encontramos un paciente, con intoxicación etílica, que ha ingerido, hace menos de una hora, más de 1gr/Kg de alcohol. ¿Qué sería lo indicado en este caso?

Seleccione una:

- a. Administración de Flumacenilo IV.
- b. Lavado gástrico.
- c. Administración de carbón activado.
- d. Todas son correctas. ✗

El carbón activado no es efectivo. En casos leves, sin alteración del nivel de conciencia: toma de constantes vitales, descartar hipoglucemia, colocar al paciente en decúbito lateral



de constantes vitales, buscar hipoglucemia, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y evaluar repetidamente el nivel de conciencia. Si el nivel de etanolemia estimado es mayor de 100mg/dl o la ingesta estimada es mayor de 1gr/kg y mas reciente de una hora, o si existe pérdida de conciencia o de reflejos, estaría indicado el lavado gástrico.

PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué complicaciones podemos encontrar en un paciente con una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- a. Hipotermia.
- b. Hipotensión.
- c. Hipoglucemia.
- d. Todas son correctas. ✓



PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué analgésico emplearemos ante un dolor intenso?

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Metamizol.
- c. Fentanilo. ✓
- d. Ibuprofeno.



PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué analgésico emplearemos ante un dolor moderado como primera opción?

Seleccione una:

- a. Metamizol. ✓
- b. Paracetamol.
- c. Ibuprofeno.
- d. Fentanilo.

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Son signos de obstrucción de la vía aérea superior: Señale la respuesta CORRECTA:

Seleccione una:

- a. Taquipnea.
- b. Escasa elevación torácica.
- c. Cianosis, babeo, tos o disociación toracoabdominal.
- d. Todas son correctas. ✓

PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



Señale la definición de ANALGESIA:

Seleccione una:

- a. Aliviar el dolor sin inducir alteraciones del estado mental. ✓
- b. Inducir al paciente un estado que le permita tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales.
- c. Disminución del temor en relación a una situación dada, sin alterar el estado mental.
- d. Ninguna es correcta.

La opción B es la definición de SEDACIÓN y la C es la definición de ANSIOLOSIS.

PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué es la Salmonelosis?

Seleccione una:

- a. Un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Sallmonela. ✓
- b. Un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria Costridium.
- c. Ninguna es correcta.
- d. Todas son correctas.



PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En un paciente con agitación psicomotriz por intoxicación etílica, ¿qué fármaco podemos administrar?

Seleccione una:

- a. Ketamina.
- b. Fentanilo.
- c. Haloperidol. ✓
- d. Tramadol.

Si existe agitación psicomotriz que impide el adecuado manejo del paciente, administrar Haloperidol 2,5mg IM si el paciente es menor de 2 años, o 5mg IM en mayores de 2 años. Ante administración de sedación al paciente o disminución del nivel de conciencia, asegurar siempre la vía aérea.

PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes sería una dosis tóxica de paracetamol en niños?

Seleccione una:

- a. 10 ml.
- b. 100 mg.
- c. 140mg/kg. ✓
- d. 80mg/kg.

PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- a. Hematoma subdural
- b. Hematoma epidural
- c. Hemorragia subaracnoidea

- d. Todas son correctas. ✓

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Para qué sirve la ventana trasera del collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Para valorar presencia de pulso.
- b. Para visualizar ingurgitación yugular.
- c. Valorar presencia de hematoma en la base del cráneo. ✓
- d. Para ajustar la talla en función del cuello del paciente.

PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Ante la sospecha de una lesión cervical tras un TCE, ¿qué medidas debemos tomar?

Seleccione una:

- a. Pediremos al paciente que movilice el cuello para comprobar si le duele.
- b. Inmovilizar con collarín cervical rígido e inmovilizador de cabeza. ✓
- c. Es suficiente la colocación de collarín cervical, ya que se inmoviliza y se alinea cabeza-cuello-tronco.
- d. No tomaremos ninguna medida hasta resolver los problemas a consecuencia de TCE, ya que el TCE es prioritario.

Ante la sospecha de una lesión cervical en todo momento debe mantenerse la alineación cabeza-cuello-tronco, evitando los movimientos de flexoextensión (con collarín cervical



rigido) y/o rotación (inmovilizador de cabeza – “dama de elche”). La columna cervical se inmovilizará en caso de traumatismo debido a mecanismo violento, caídas desde una altura mayor de un metro, accidentes de tráfico, etc. hasta demostrar su indemnidad.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



“Inducir un estado que permita al paciente tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales”. Esta definición pertenece a:

Seleccione una:

- a. Analgesia.
- b. Ansiolisis.
- c. Sedoanalgesia.
- d. Sedación. ✓

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Acude a su servicio de urgencias un niño de 2 años que presenta una escaldadura en tórax tras echarse encima accidentalmente un plato de sopa. Presenta eritema en la zona y por el llanto continuo sospechamos dolor intenso. ¿Como clasificaríamos esta lesión?

Seleccione una:

- a. Quemadura de primer grado. ✓
- b. Quemadura de segundo grado tipo A.
- c. Quemadura de segundo grado tipo B.
- d. Quemadura de tercer grado.



Clasificación de las quemaduras según profundidad.

Grado	Aspecto	Afectación	Dolor	Curación
Primero	Eritema	Epidermis	Intenso	Espontánea, no secuelas.

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



¿Qué medidas debemos tener en cuenta ante un paciente quemado?

Seleccione una:

- a. Sondaje vesical para control de diuresis.
- b. Soporte psicológico del niño y de sus padres.
- c. Vigilar la deprivación del sueño y el prurito, ya que son secuelas frecuentes.
- d. Todas son correctas. ✓

PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



Según la extensión de las quemaduras debemos valorar la superficie corporal quemada (SCQ) de un niño de 5 años que presenta quemaduras en ambos brazos:

Seleccione una:

- a. SCQ 12%
- b. SCQ 36%
- c. SCQ 18% ✓
- d. SCQ 20a%

Valoración de la extensión de las quemaduras según edad.



Finalizar revisión



◀ Inmovilización:
Colchón de vacío

Ir a...



Curso: Paciente
pediátrico en los
accidentes ▶

Navegación por el cuestionario



Finalizar revisión

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas

