

Módulo 1:

1. Durante el embarazo la mujer experimenta un aumento fisiológico de la volemia que se caracteriza por:

b Un incremento del volumen plasmático, lo que origina un estado conocido como “anemia fisiológica del embarazo”

2. Que afirmación de las siguientes es correcta:

b. A partir de la semana 20 de gestación, si la embarazada permanece en decúbito supino puede presentar un cuadro de hipotensión por compresión de la vena cava inferior

3. Una forma rápida de calcular aproximadamente la edad gestacional es valorando la altura del fondo uterino. Señale de las siguientes afirmaciones la correcta:

d. b y c son correctas

4. Sospecharemos que una mujer puede presentar una preeclampsia cuando:

d La paciente no refiere clínica. Con una edad gestacional de 33 semanas, presenta una TA de 145/95mmhg. Realizamos test de orina con una tira reactiva, evidenciando la presencia de proteinuria

5. Consideramos un parto como normal (eutócico) cuando:

c. la edad gestacional se encuentra entre las 37 y 42 semanas, el neonato tiene un peso de entre 2500-4000gr, hay buena adaptación respiratoria neonatal, salida completa de la placenta y ausencia de metrorragia postparto

Módulo 2:

1. Durante el embarazo la mujer experimenta un aumento fisiológico de la volemia que se caracteriza por:

b Un incremento del volumen plasmático, lo que origina un estado conocido como “anemia fisiológica del embarazo”

2. Que afirmación de las siguientes es correcta:

d todas son ciertas

3. Que afirmación de las siguientes es correcta:

b. A partir de la semana 20 de gestación, si la embarazada permanece en decúbito supino puede presentar un cuadro de hipotensión por compresión de la vena cava inferior

4. ¿Por qué la mujer embarazada tiene mayor riesgo de sufrir una caída?

c. a y b son ciertas

Módulo 3:

1. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

d. todas son ciertas

2. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

c. la clínica habitual de un embarazo ectópico son rotura tubárica, es un dolor intenso, irritación peritoneal y alteración hemodinámica

3. Una forma rápida de calcular aproximadamente la edad gestacional es valorando la altura del fondo uterino. Señale de las siguientes afirmaciones la correcta.

d. b y c son correctas

4. Ante una hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo, deberemos:

d. todas son correctas

5. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

b. la causa de sangrado mas frecuente en la 2º mitad del embarazo es la de la placenta previa

Módulo 4:

1. Sospecharemos que una mujer puede presentar una preeclampsia cuando:

d. la paciente no refiere clínica. Con una edad gestacional de 33 semanas, presenta una TA: 145/95mmhg, realizamos test de orina con tira reactiva, evidenciando la presencia de proteinuria

2. El tratamiento definitivo de una hipertensión inducida por el embarazo es:

d. finalizar la gestación

3. Nos referimos a la eclampsia cuando:

c. aparecen convulsiones en el contexto de una hipertensión inducida por el embarazo

4. ¿Que factores maternos están vinculados a un mayor riesgo de tener una preeclampsia?

b. nuliparidad, gestación gemelar y presencia de diabetes gestacional

Módulo 5:

1. Consideramos un parto como normal (eutócico) cuando:

c. la edad gestacional se encuentra entre las 37-42 semanas, el neonato tiene un peso de entre 2500-4000gr hay buena adaptación respiratoria neonatal, salida completa de la placenta y ausencia de metrorragia postparto

2. Como medidas generales en caso de atender un parto extrahospitalario, tenemos:

d. todas son ciertas

3. De las siguientes afirmaciones referentes a la atención al parto, señale la correcta:

d. lo mas recomendable es poner al neonato sobre el pecho materno (piel con piel), mientras lo secamos y fricciamos suavemente

4. Respecto al test de APGAR que se realiza al neonato tras su nacimiento, señale la correcta.

a. evalua los 5 parámetros: FC, respiración, tono muscular, reflejos neonatales y coloración

5. El riesgo de hemorragia postparto siempre está presente durante la fase de alumbramiento. Como medidas para prevenir la hemorragia postparto podemos:

d. todas son correctas

Modulo 6:

1.¿Como se inmovilizará a una gestante de 35 semanas y politraumatizada para su traslado al centro hospitalario?

c. se inmovilizará sobre un colchón de vacio, en decúbito lateral izquierdo y con férula cervical aunque no presente daños a nivel cervical

2. Entre las lesiones que una gestante puede presentar tras sufrir un traumatismo abdominal figuran:

d todas son correctas

3. Señale la afirmación correcta:

b. un traumatismo cerrado muy frecuente es el ocasionado por el cinturón de seguridad y/o airbag en caso de accidente de tráfico

4. Señale la afirmación correcta:

d todas son correctas

Módulo 7:

1. De los siguientes enunciados, señale el correcto:

b. el SHO esta producido fundamentalmente por la administración exógena de la hCG, por lo que es considerado una complicación casi exclusivamente iatrogénica

2. Todas las mujeres sometidas a un tratamiento de fertilidad tienen riesgo de sufrir una hiperestimulación ovárica, sin embargo, podemos detectar unos factores que incrementan este riesgo. De los siguientes factores de riesgo señale el incorrecto:

c. edad . mujeres de 40 años presentan un mayor riesgo de desarrollar SHO tras el ciclo de la estimulación

3. En referencia al diagnóstico del SHO, señale el enunciado correcto:

d. el SHO leve, se caracteriza por clínica abdominal inespecifica (náuseas, vómitos, distensión abdominal) y su tratamiento suele ser ambulatorio

4. La importancia desde el punto de vista sanitario del SHO radica en las potenciales complicaciones que pueden surgir en mujeres jóvenes y sanas. ¿Qué complicaciones pueden aparecer en una gestante diagnosticada de SHO?

d. todas son correctas

5. En referencia al tratamiento, señale el enunciado correcto:

d. todas son correctas

6. De los siguientes enunciados, señale el correcto:

d . b y c son correctas

Modulo 8:

1. El soporte vital en una gestante es prácticamente similar al soporte vital en un adulto normal, pero es importante tener en cuenta unas pequeñas modificaciones como son:

d. todas son correctas

2. En relación al soporte vital en una gestante, señalar cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

b. la intubación endotraqueal temprana permite reducir el riesgo de broncoaspiración

3. En relación al soporte vital en una gestante, señalar cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

d. todas son correctas

