Comenzado el	
Estado	
Finalizado en	
Tiempo empleado	
Puntos	23,00/24,00
Calificación	**9,58** de 10,00 (**96%**)
Comentario -	Buen trabajo - Continua con el curso

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	

Finalizar revisión

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Aquella lesión que se produce con pérdida de sustancia cutánea sobre una piel afectada por una dermatitis de estasis, secundaria a una insuficiencia venosa crónica, se denomina:

Seleccione una:
- a. Úlcera venosa ✓
- b. Úlcera por éstasis
- c. Úlcera por presión
- d. Úlcera arterial

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Con respecto a la localización más frecuente de las UPP:

Seleccione una:
- a. Su localización habitual es en las prominencias óseas ✓
- b. Ninguna es correcta
- c. La zona lumbo- sacra es es la zona más frecuente
- d. Todas son correctas

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación a las escalas de valoración del riesgo de UPP:

Seleccione una:
- a. En la Escala Nova 5 se valora la incontinencia, el estado mental, la ingesta, la movilidad y el estado general
- b. La Escala de Norton no valora la incontinencia
- c. En la Escala de Norton la puntuación mínima es cero.
- d. En la Escala de Norton el riesgo máximo de UPP se puntúa como 5 ✓

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Dolor intenso, palidez, frialdad, parestesias, ausencia de pulsos pedios y claudicación intermitente, son signos y síntomas de:

Seleccione una:
- a. Las opciones a y b son correctas.
- b. Opción a: Arteriosclerosis en miembros inferiores ✓
- c. Opción c: Insuficiencia venosa
- d. Opción b: Insuficiencia venosa crónica

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El índice tobillo-brazo (ITB), se calcula:

Seleccione una:
- a. Dividiendo la PAS más baja de las arterias pedia y tibial posterior entre la cifra de PAS más alta de los dos brazos.
- b. Dividiendo la PAS más baja de las arterias pedia y tibial anterior entre la cifra de PAS más alta de los dos brazos.
- c. Dividiendo la PAS más alta de las arterias braquial y tibial posterior entre la cifra de PAS más alta de los dos brazos.
- d. Dividiendo la PAS más alta de las arterias pedia y tibial posterior entre la cifra de PAS más alta de los dos brazos. ✓

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El monofilamento de Semmes Weinstein 5.07-10 g es un filamento de nylon unido a un mango:

Seleccione una:
- a. El monofilamento se aplica en la superficie plantar, en la falange distal del primer dedo, y en la cabeza del primer y quinto metatarsiano ✓
- b. Si el paciente detecta ≤3 se considera un pie normal
- c. Al aplicarlo sobre la piel y doblarse aplica una presión constante de 5.070 g independientemente de la fuerza que se ejerza
- d. Sirve para medir la sensibilidad profunda

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El tratamiento de las úlceras tumorales está dirigido a:

Seleccione una:
- a. Desbridamiento
- b. Epitelización
- c. Limpieza intensa
- d. Control de síntomas ✓

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la aparición de las UPP intervienen:

Seleccione una:
- a. Factores internos como desequilibrios nutricionales o enfermedades concurrentes
- b. Factores externos como hábitos tóxicos, ropa de cama inadecuada o falta de higiene.
- c. Todas son correctas ✓
- d. Fuerzas de presión, fricción y tracción

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En personas de piel oscura las UPP de grado I se pueden detectar por:

Seleccione una:
- a. Edemas
- b. Aparición de calor local
- c. Decoloración o color violáceo
- d. Todas son correctas ✓

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En una úlcera venosa crónica, no suele estar presente el siguiente signo:

Seleccione una:
- a. Ausencia de pulsos ✓
- b. Hiperpigmentación
- c. Dermatitis ocre
- d. Atrofia blanca

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La clasificación de Wagner:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✓
- b. Se refiere al grado V como gangrena extensa
- c. Se utiliza para el pie diabético
- d. Establece grados del 0 al 5

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La localización más frecuente de una úlcera venosa es:

Seleccione una:
- a. Las opciones a y b son correctas ✓
- b. Opción a: El tercio medio de la pierna, en el área supramaleolar interna
- c. Opción c: Sobre las cabezas de los metatarsianos
- d. Opción b: Sobre un trayecto varicoso y sobre una perforante insuficiente

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las úlceras de forma ovalada o redondeada, de tamaño variable, superficiales, con bordes mal delimitados y con una gran tendencia a la granulación se corresponden con:

Seleccione una:
- a. Pie diabético
- b. Ulceras venosas ✓
- c. Ulceras arteriales
- d. Ulceras por presión

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las escala de valoración del riesgo en pacientes ingresados, se deben aplicar:

Seleccione una:
- a. Si el paciente sufre algún cambio significativo
- b. Al ingreso y al alta
- c. Todas son correctas ✓
- d. Cada 7 días si no sufre cambios

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los principales agentes patogénicos del pie diabético son:

Seleccione una:
- a. Enfermedad vascular periférica
- b. Infección
- c. Neuropatía diabética
- d. Todas son correctas ✓

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la correcta en relación a la clasificación de las UPP:

Seleccione una:
- a. En una úlcera Grado IV, la lesión llega has el tejido subcutáneo
- b. En una UPP Grado II la lesión alcanza fascia subyacente.
- c. Las UPP se clasifican en 5 grados
- d. En una UPP Grado III, la lesión alcanza hasta la hipodermis ✓

Pregunta 17
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la incorrecta en reacción a la valoración del pie diabético:

Seleccione una:
- a. El pulso pedio se toma palpando con dos o tres dedos entre el primer y segundo metatarsiano del pie
- b. La palpación de pulsos, consiste en identificar la contracción regular de las arterias pedia y tibial posterior. ✗
- c. Para valorar una vasculopatía, se deben valorar los cambios de color de la extremidad en función de la posición, la temperatura del pie con el dorso de la mano y comparándolo con otro el otro.
- d. El diapasón de 128 Hz, se utiliza para medir la sensibilidad. Mal.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale los principales síntomas de las úlceras tumorales:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✓
- b. Alteración de la imagen corporal
- c. Dolor y mal olor
- d. Exudado y sangrado

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Son factores de riesgo para la aparición de insuficiencia arterial:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✓
- b. Enfermedad cerebrovascular aguda y cardiopatía isquémica.
- c. Diabetes Mellitus. Hipercolesterolemia. HTA y obesidad.
- d. Sedentarismo y tabaco

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un paciente diabético con una úlcera necrótica rodeada de una zona eritematosa, muy dolorosa y en la que la pierna está fría, sin vello y con disminución de pulsos, diríamos que presenta:

Seleccione una:
- a. Una úlcera isquémica ✓
- b. Una úlcera neuropática
- c. Una úlcera por presión
- d. Ninguna es correcta

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una úlcera por presión grado I, (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. Tiene un color rosado o eritematoso
- b. Es una afectación de la epidermis
- c. Tiene pérdida de solución de continuidad de la piel ✓
- d. El tono rojizo no desaparece con una presión superior a 30 segundos

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una úlcera venosa puede ser producida, (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. Como consecuencia de un déficit de aporte sanguíneo periférico ✓
- b. Una trombosis venosa profunda
- c. Una incompetencia del sistema venoso superficial
- d. Debido a una hipertensión venosa producida por una incompetencia del sistema del retorno venoso

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una disminución de la sensibilidad motora y sensitiva a nivel del sistema nervioso autónomo es una característica de:

Seleccione una:
- a. Pie neuropático ✓
- b. Las UPP
- c. Pie metabólico
- d. Pie isquémico

Pregunta 24
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una lesión de la piel de origen isquémico con pérdida de sustancia cutánea y producida por la presión y la fricción prolongadas entre dos planos duros, es:

Seleccione una:
- a. Una escara
- b. Una úlcera crónica
- c. Una úlcera por presión ✓
- d. Una herida