

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 27 de marzo de 2024, 23:27
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 28 de marzo de 2024, 00:13
<b>Tiempo empleado</b>	
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

### Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados especiales de las úlceras tumorales. Señala la incorrecta. Selecciona una:

a.

Se debe realizar un lavado minucioso de la herida friccionando para eliminar esfacelos y descontaminar la herida.

b.

Se puede utilizar metronidazol tópico para el control del mal olor.

c.

Se puede utilizar apósitos hemostáticos para el control del sangrado.

d.

Se debe administrar analgesia pautada previa a la cura en úlceras dolorosas.

### Pregunta **2**

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señale la incorrecta. Ante una crisis de disnea:  
Seleccione una:

a.  
Mantener al paciente en una postura cómoda.

b.  
Administrar la medicación pautada.

c.  
Fomentar la respiración eficaz y la utilización de ejercicios de relajación por parte del paciente.

d.  
Pedir a los familiares que se salgan de la habitación para no estar junto al paciente.

### Pregunta 3

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la hipercalcemia tumoral aparecen síntomas como: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.  
Anorexia.

b.  
Polidipsia.

c.  
Deshidratación.

d.  
Todas son correctas.

### Pregunta 4

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre las medidas para prevenir la mucositis podemos destacar: Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

a.  
Calentar alimentos a altas temperaturas.

b.  
Buena higiene dental con cepillo suave.

c.  
Realizar colutorios con agua con bicarbonato o manzanilla.

d.  
B y c son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para valorar la disnea en un paciente paliativo utilizaremos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.  
Cancer Dyspnea Scale.

b.  
Verbal Scale Rating.

c.  
Escala Visual analógica (EVA).

d.  
Todas son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre las complicaciones de la traqueotomía podemos tener: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.  
Lesión tumoral en el estoma.

b.  
Estenosis.

c.

Hemorragias.



d.

Todas con correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta. La expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores donde se produce un volumen de sangrado de 400-600ml /24h:

Seleccione una:



a.

Puede ser causada por infecciones, coagulopatias, carcinoma epidermoide y tratamientos con radioterapia.



b.

Es una hemoptisis leve.



c.

Utilizar toallas, sábanas o paños de color oscuro para reducir el impacto psicológico de ver la sangre.



d.

Se recomienda reposo absoluto semisentado o en decúbito lateral sobre el lado del sangrado si se conoce.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un paciente de 44 años con cáncer de próstata recientemente diagnosticado, refiere dolor intolerable en localizaciones múltiples. Su humor ha cambiado, está callado, ausente y su familia evita hablar de su enfermedad ¿Qué deberíamos establecer de manera prioritaria a la hora de instaurar un tratamiento? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.

La prescripción de psicofármacos.



b.

La evaluación multidimensional del dolor.



c.

La prescripción del tratamiento antineoplásico.

d.

La evaluación del estadio evolutivo de la enfermedad.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta correcta. En el síndrome de vena cava superior.

Seleccione una:

a.

Entre los signos y síntomas se encuentra edema en esclavina, ingurgitación yugular y cianosis en cara y miembros superiores.

b.

Puede ser debida a tumores de pulmón, trombosis de vena cava superior por trastornos paraneoplásicos y pacientes con accesos venosos centrales relacionado con la trombosis del mismo.

c.

Entre los tratamientos se encuentra la radioterapia y colocación de endoprotesis.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Podemos utilizar en el tratamiento del control de la disnea en el paciente paliativo.

Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

a.

Opioides como la morfina.

b.

Benzodiacepinas para mitigar la ansiedad y ataques de pánico.

c.

Corticoides en obstrucción de la vía aérea.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable:  
Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.

Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.

b.

Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.

c.

Realizar enjuagues con manzanilla con limón.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a el ejercicio en el paciente paliativo.

Seleccione una:

a.

El ejercicio al final de la vida debe ser reducido y focalizado en objetivos sencillos como pasar de la cama a la silla.

b.

El ejercicio al final de la vida debe incrementarse y aumentar la intensidad.

c.

La presencia de metástasis y otros síntomas puede producir disminución de la función física y el estado general del paciente.

d.

Se debe fomentar la ocupación del paciente en su tiempo libre siempre que su situación lo permita, que lea, escriba o salga a pasear.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de la incapacidad de la persona para retener la orina, unido en la mayoría de los casos de un deseo continuo de orinar, nos referimos a: Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

a.

Retención urinaria.

b.

Tenesmo vesical.

c.

Espasmo vesical.

d.

Incontinencia urinaria.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:

a.

Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.

b.

Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.

c.

Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.

d.

El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la obstrucción intestinal el tratamiento puede incluir: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a.  
Descompresión abdominal mediante sondaje nasogástrico conectado a bolsa.
- b.  
Ocreotide
- c.  
Metoclopramida
- d.  
Todas son correctas.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la anorexia en el paciente paliativo se usan: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- 
- a.  
Dexametasona como estimulante del apetito.
- b.  
Domperidona para aumentar el funcionamiento gastrointestinal enlentecido.
- c.  
Acetato de megestrol como estimulante del apetito.
- d.  
Todas son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las medidas a tomar en caso de hemorragia. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- 
- a.  
Si el sangrado es local: aplicar vendajes compresivos o taponamiento nasal.
- b.  
Si hemoptisis: colocar al paciente en decúbito lateral sobre el lado del pulmón afectado para evitar la aspiración.
- c.  
Utilizar paños blancos en todo momento.

d.

A y b son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Entre las complicaciones de la disfagia encontramos: Señala la respuesta correcta. Seleccione una:

a.

Neumonía aspirativas.

b.

Insuficiencia respiratoria.

c.

Deshidratación e insuficiencia renal.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Entre los laxantes utilizados en el estreñimiento en el paciente paliativo se encuentra: Señala la respuesta correcta. Seleccione una:

a.

Laxantes osmóticos salinos y no salinos.

b.

Lactulosa y macrogol.

c.

Laxantes formadores de volumen o reguladores.

d.

A y b son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:

a.

El paciente sólo tolera líquidos.

b.

El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.

c.

El paciente presenta eritema en la mucosa oral.

d.

El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.