

Comenzado el	sábado, 30 de marzo de 2024, 03:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 30 de marzo de 2024, 05:07
Tiempo empleado	1 hora 9 minutos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué paso no corresponde a la canalización de la línea media mediante seldinger simple?

Seleccione una:

a.

Uso del microintrodutor sobre la guía antes de introducir el catéter.

b.

Refuerzo de anestesia subcutánea con la guía tutorizando el vaso.

c.

Punción ecoguiada en plano transversal.

- d.
Uso del microdilataador sobre la guía antes de introducir el catéter.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La correcta posición de la punta del PICC haciendo uso del ECG-IC la comprobaremos mediante...

Seleccione una:

- a.
La máxima amplitud de la onda P.

- b.
El crecimiento de la onda P.

- c.
La morfología bifásica de la onda P.

- d.
La morfología negativa de la onda P.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ECG-IC permite identificar la posición central de la punta del catéter guiándose por las variaciones de la amplitud de la onda P en la segunda derivación del trazado electrocardiográfico. ¿Qué morfología debe tener la onda P para indicar que el catéter se encuentra en la posición central adecuada?

Seleccione una:

- a.
Onda P con máxima amplitud.

- b.
Onda P negativa.

c.

Onda P bifásica.

d.

Onda P ausente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de los siguientes casos no está contraindicada la canalización de un PICC?

Seleccione una:

a.

Diámetro inadecuado de venas.

b.

Situaciones de emergencia.

c.

Síndromes mediastínicos.

d.

Insuficiencia renal estadio II

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el orden prioritario de elección atendiendo a las características de las venas para la canalización de PICC?

Seleccione una:

a.

Vena cefálica, basílica y axilar.

b.

Vena basílica, cefálica y axilar.

c.

Vena braquial, cefálica y basílica.



- d.
Vena basílica, braquial y cefálica.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La exploración ecográfica se realizará con la sonda:

Seleccione una:



- a.
Plano longitudinal o eje largo.



- b.
Plano longitudinal o eje corto.



- c.
Plano transversal o eje largo.



- d.
Plano transversal o eje corto.

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La imagen ecográfica de la vena cefálica en eje transversal o eje corto se observa en la pantalla del ecógrafo como:

Seleccione una:



- a.
Una imagen circular anecóica con una imagen hiperecogénica dentro alejada de estructuras de riesgo.



- b.
Una imagen circular anecóica alejada de estructuras de riesgo.



- c.
Una imagen circular hipercogénica alejada de estructuras de riesgo.

d.

Una imagen circular hiperecogénica con una imagen anecoica dentro alejada de estructuras de riesgo.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición anatómica adecuada para la localización de la punta del catéter es:

Seleccione una:

a.

El tercio superior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular.

b.

El tercio inferior de la vena cava superior hacia la unión cavo-auricular.

c.

El tercio inferior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.

d.

El tercio superior de la vena cava inferior hacia la unión cavo-auricular.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se reemplazará el dispositivo de sujeción de anclaje subcutáneo?

Seleccione una:

a.

Cada 7 días coincidiendo con la cura del apósito.

b.

De manera mensual.

c.

Cada 48h.

- d.
No se reemplaza, tendrá la misma duración que tenga el dispositivo implantado.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En pacientes con más riesgo de salida accidental del catéter como ancianos, niños, pacientes agitados o en casos en los que la piel tenga alergias o intolerancias a apósitos estará indicado el uso de:

Seleccione una:

a.
Sistemas de fijación sin sutura.

b.
Puntos de sutura, dado su elevado riesgo de salida.

c.
Sistemas de fijación sin sutura con vendaje oclusivo.

d.
Sistema de anclaje subcutáneo.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En pacientes con más riesgo de salida accidental del catéter como ancianos, niños, pacientes agitados o en casos en los que la piel tenga alergias o intolerancias a apósitos (MARSI) estará indicado el uso de:

Seleccione una:

a.
Sistemas de fijación sin sutura.

b.
Puntos de sutura, dado su elevado riesgo de salida.

c.

Sistemas de fijación sin sutura con vendaje oclusivo.



d.

Sistema de anclaje subcutáneo.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones de uso de la línea media o midline son todas excepto:

Seleccione una:



a.

Pacientes con acceso venoso difícil.



b.

Pacientes que precisen un acceso venoso periférico extrahospitalario.



c.

Pacientes con tratamiento con una duración entre 2-3 semanas.



d.

Pacientes que precisen administración de NTP (mayor que 800 mOmsl/L) extra-hospitalaria.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La localización de la correcta posición del PICC en la radiografía de tórax es...

Seleccione una:



a.

A 3 cm de distancia de la carina traqueal.



b.

A 5 cm de distancia de La unión cavo-auricular.



c.

A nivel de la 4º vertebra torácica.

d.
A 2 cm de distancia de la 4^o vertebra torácica.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas consideraciones a cerca de la línea media o midline es verdadera?

Seleccione una:

a.
Es una vía venosa central de acceso periférico.

b.
Es una vía venosa periférica corta de larga duración.

c.
Es una vía venosa periférica de media duración.

d.
Es una vía venosa periférica corta.

e.
Aquellos con un pH entre 5-9 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.

f.
Aquellos con un pH menor que 5 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.

g.
Aquellos con un pH mayor que 9 y una osmolaridad menor que 600mOsm/L.

h.
Aquellos con un pH entre 5-9 y una osmolaridad mayor que 600mOsm/L.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué beneficios ofrece la técnica de tunelización? Señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

a.

Limita los riesgos infecciosos al crear una barrera con la propia piel que protege el catéter alejando el punto de inserción.

b.

Al poder acceder a venas de menor calibre existe más riesgo de eventos trombóticos.

c.

El tejido subcutáneo se adhiere al dispositivo y dificulta su salida.

d.

El protocolo RAVESTO permite estandarizar la evaluación rápida del punto de salida del catéter.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura tiene una imagen ecográfica formada por un grupo de estructuras circulares oscuras con los bordes hiperecogénicos?

Seleccione una:

a.

Arteria.

b.

Venas braquiales.

c.

Vena cefálica.

d.

Nervio.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué complicaciones más comunes están relacionadas la adecuada elección del lugar de inserción del catéter?

Seleccione una:

a.

Trombosis, punción arterial accidental y el daño nervioso.

b.

Trombosis, infección, punción arterial accidental y el daño nervioso.

c.

Infección, la punción venosa accidental y el daño nervioso.

d.

Trombosis, la infección y el daño nervioso.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la exploración vascular o barrido ecográfico que características deberán tenerse en cuenta en el estudio de las venas:

Seleccione una:

a.

Diámetro, profundidad, recorrido y permeabilidad.

b.

Profundidad, diámetro y tipo de vena.

c.

Tipo de vena, recorrido, diámetro y profundidad.

d.

Tipo de vena, permeabilidad, recorrido, diámetro y profundidad.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué técnica se recomienda la colocación de la sonda el plano longitudinal o eje largo?

Seleccione una:



a.
Para comprobar la guía dentro del vaso.



b.
Para medir el diámetro de la vena.



c.
Para ver la relación de la vena con las estructuras de riesgo.



d.
Para infiltrar el anestésico local.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración proactiva para canalizar un PICC se tiene en cuenta los siguientes apartados, señale la opción verdadera:

Seleccione una:



a.
Tratamiento prescrito



b.
El material del PICC



c.
Características del profesional sanitario



d.
Todas son correctas