



Está Usted en: → Tena2013IntEnfermeras → Formacion Enfermeras → Curso II: Valoración de la IU y patologías concomitantes → [Examen Final Curso II](#)

#### Formacion Enfermeras

Curso I: La IU y la calidad de vida

Curso II: Valoración de la IU y patologías concomitantes

**Examen Final Curso II**

#### Producto Enfermeras

#### Información Científica

## Examen Final Curso II

A continuación podrá realizar el Examen Final del Curso II sobre Valoración de la Incontinencia Urinaria y patologías concomitantes.

El examen es una selección de 10 preguntas aleatorias diferentes para cada usuario, sobre una base de datos de preguntas disponibles.

Para superar el examen y conseguir la acreditación correspondiente (pendiente de otorgar créditos por los organismos competentes) deberá superar al menos el **80% de respuestas correctas** sobre el mismo.

Sólo dispone de 1 oportunidad para completar el examen y no podrá abandonarlo una vez iniciado, si lo abandona sin completarlo deberá volver a comenzar el examen.

Una vez completadas todas las preguntas, deberá pulsar en el botón Finalizar para entregar el examen.

Le recomendamos lea atentamente tanto las preguntas como las diferentes posibles respuestas.

!!!Suerte!!!

### Pregunta 1

Referente al Biofeedback, señale la repuesta correcta:

- ☐ a) Esta indicado en el tratamiento de la IUE
- ☐ b) Se trata de la realización de ejercicios de la musculatura del suelo pelviano asistido o guiados por un equipo de control
- ☐ c) Son útiles en el tratamiento de la micción no coordinada
- ☒ d) Todas las respuestas son correctas

### Pregunta 2

Dentro del tratamiento médico de la IUU, señale la respuesta incorrecta:

- ☒ a) Los fármacos alfaadrenérgicos disminuyen la resistencia uretral
- ☐ b) Los antidepresivos como la Imipramina tienen un efecto dual: anticolinérgico y sedativo a nivel central
- ☐ c) Los fármacos anticolinérgicos son los más eficaces al producir relajación del músculo liso vesical
- ☐ d) Los alfabloqueantes selectivos de los receptores alfa1-adrenérgicos facilitan el vaciado vesical

### Pregunta 3

Dentro de los tratamientos conservadores de la IU señale la respuesta incorrecta:

- ☐ a) Es recomendable la disminución en la ingesta de líquidos
- ☐ b) Esta indicado el establecimiento de pautas de micción programada
- ☒ c) No están indicadas técnicas de relajación para reducir los niveles de ansiedad
- ☐ d) No son recomendable las bebidas con cafeína o teína

### Pregunta 4

Referente al tratamiento de la IU, señale la respuesta incorrecta:

- ☐ a) El tratamiento debe establecerse en función de una correcta evaluación inicial del paciente
- ☐ b) El tratamiento debe comenzar por tratar la afección de base
- ☒ c) En el caso de la IU mixta debemos tratarla de inicio como si fuese una IU de esfuerzo
- ☐ d) En las pacientes con IUU secundaria a prolapso genital o vesical el tratamiento inicial debe ir orientado a solventar la causa de obstrucción del TUI

### Pregunta 5

Dentro de las pruebas diagnósticas en atención especializada, una de las siguientes respuesta es correcta:

- ☐ a) La videourodinámica es el uso sincrónico de los rayos X durante la realización del estudio urodinámico

- ☐ b) El TAC permite descartar patología malformativa, medular y afectación neurológicas
- ☐ c) La Endoscopia urológica es útil en la evaluación de hematuria y cistopatías
- ☒ d) Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 6**

Entre los criterios de derivación al urólogo en los pacientes con IU, no se incluye una de las siguientes respuestas:

- ☐ a) Fracaso del tratamiento médico
- ☐ b) Antecedente de enfermedad neurológica
- ☒ c) Incontinencia urinaria de Urgencia
- ☐ d) Residuo postmiccional importante

**Pregunta 7**

Dentro de las pruebas recomendadas en la evaluación de la IU, señale la respuesta correcta:

- ☐ a) Esta indicado la determinación de los valores de función renal mediante Creatinina sérica
- ☐ b) El Análisis de orina nos permite descartar posibles causas de IU transitoria
- ☐ c) La citologías de orina nos permiten diagnosticar un tumor vesical como causa de incontinencia urinaria
- ☒ d) Todas las respuesta anteriores son correctas

**Pregunta 8**

Referente al tratamiento con Ácido hialurónico en la Hiperactividad vesical, señale la respuesta incorrecta:

- ☐ a) Repone temporalmente la capa de glicosaminoglicanos
- ☐ b) Estimula la reposición de tejido conjuntivo
- ☒ c) Bloquea las aferencias sensitivas a nivel vesical
- ☐ d) Disminuye el componente inflamatorio/irritativo como causa de hiperactividad secundaria

**Pregunta 9**

Dentro de la exploración física en la IU, cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a) No es necesaria la exploración abdominal
- ☐ b) En la exploración neurológica basta con explorar el tono del esfínter anal
- ☐ c) La exploración pelviana solo es necesaria si existen antecedentes de tumor ginecológico
- ☒ d) Es necesario el tacto rectal en el varón para ver las características de la próstata

**Pregunta 10**

Dentro de los cuestionarios sobre calidad de vida utilizados en la IU, ¿cuál es el que recomienda la ICS y la Asociación Europea de Urología?:

- ☐ a) EuroQol EQ-5D
- ☒ b) ICIQ-SF
- ☐ c) I-Qol
- ☐ d) King's Health Questionnaire

[Finalizar](#)**[Sobre tenainteractiva.com](#)**[Términos de uso y privacidad](#)

TENA 2014 - Contacto (900 12 10 12)

[En caso de consulta técnica: soporte@tenainteractiva.com](mailto:soporte@tenainteractiva.com)