

Enunciado de la pregunta

Entre las ventajas de la vía subcutánea se encuentra. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:



a.

Técnica segura y poco agresiva.



b.

Puede evitar o reducir la hospitalización.



c.

Limitación de fármacos y fluidos.



d.

No precisa de medidas especiales de mantenimiento.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente de 44 años con cáncer de próstata recientemente diagnosticado, refiere dolor intolerable en localizaciones múltiples. Su humor ha cambiado, está callado, ausente y su familia evita hablar de su enfermedad ¿Qué deberíamos establecer de manera prioritaria a la hora de instaurar un tratamiento? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.

La prescripción de psicofármacos.



b.

La evaluación multidimensional del dolor.



c.

La prescripción del tratamiento antineoplásico.



d. La evaluación del estadio evolutivo de la enfermedad.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Pablo diagnosticado de cáncer de esófago avanzado presenta disfagia que le impide recibir analgésicos por vía oral, solicitando permanecer en su domicilio. ¿Qué otra vía de administración de fármacos implementaría prioritariamente? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Intravenosa.



b.
Intramuscular.



c.
Subcutánea.



d.
Endoscópica

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:



a.
Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.



b.
Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.



c.
Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.



d.
El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la evaluación de los síntomas del paciente con necesidades paliativas: Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a.
Se debe evaluar la intensidad de los mismo.

b.
La frecuencia con que se producen.

c.
La evaluación la hace el personal sanitario sin contar con el paciente.

d.
La opinión del paciente es importante.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A un paciente paliativo con diarrea le recomendaríamos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.
Limitar el azúcar y las grasas en la dieta.

b.
Beber mucho volumen de líquidos de una sólo vez y con gran contraste de temperatura.

c.
Comer alimentos integrales, así como legumbres y frutas.

d.
Ingerir bebidas gaseosas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La xerostomía es un síntoma frecuente en los pacientes paliativos. Entre sus causas están: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Fármacos como opioides y corticoesteroides.



b.
Radioterapia.



c.
A y b son correctas.



d.
La hiperhidratación.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las complicaciones de la traqueotomía podemos tener: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Lesión tumoral en el estoma.



b.
Estenosis.



c.
Hemorragias.



d.
Todas con correctas.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable:
Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.
Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.

b.
Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.

c.
Realizar enjuagues con manzanilla con limón.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las terapias complementarias del dolor podemos encontrar. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.
Técnicas de relajación.

b.
Musicoterapia.

c.
Risoterapia.

d.

Todas son correctas.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos utilizar en el tratamiento del control de la disnea en el paciente paliativo. Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

a.
Opioides como la morfina.

b.
Benzodiacepinas para mitigar la ansiedad y ataques de pánico.

c.
Corticoides en obstrucción de la vía aérea.

d.
Todas son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente paliativo existen alteraciones en la nutrición debido a problemas al tragar, deglutir o masticar, náuseas, vómitos, anorexia, dificultades en la absorción y efectos secundarios a fármacos, de ahí que la enfermera como objetivo prioritario en los cuidados básicos establezca: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

a.
Invitaremos a que coma todo lo posible, cuanto más mejor.

b.
Se servirá en cantidades copiosas y platos grandes para nutrir bien al paciente.

c.
Añadiremos salsas picantes con textura adecuada para propiciar la deglución.

d.Haremos hincapié en los cuidados higiénicos de la boca e hidratación adecuada.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos encontrar como medidas generales para evitar las náuseas y los vómitos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Dieta fraccionada en 6-7 tomas.



b.
Buena postura, sentado, semisentado o incorporado si está en la cama.



c.
Café, etc.



d.
A y B son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los síntomas y signos de linfedema nos podemos encontrar: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Piel eritematosa, delgada y translúcida.



b.
Hipoestesis, parestesia y alodinia.



c.
Afectación ganglionar tumoral.



d.
Todas son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las alteraciones hematopoyéticas en el paciente paliativo nos encontramos con: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.

Anemia.



b.

Trombopenia.



c.

Neutropenia.



d.

Todas con correctas.

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta. La expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores donde se produce un volumen de sangrado de 400-600ml /24h:

Seleccione una:



a.

Puede ser causada por infecciones, coagulopatias, carcinoma epidermoide y tratamientos con radioterapia.



b.

Es una hemoptisis leve.



c.

Utilizar toallas, sábanas o paños de color oscuro para reducir el impacto psicológico de ver la sangre.



d.

Se recomienda reposo absoluto semisentado o en decúbito lateral sobre el lado del sangrado si se conoce.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:



a.
El paciente sólo tolera líquidos.



b.
El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.



c.
El paciente presenta eritema en la mucosa oral.



d.
El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para valorar la disnea en un paciente paliativo utilizaremos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:



a.
Cancer Dyspnea Scale.



b.
Verbal Scale Rating.



c.
Escala Visual analógica (EVA).



d.
Todas son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados especiales de las úlceras tumorales. Señala la incorrecta.

Seleccione una:



a.

Se debe realizar un lavado minucioso de la herida friccionando para eliminar esfacelos y descontaminar la herida.



b.

Se puede utilizar metronidazol tópico para el control del mal olor.



c.

Se puede utilizar apósitos hemostáticos para el control del sangrado.



d.

Se debe administrar analgesia pautada previa a la cura en úlceras dolorosas.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la incorrecta. Ante una crisis de disnea:

Seleccione una:



a.

Mantener al paciente en una postura cómoda.



b.

Administrar la medicación pautada.



c.

Fomentar la respiración eficaz y la utilización de ejercicios de relajación por parte del paciente.



d.

Pedir a los familiares que se salgan de la habitación para no estar junto al paciente.