
Comenzado el lunes, 22 de abril de 2024, 12:10

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 22 de abril de 2024, 13:20

Tiempo empleado 1 hora 10 minutos

Puntos 14,00/20,00

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Comentario - Apto

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué precauciones deben tomarse antes de la inserción del CEC?

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de precauciones de barrera máximas.
 - ☐ b. Lavado de manos.
 - ☐ c. Verificación del contenido del equipo de inserción.
 - ☒ d. Todas las anteriores. ✖
-

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la elección del lugar de implantación de un catéter venosos periférico corto (CVPC), indique la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. La muñeca debe ser siempre evitada, dado el elevado riesgo de daño nervioso o arterial
- ☐ b. Las zonas de flexión presenta un riesgo alto de traslocación y su duración es más breve
- ☐ c. La parte posterior de la mano presenta un riesgo alto de traslocación y su duración es más breve
- ☒ d. La zona de flexión y la parte posterior de la mano son las zonas de 1º elección por su accesibilidad y duración



Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paciente pediátrico, los catéteres periféricos largos (CVPL), presentan una longitud aproximada de:

Seleccione una:

- ☒ a. 8-10 cm
- ☐ b. 2-4 cm
- ☐ c. 15-20 cm
- ☐ d. 25 cm

Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es un riesgo asociado con el bajo volumen de sangre circulante en los recién nacidos?

Seleccione una:

- ☒ a. Sobrecarga de líquidos
- ☐ b. Aumento de la presión arterial
- ☐ c. Hipertensión pulmonar
- ☐ d. Anemia iatrogénica

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función principal del adhesivo tisular en la implantación de CVPL?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar el riesgo de sangrado.
- ☐ b. Incrementar la contaminación bacteriana.
- ☒ c. Detener el sangrado, disminuir la contaminación bacteriana y mejorar la estabilización del dispositivo. ✓
- ☐ d. Mejorar la movilidad del catéter.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde puede quedar bloqueado un catéter umbilical en su trayecto?

Seleccione una:

- ☐ a. En la arteria pulmonar.
- ☐ b. En la vena cava superior.
- ☒ c. En la circulación portal. ✓
- ☐ d. En la aurícula izquierda.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué recomendación se hace en la técnica de punción ecoguiada durante la implantación de CVPL?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizarla solo en pacientes con venas superficiales.
 - ☐ b. Evitar su uso en pacientes DIVA.
 - ☒ c. Realizarla mediante seguimiento dinámico de la punta. ✓
 - ☐ d. Utilizarla solo en la técnica Seldinger acelerada.
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el rango de calibres para los catéteres periféricos cortos?

Seleccione una:

- ☐ a. 10G-16G.
- ☐ b. 18G-24G.
- ☒ c. 26G-14G. ✓
- ☐ d. 30G-8G.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué región se recomienda preferiblemente la punción para los CVPL?

Seleccione una:

- ☐ a. Fosa antecubital.
- ☒ b. Vena cefálica o basilica del antebrazo. ✓
- ☐ c. Muñeca.
- ☐ d. Vena braquial en la parte superior del brazo.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué procedimiento se desaconseja para la estimación de la posición de la punta del catéter debido a su inexactitud y efectos adversos?

Seleccione una:

- ☐ a. Evaluación ecográfica
 - ☒ b. Radiografías post-procedimiento ✓
 - ☐ c. Prueba de burbujas
 - ☐ d. Sistema de electrocardiograma intracavitario (IC-ECG)
-

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles son algunas de las limitaciones del catéter CEC en comparación con los PICC?

Seleccione una:

- ☐ a. Menor capacidad para la obtención de muestras de sangre.
- ☐ b. Menor velocidad de infusión que los PICC.
- ☐ c. Limitaciones en la monitorización hemodinámica.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✖

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los apósitos de protección de los diferentes DAV pediátricos el término "MVTR" hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. El grado de adherencia del apósito
- ☒ b. El grado de permeabilidad del apósito ✔
- ☐ c. El tamaño del apósito
- ☐ d. La presencia de gel antiséptico del apósito

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complicación puede surgir si un CVU está colocado fuera de su ubicación habitual en el conducto venoso de Arancio?

Seleccione una:

- ☐ a. Infección local.
 - ☐ b. Trombosis venosa.
 - ☒ c. Riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante (NEC). ✔
 - ☐ d. Obstrucción del catéter.
-

Pregunta

14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es una recomendación específica para dispositivos de acceso venoso de acero tipo palomilla?

Seleccione una:

- ☐ a. Uso prolongado en infusión continua
- ☒ b. Reservados solo para administraciones de dosis única ✖
- ☐ c. Se deben evitar por riesgo de producir lesiones cutaneas
- ☐ d. Óptimos para neonatos prematuros

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica la técnica de tunelización en la inserción de un PICC en pacientes pediátricos?

Seleccione una:

- ☐ a. Elección del punto de punción en la zona verde
- ☒ b. Elección del punto de punción del vaso en la zona amarilla y sitio de salida del DAV en la zona verde ✔
- ☐ c. Utilización exclusiva de la técnica de ultrasonido
- ☐ d. Uso de un sistema de electrocardiograma intracavitario

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se clasifican los dispositivos venosos según la nomenclatura WoCoVa?

Seleccione una:

- ☐ a. Solo en catéteres periféricos.
 - ☒ b. Catéteres periféricos y centrales. ✔
 - ☐ c. Catéteres centrales y subcutáneos.
 - ☐ d. Exclusivamente en catéteres cortos.
-

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se recomienda retirar el CVU en el caso de neonatos?

Seleccione una:

- ☐ a. Después de 24 horas.
- ☐ b. Después de 48 horas.
- ☒ c. Después de siete días desde el nacimiento. ✓
- ☐ d. No se recomienda retirarlo, independientemente del tiempo.

Pregunta

18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El material más recomendado para la fabricación de los dispositivos venosos periféricos largos será:

Seleccione una:

- ☐ a. Silicona
- ☐ b. Poliuretano o polieter amida
- ☐ c. Teflón
- ☒ d. Todos ellos ✗

Pregunta

19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué situaciones se discute la opción de ubicación subhepática del CVU?

Seleccione una:

- ☐ a. En recién nacidos mayores de dos semanas.
 - ☒ b. En casos de emergencia. ✗
 - ☐ c. Cuando el catéter está atrapado en una vena inflamada o rota.
 - ☐ d. En situaciones de fácil acceso venoso periférico.
-

¿Qué precaución se debe tener al extraer sangre del CVU en neonatos prematuros?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar la extracción rápidamente.
- ☒ b. Realizar la extracción lentamente para evitar afectar la oxigenación cerebral. ✓
- ☐ c. Evitar la confirmación intraprocedimiento.
- ☐ d. No se requiere precaución especial.

Actividad previa

◀ Vías de vida: Un día en la Unidad de Terapia Intravenosa

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>